

Guía de aves

del Área de Conservación del Patrimonio
Histórico, Cultural, Social y Espiritual

Loma Santa



Guía de aves

del Área de Conservación del Patrimonio
Histórico, Cultural, Social y Espiritual

Loma Santa



ORE – Organización de Apoyo Legal y Social

Director Ejecutivo: Leonardo Tamburini

Identificación, descripción e información científica

Miguel Ángel Aponte Justiniano

Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado

Ilustraciones y mapas

Aves de Bolivia. Guía de Campo. Asociación Civil Armonía.

Ilustradores principales: Carl Christian Tofte, Héctor Slongo, Julián Q. Vidoz, Oscar Tintaya, Michael Kessler y Jon Fjeldsá.

Ilustraciones adicionales por: Raphael Dutra, Vitor Torga Lombardi, Christopher J. Vogel, Cecilia Vergara, Víctor M. Sosa, Evan Barbour y Daniel J. Lebbin.

Producción de los mapas de distribución: Sebastian K. Herzog, Oswaldo Maillard Z. y Tatiana Guerrero Vallejos

Fotografía de portada:

Steffen Reichle. Programa para la Conservación del Águila Arpía (*Harpia harpyja*) en Bolivia - Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado

Revisión general:

Catalina Rivadeneira

Miguel Ángel Fernández

Edición

Claudia Belaunde Cano

Diagramación

Jessica Oré

Impresión: Arte y Color S.R.L.

2025 Editorial ORE

Todos los derechos reservados

Av. Piraí, Calle Pablo Neruda N° 7

Santa Cruz de la Sierra-Bolivia

Cita de referencia:

ORE. (2025). Guía de Aves del Área de Conservación del Patrimonio Histórico, Cultural, Social y Espiritual Loma Santa. Territorio Indígena Multiétnico.

La presente guía recibió el respaldo de la iniciativa Conserva Aves, liderada por American Bird Conservancy, Audubon, BirdLife International, Birds Canada y la Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica y el Caribe (RedLAC), con el apoyo de Bezos Earth Fund. En Bolivia, la iniciativa es ejecutada por la Asociación Civil Armonía y FUNDESNA.

La presente guía ha sido elaborada en el marco del proyecto "Apoyo a la Gestión de Recursos Naturales en el TIM" que ORÉ ejecuta en conjunto con el Gobierno Indígena Autónomo del TIM, la Subcentral de Cabildos Indígenas del TIM y la Subcentral de Mujeres Indígenas del TIM, con el apoyo de IWGIA, la Fundación Gordon and Betty Moore y Re:Wild.

Índice

Presentación.....	11
Introducción	12
Sobre la guía.....	14
Figuras y mapas	18
<i>Tinamus tao</i>	<i>21</i>
<i>Tinamus major.....</i>	<i>22</i>
<i>Crypturellus cinereus.....</i>	<i>23</i>
<i>Crypturellus undulatus.....</i>	<i>24</i>
<i>Crypturellus soui.....</i>	<i>25</i>
<i>Cairina moschata</i>	<i>26</i>
<i>Penelope jacquacu.....</i>	<i>27</i>
<i>Pipile grayi.....</i>	<i>28</i>
<i>Ortalis guttata</i>	<i>29</i>
<i>Mitu tuberosun.....</i>	<i>30</i>
<i>Odontophorus stellatus.....</i>	<i>31</i>
<i>Patagioenas speciosa</i>	<i>32</i>
<i>Patagioenas cayennensis.....</i>	<i>33</i>
<i>Patagioenas plumbea.....</i>	<i>34</i>
<i>Patagioenas subvinacea.....</i>	<i>35</i>
<i>Geotrygon montana.....</i>	<i>36</i>
<i>Leptotila verreauxi.....</i>	<i>37</i>
<i>Leptotila rufaxilla</i>	<i>38</i>
<i>Columbina talpacoti.....</i>	<i>39</i>
<i>Guira guira</i>	<i>40</i>
<i>Crotophaga major</i>	<i>41</i>
<i>Crotophaga ani</i>	<i>42</i>
<i>Tapera naevia.....</i>	<i>43</i>
<i>Dromococcyx phasianellus.....</i>	<i>44</i>
<i>Coccyzua minuta.....</i>	<i>45</i>
<i>Piaya cayana</i>	<i>46</i>
<i>Nyctibius grandis.....</i>	<i>47</i>
<i>Nyctibius griseus.....</i>	<i>48</i>
<i>Nyctidromus albicollis.....</i>	<i>49</i>
<i>Setopagis parvula</i>	<i>50</i>
<i>Hydropsalis torquata</i>	<i>51</i>
<i>Antrostomus sericocaudatus.....</i>	<i>52</i>
<i>Streptoprocne zonaris.....</i>	<i>53</i>
<i>Chaetura brachyura</i>	<i>54</i>
<i>Florisuga mellivora.....</i>	<i>55</i>
<i>Glaucis hirsutus.....</i>	<i>56</i>
<i>Threnetes leucurus</i>	<i>57</i>
<i>Phaethornis ruber.....</i>	<i>58</i>
<i>Phaethornis hispidus.....</i>	<i>59</i>
<i>Phaethornis malaris.....</i>	<i>60</i>

<i>Chlorostilbon mellisugus</i>	61
<i>Thalurania furcata</i>	62
<i>Opisthocomus hoazin</i>	63
<i>Aramus guarauna</i>	64
<i>Psophia leucoptera</i>	65
<i>Aranides cajaneus</i>	66
<i>Heliornis fulica</i>	67
<i>Vanellus chilensis</i>	68
<i>Actitis macularius</i>	69
<i>Eurypyga helias</i>	70
<i>Jabiru mycteria</i>	71
<i>Mycteria americana</i>	72
<i>Anhinga anhinga</i>	73
<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	74
<i>Tigrisoma lineatum</i>	75
<i>Agamia agami</i>	76
<i>Cochlearius cochlearius</i>	77
<i>Nycticorax nycticorax</i>	78
<i>Butorides striata</i>	79
<i>Ardea cocoi</i>	80
<i>Pilherodius pileatus</i>	81
<i>Egretta thula</i>	82
<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	83
<i>Sarcoramphus papa</i>	84
<i>Coragyps atratus</i>	85
<i>Cathartes aura</i>	86
<i>Cathartes melambrotus</i>	87
<i>Leptodon cayanensis</i>	88
<i>Elanoides forficatus</i>	89
<i>Harpia harpyja</i>	90
<i>Spizaetus tyrannus</i>	91
<i>Spizaetus ornatus</i>	92
<i>Harpagus bidentatus</i>	93
<i>Ictinia plumbea</i>	94
<i>Buteogallus schistaceus</i>	95
<i>Buteogallus urubitinga</i>	96
<i>Rupornis magnirostris</i>	97
<i>Geranoaetus albicaudatus</i>	98
<i>Pseudastur albicollis</i>	99
<i>Megascops choliba</i>	100
<i>Megascops watsonii</i>	101
<i>Lophotrix cristata</i>	102
<i>Pulsatrix perspicillata</i>	103
<i>Ciccaba huhula</i>	104
<i>Glaucidium hardyi</i>	105
<i>Glaucidium brasilianum</i>	106
<i>Trogon melanurus</i>	107
<i>Trogon ramonianus</i>	108

<i>Trogon curucui</i>	109
<i>Trogon collaris</i>	110
<i>Electron phatyrhynchum</i>	111
<i>Baryphthengus martii</i>	112
<i>Momotus momota</i>	113
<i>Megaceryle torquata</i>	114
<i>Chloroceryle amazona</i>	115
<i>Chloroceryle aenea</i>	116
<i>Chloroceryle americana</i>	117
<i>Chloroceryle inda</i>	118
<i>Galbula ruficauda</i>	119
<i>Monasa nigrifrons</i>	120
<i>Monasa morphoeus</i>	121
<i>Capito auratus</i>	122
<i>Ramphastos tucanus</i>	123
<i>Ramphastos vitellinus</i>	124
<i>Pteroglossus castanotis</i>	125
<i>Pteroglossus beauharnaisii</i>	126
<i>Melanerpes cruentatus</i>	127
<i>Dryobates passerinus</i>	128
<i>Campephilus rubicollis</i>	129
<i>Campephilus melanoleucos</i>	130
<i>Dryocopus lineatus</i>	131
<i>Celeus flavus</i>	132
<i>Piculus leucolaemus</i>	133
<i>Piculus chrysocloros</i>	134
<i>Herpetotheres cachinnans</i>	135
<i>Micrastur ruficollis</i>	136
<i>Micrastur gilvicollis</i>	137
<i>Micrastur semitorquatus</i>	138
<i>Ibycter americanus</i>	139
<i>Daptrius ater</i>	140
<i>Milvago chimachima</i>	141
<i>Brotogeris chiriri</i>	142
<i>Brotogeris cyanoptera</i>	143
<i>Pionus menstruus</i>	144
<i>Amazona farinosa</i>	145
<i>Pionites leucogaster</i>	146
<i>Aratinga weddellii</i>	147
<i>Ara ararauna</i>	148
<i>Ara severus</i>	149
<i>Ara chloropterus</i>	150
<i>Psittacara leucopthalmus</i>	151
<i>Cymbilaimus lineatus</i>	152
<i>Taraba major</i>	153
<i>Thamnophilus doliatus</i>	154
<i>Thamnophilus schistaceus</i>	155
<i>Thamnophilus aethiops</i>	156

<i>Dysithamnus mentalis</i>	157
<i>Thamnomanes schistogynus</i>	158
<i>Myrmotherula brachyura</i>	159
<i>Myrmotherula axillaris</i>	160
<i>Hypocnemis subflava</i>	161
<i>Pyriglena maura</i>	162
<i>Myrmoborus leucophrys</i>	163
<i>Myrmoborus myotherinus</i>	164
<i>Hypocnemoides maculicauda</i>	165
<i>Hylophylax naevius</i>	166
<i>Myrmelastes hyperythrus</i>	167
<i>Sciaphylax hemimelaena</i>	168
<i>Myrmophylax atrothorax</i>	169
<i>Phlegopsis nigromaculata</i>	170
<i>Myrmothera berlepschi</i>	171
<i>Formicarius analis</i>	172
<i>Sittasomus griseicapillus</i>	173
<i>Dendrocicla merula</i>	174
<i>Dendrocicla fuliginosa</i>	175
<i>Dendrexetastes rufigula</i>	176
<i>Glyphorhynchus spirurus</i>	177
<i>Dendrocolaptes picumnus</i>	178
<i>Xiphorhynchus elegans</i>	179
<i>Xiphorhynchus guttatus</i>	180
<i>Xenops minutus</i>	181
<i>Xenops rutilans</i>	182
<i>Furnarius leucopus</i>	183
<i>Synallaxis gujanensis</i>	184
<i>Synallaxis albescens</i>	185
<i>Synallaxis rutilans</i>	186
<i>Tyranneutes stolzmanni</i>	187
<i>Neopelma sulphureiventer</i>	188
<i>Lepidothrix coronata</i>	189
<i>Pipra fasciicauda</i>	190
<i>Ceratopipra chloromeros</i>	191
<i>Querula purpurata</i>	192
<i>Cotinga cayana</i>	193
<i>Lipaugus vociferans</i>	194
<i>Gymnoderus foetidus</i>	195
<i>Tityra cayana</i>	196
<i>Tityra semifasciata</i>	197
<i>Schiffornis turdina</i>	198
<i>Laniocera hypopyrra</i>	199
<i>Pachyramphus polychropterus</i>	200
<i>Terenotriccus erythrurus</i>	201
<i>Piprites chloris</i>	202
<i>Platyrinchus coronatus</i>	203
<i>Corythopsis torquatus</i>	204

<i>Mionectes oleagineus</i>	205
<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	206
<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	207
<i>Myiornis ecaudatus</i>	208
<i>Hemitriccus flammulatus</i>	209
<i>Hemitriccus griseipectus</i>	210
<i>Poecilotriccus latirostris</i>	211
<i>Todirostrum chrysocrotaphum</i>	212
<i>Camptostoma obsoletum</i>	213
<i>Elaenia spectabilis</i>	214
<i>Elaenia parvirostris</i>	215
<i>Tyrannulus elatus</i>	216
<i>Myiopagis gaimardii</i>	217
<i>Myiopagis viridicata</i>	218
<i>Zimmerius gracilipes</i>	219
<i>Ornithion inerme</i>	220
<i>Attila bolivianus</i>	221
<i>Attila spadiceus</i>	222
<i>Legatus leucophaeus</i>	223
<i>Ramphotrigon ruficauda</i>	224
<i>Pitangus sulphuratus</i>	225
<i>Philohydor lictor</i>	226
<i>Megarynchus pitangua</i>	227
<i>Myiodynastes luteiventris</i>	228
<i>Myiodynastes maculatus</i>	229
<i>Myiozetetes cayanensis</i>	230
<i>Myiozetetes similis</i>	231
<i>Empidonomus varius</i>	232
<i>Tyrannus melancholicus</i>	233
<i>Tyrannus savana</i>	234
<i>Tyrannus tyrannus</i>	235
<i>Rhytipterna simplex</i>	236
<i>Casiornis rufus</i>	237
<i>Sirystes albocinereus</i>	238
<i>Myiarchus tuberculifer</i>	239
<i>Myiarchus swainsoni</i>	240
<i>Myiarchus tyrannulus</i>	241
<i>Myiophobus fasciatus</i>	242
<i>Pyrocephalus rubinus</i>	243
<i>Ochthornis littoralis</i>	244
<i>Lathrotriccus euleri</i>	245
<i>Cyclarhis gujanensis</i>	246
<i>Vireolanius leucotis</i>	247
<i>Tunchiornis ochraceiceps</i>	248
<i>Pachysylvia hypoxantha</i>	249
<i>Vireo olivaceus</i>	250
<i>Cyanocorax cyanomelas</i>	251
<i>Cyanocorax chrysops</i>	252

<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	253
<i>Progne tapera</i>	254
<i>Tachycineta albiventer</i>	255
<i>Microcerculus marginatus</i>	256
<i>Campylorhynchus turdinus</i>	257
<i>Pheugopedius genibarbis</i>	258
<i>Cyphorhinus arada</i>	259
<i>Ramphocaenus melanurus</i>	260
<i>Turdus amaurochalinus</i>	261
<i>Turdus albicollis</i>	262
<i>Euphonia chlorotica</i>	263
<i>Euphonia laniirostris</i>	264
<i>Ammodramus aurifrons</i>	265
<i>Arremon taciturnus</i>	266
<i>Psarocolius angustifrons</i>	267
<i>Psarocolius decumanus</i>	268
<i>Psarocolius bifasciatus</i>	269
<i>Cacicus solitarius</i>	270
<i>Cacicus cela</i>	271
<i>Icterus cayanensis</i>	272
<i>Icterus pyrrhopterus</i>	273
<i>Molothrus oryzivorus</i>	274
<i>Lamprosar tanagrinus</i>	275
<i>Basileuterus culicivorus</i>	276
<i>Habia rubica</i>	277
<i>Cyanoloxia rothschildii</i>	278
<i>Chlorophanes spiza</i>	279
<i>Hemithraupis guira</i>	280
<i>Loriotus luctuosus</i>	281
<i>Eucometis penicillata</i>	282
<i>Volatinia jacarina</i>	283
<i>Ramphocelus carbo</i>	284
<i>Lanio versicolor</i>	285
<i>Cyanerpes caeruleus</i>	286
<i>Cyanerpes cyaneus</i>	287
<i>Tirsinia viridis</i>	288
<i>Dacnis cayana</i>	289
<i>Sporophila caeruleascens</i>	290
<i>Saltator maximus</i>	291
<i>Coereba flaveola</i>	292
<i>Cissopis leverianus</i>	293
<i>Stilpnia nigrocincta</i>	294
<i>Tangara mexicana</i>	295
<i>Tangara chilensis</i>	296
<i>Tangara schrankii</i>	297
<i>Thraupis sayaca</i>	298
<i>Thraupis palmarum</i>	299
Lista de aves registradas en el área de conservación Loma Santa	300
Bibliografía	308

Presentación

El Área de Conservación del Patrimonio Histórico, Cultural, Social y Espiritual Loma Santa, es el resultado de la decisión autónoma de los pueblos que habitan el Territorio Indígena Multiétnico (TIM) y está basada en los valores y la relación de estos pueblos con su territorio y los bienes naturales comunes existentes en él.

Esta área fue creada por el Gobierno Indígena Autónomo del TIM por mandato de la Subcentral de Cabildos TIM y la Subcentral de Mujeres TIM. El nombre de "Loma Santa" evoca el proceso de búsqueda de un lugar libre de sometimiento, donde hubiera paz, alimento, salud y dignidad de los pueblos del Gran Mojos frente a la persecución desatada por los patrones caucheros y hacendados ganaderos para someterlos física y culturalmente.

El buen estado de conservación de Loma Santa es reflejado a través de la diversidad de especies y familias de aves que no solo embellecen el paisaje con sus cantos y colores, sino que también cumplen funciones ecológicas fundamentales para el equilibrio del ecosistema y tienen un significado e importancia cultural, espiritual y de subsistencia en las comunidades indígenas del TIM.

La presente guía ha sido elaborada con el objetivo de facilitar el reconocimiento, monitoreo y apreciación de las aves que habitan en esta área protegida, especialmente por parte de todos los habitantes, los guardabosques, comunarios y estudiantes de las comunidades del TIM. Busca promover los saberes de las comunidades indígenas, al incluir los nombres comunes de aves en la lengua T'simane y Mojeño-trinitario.

El contenido de esta guía se basa en un estudio realizado entre los años 2024 y 2025, abarcando tanto la época seca como la húmeda de Loma Santa, lo que ha permitido documentar especies y registrar sus patrones de comportamiento a lo largo de las estaciones. La investigación fue desarrollada con un enfoque participativo, integrando conocimientos científicos y saberes locales, en un esfuerzo por fortalecer la gestión comunitaria del territorio y fomentar la educación ambiental.

Cada ficha descriptiva contiene información básica sobre su aspecto, hábitat, comportamiento y presencia estacional. Además, se incluyen ilustraciones que facilitan su identificación en el campo y estado de conservación.

Como ORÉ, esperamos que este material se convierta en una herramienta práctica para el trabajo diario de los guardabosques, una fuente de aprendizaje para los estudiantes, un medio para que las comunidades se conecten aún más con su entorno natural y un ejemplo del ejercicio de la gobernanza territorial y ambiental.

Introducción

Bolivia es reconocida como uno de los países con mayor diversidad biológica del planeta y, en particular, se destaca por su extraordinaria riqueza en avifauna. Es el quinto país más diverso en aves de América y el sexto a nivel mundial, a pesar de ser una nación sin litoral marítimo. De acuerdo con la Guía de las Aves de Bolivia (Herzog et al., 2021), el país cuenta con 1.435 especies registradas. En los últimos años, este número ha incrementado, alcanzando aproximadamente 1.450 especies gracias a nuevos registros documentados en diversos estudios (Montenegro et al., 2023; Els et al., 2023; Aponte et al., 2022; Lane et al., 2021).


El departamento del Beni, ubicado en el norte del país, es una de las regiones más importantes y poco estudiadas para la conservación de aves en Bolivia. Según los datos del portal eBird, se han reportado 869 especies, entre las cuales predominan las especies residentes, además de un número considerable de aves migratorias boreales y australes. Beni también alberga especies endémicas de gran relevancia para la conservación, como el tororoí riberalteño (*Hylopezus auricularis*), la paraba barba azul (*Ara glaucogularis*) y el zorzal (*Turdus haplochrous*), todas con distribución restringida y alto valor ecológico.

12

Dentro de este departamento se encuentra el Territorio Indígena Multiétnico (TIM), una autonomía indígena conformada por los pueblos Mojeño-Trinitario, Mojeño-Ignaciano, Yuracaré, T'siman y Movima. Este territorio se caracteriza por su riqueza biológica, cultural y espiritual, albergando ecosistemas que sustentan una gran diversidad de flora y fauna. En el año 2024, el Gobierno Autónomo Indígena del TIM promulgó la Ley de creación del **Área de Conservación del Patrimonio Histórico, Cultural, Social y Espiritual Loma Santa**, destinada a la protección de sus valores naturales y culturales, y que constituye un refugio vital para la avifauna regional.

La presente guía de aves surge como parte de los esfuerzos por documentar y valorizar la diversidad biológica del Área de Conservación Loma Santa. Con el apoyo de la iniciativa Conserva Aves, se realizó un estudio detallado que permitió registrar 279 especies de aves, distribuidas en 25 órdenes y 57 familias, siendo la familia Tyrannidae la más diversa con 44 especies.

Esta guía busca contribuir al conocimiento, valoración y conservación de las aves del Territorio Indígena Multiétnico, promoviendo la integración del saber científico con la cosmovisión y el conocimiento tradicional de los pueblos que habitan esta región. Asimismo, pretende servir como una herramienta educativa y de gestión que fortalezca las iniciativas locales de conservación y el manejo sostenible de la biodiversidad en el país.



I Sobre la guía

Especies presentadas

Todas las especies de aves en la presente guía son especies que fueron registradas en las diferentes localidades visitadas del Área de Conservación Loma Santa, durante un estudio ornitológico llevado a cabo durante la época seca y húmeda, y en una gran variedad de hábitats presentes. De toda la información generada, se obtuvieron datos de las diferentes especies, tanto de aquellas residentes y como también de las especies migratorias que usan el área de conservación como sitio de descanso en sus rutas, llegando a conocer de igual manera la importancia de éstas para los pobladores de las diferentes localidades.

Taxonomía

Las especies y la taxonomía de los nombres científicos se basó en la propuesta de Herzog, 2021 (Birds of Bolivia updated species list - versión 15 July 2021), siendo una adecuación para las aves de Bolivia de las taxonomías propuestas por la SACC (South American Classification Committee). De igual manera para ciertas especies se utilizaron los nombres comunes en la lengua T'simane y Mojeño-Trinitario, y para aquellas otras especies que no se conocen los nombres comunes se utilizaron los propuestos en la guía de aves de Bolivia (Herzog *et al.* 2017).

14

Información de las especies de aves

La información obtenida para las características de las especies de aves presentadas a continuación fue una recopilación de diferentes fuentes (portales y/o páginas web), como ser: <https://birdsofbolivia.org>, <https://birdsoftheworld.org> y <https://birdscolumbia.com>, información sobre la distribución continental de las diferentes especies de aves, características morfológicas, hábitat, reproducción y estado de conservación.

Especies residentes

Son aquellas especies de aves, que se reproducen en el país y que permanecen todo el año dentro del territorio nacional y no se desplazan hacia otras áreas como lo hacen las especies de aves consideradas migratorias.

Migración

Cada primavera y otoño, el cielo nocturno ofrece un espectáculo protagonizado por millones de aves que emprenden un largo y arriesgado viaje desde sus sitios de reproducción a las áreas de veraneo y viceversa. Esta migración anual ocurre, principalmente durante la noche, cuando las corrientes de viento son más suaves, y la luna y las estrellas sirven de guía. Las aves suelen seguir rutas migratorias establecidas, por lo general, rutas de norte a sur con lugares propicios para descansar y reponer energías en el camino. Varias especies de aves comparten estas rutas y deben hacer frente al mal tiempo, la deshidratación, el hambre y los depredadores. La migración es una parte integral del ciclo de vida de las aves. Entender por qué algunas aves migran y otras no requiere de un gran trabajo de investigación. Generalmente, se cree que la búsqueda de comida es el motivo principal. Otras razones podrían ser esquivar las inclemencias del tiempo y alejarse de los depredadores o parásitos, especialmente durante la temporada de reproducción. En Bolivia, alrededor de 97 especies son conocidas por realizar movimientos migratorios

Especies migrantes australes

Varias especies de tiránidos (Tyrannidae) de los géneros *Lathrotriccus*, *Tyrannus*, *Empidonomus*, *Elaenia* y *Myiodynastes*, entre otros, se reproducen al sur del Trópico de Capricornio, que corresponde a la región sur de Argentina y Chile. Estas aves migran hacia el norte del Trópico de Capricornio invernando en regiones que van desde solo el norte de Argentina y Chile, Paraguay, Uruguay, el sur de Brasil y el sur de la Amazonia, llegando a migrar hasta la región norte de la Amazonia en Colombia y Venezuela. Especies como la tijereta (*Tyrannus savana*), migran a lo largo de la región altoandina hacia el norte de Argentina, Chile, Bolivia y Perú. La migración está asociada a la época de invierno para esta región del continente sudamericano y por eso estas especies se desplazan hacia áreas más cálidas.

Migradores boreales

La migración boreal de las aves en el hemisferio norte es la mejor estudiada y comprendida. Debido a las condiciones extremas de frío y falta de alimentos, la mayoría de las aves que se reproducen en latitudes más septentrionales son migrantes casi obligados. Solo un puñado de especies son residentes permanentes manteniendo un territorio durante todo el ciclo anual.

La migración de aves en el hemisferio norte es mayormente de norte a sur y viceversa; específicamente de Estados Unidos y Canadá hacia el sur. Los destinos finales o regiones de invernada de las aves migratorias que se reproducen en el hemisferio norte incluyen regiones que van desde la región sur de los Estados Unidos, todo México, Centroamérica, hasta el sur de Sudamérica. Algunas de estas especies son conocidas por recorrer aproximadamente 10.000 kilómetros hacia el sur del continente, y de esta manera, una considerable población llega temporalmente a Bolivia.

Estado de conservación

En Bolivia existen numerosas especies de aves que se encuentran bajo distintos grados de amenaza de extinción, según los criterios establecidos en los Apéndices Nacionales de la Lista Roja de Vertebrados de Bolivia (LRVB) y en las categorías internacionales de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Estos sistemas de clasificación permiten evaluar el riesgo de desaparición de una especie a partir de factores como el tamaño poblacional, la distribución geográfica y las presiones antrópicas.


Un ejemplo es la paraba barba azul (*Ara glaucogularis*), endémica del Beni, catalogada como Críticamente Amenazada (CR) tanto a nivel nacional como internacional. Esta categoría indica que la especie enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.


Cada especie de ave cumple roles ecológicos esenciales, como la dispersión de semillas, el control de poblaciones de insectos o la polinización, contribuyendo al equilibrio y funcionamiento de los ecosistemas. Su conservación no solo asegura la supervivencia de la avifauna, sino que también mantiene los servicios ambientales de los cuales dependen directamente las comunidades humanas.

Partes de las aves

16

Para el uso pleno de la guía, es importante conocer las diferentes partes de las aves en cuanto a su descripción morfológica externa, por ello presentamos estas figuras de las partes más sobresalientes.





© avesdeperu.org

Láminas descriptivas

En esta sección se presentan figuras, mapas y descripciones breves de 279 especies de aves registradas en el Área de Conservación Loma Santa.

Cada lámina incluye el nombre común, el nombre científico, u otros nombres en alguno de los idiomas de los pueblos del TIM, además de datos puntuales de distribución, estado de conservación, descripción de la especie, hábitat y biología, amenazas y bibliografía.

FAMILIA COLUMBIDAE

Torcaza escamada (*Patagioenas speciosa*)

Nombre Tsimane: -
Nombre Mojeño-trinitario: -
Otros nombres: Torcaza escamada y Scaled Pigeon

Clase: Aves
Orden: Columbiformes

♂ Macho: 28-34 cm, hembra: 29-32 cm

Distribución continental: S. de México, Centroamérica y N. de Sudamérica hasta E. de Perú, N y E de Bolivia y S. de Brasil.

Distribución Nacional: Beni, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Puerto Gerardo, Jorori, Pto. Salas, Rosario de Tacuaral y Chitisi.

Ecorregiones: Amazonia, Corrado, Chiquitania y Yungas.

• LRVC: No enlistada.
• IUCN: NT = Menor Riesgo
• CITES: No enlistada
• Residente: Si
• Migrante: No

Hábitat y Biología: Poco común a localmente común en bosque húmedo siempreverde a semihúmedo, bordes de bosques y claros con árboles altos de tierras bajas del norte, ocupa el borde de la selva tropical, bosque de galería y también se da en zonas abiertas de bosque y sabana con árboles. Sobre su biología se conoce que el nido consiste en una plataforma ligeramente cóncava de finas ramitas e inflorescencias colocadas en matorrales a 45-60 cm sobre el nivel del suelo, curiosamente, aunque esta especie tiende a frecuentar las copas de los árboles, los nidos suelen colocarse bajos.

Amenazas generales en toda su área de distribución: No está globalmente amenazada (Menor Riesgo). Es una especie bastante común en su área de distribución. Las posibles amenazas incluyen la deforestación y la caza, sin embargo, su amplia distribución la hace más segura. Se requiere investigación en el país para conocer su estado poblacional.

BIBLIOGRAFÍA

• Baptista, L. F., P. W. Trank, H. M. Hordick, and P. F. D. Boersman (2020). Scaled Pigeon (*Patagioenas speciosa*), version 1.0. In *Birds of the World* (D. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.spspec01>

• Harpaz, S. K., Tenill, D. S., Jahn, A. E., Reinsen, Jr. J. V., Mailand O., Garcia-Solis, V. H., MacLeod, B., McCormick, A. A. Votz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra. Asociación Armonía.

• <https://birdsforbolivia.org/fichas-tecnicas/aves-and-pigeons-palomos-y-torlas/patagioenas-speciosa/>

• IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>

• Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua. La Paz, Bolivia. 571 pp.

• UNEP-WCMC (Comps) 2025. Checklist of CITES species - CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEP-WCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Figuras y mapas

Las diferentes figuras de las especies de aves en Bolivia presentadas en esta guía son una colaboración de la Asociación Civil Armonía, a quienes agradecemos por permitirnos usar esta valiosa información de las aves en la presente guía y así promover el conocimiento de las aves del área de conservación Loma Santa.

De igual manera, los mapas presentados son muy importantes para conocer la distribución de las especies en el país. El color de cada uno nos puede indicar si una especie es residente o migratoria, toda esta información es obtenida de la guía de aves de Bolivia (Herzog et al., 2017) y está bajo las siguientes leyendas.

Mapa color Naranja: Para especies residentes y se encuentran durante todo el año en el país.

Mapa color Verde: Migrante Austral o intratropicales que se reproducen en Sudamérica e invernan en Bolivia, visitantes no reproductivos.

Mapa color Azul: Especies de aves Migrantes Boreales que llegan al país provenientes de Canadá y Estados Unidos, y se encuentran durante la primavera.

Mapas color Café: Para aquellas especies con migración Austral parcial y están en Bolivia como residentes reproductivos y visitante invernales.

18

Glosario

Caducifolio: Dicho de un árbol o de una planta, de hoja caduca, que se le cae al empezar la estación desfavorable.

Coexiste: Se refiere a la presencia simultánea de dos o más elementos, ya sean personas o especies, en el mismo tiempo y espacio.

Coberteras auriculares: Son unas plumas pequeñas situadas detrás del ojo de un ave que cubren la abertura de la oreja.

Comprimido: Estrechado lateralmente o aplastado de los lados

Conspicuas: Ilustre, visible, sobresaliente (notoriamente).

Dicromatismo sexual: Diferencia de coloración entre machos y hembras de la misma especie.

Dimorfismo sexual: Diferencias físicas notables que presentan machos y hembras de la misma especie en tamaño, coloración o forma.

Envergadura: Distancia entre los extremos de las alas de un ave completamente extendidas.

Generalista: Usa una gran diversidad de hábitat.

Gular: Garganta.

Hiperhúmedo: Se refiere a una categoría climática con precipitación anual muy alta.

Leonados: Dicho de un color: Amarillo rojizo, como el del pelo del león.

Marrón: Dicho de color, semejante al del chocolate o al color café.

Motas: Puntos.

Obispillo: Parte de la anatomía de las aves inmediatamente superior a la cola.

Píleo: Parte superior de la cabeza de las aves.

Polimorfo: Que tiene o puede tener distintas formas.

Remeras: Dicho de una pluma de ave: Grande y larga, y situada en el extremo del ala.

Rufo: Denominación del color rojizo

Subterminal: Hace referencia a algo que está ubicado "debajo de la terminal" o "en una posición anterior a la terminal", pero sin llegar a ser el extremo final.

Supercilia: Es una franja que se extiende desde la base del pico, por encima del ojo, y termina en algún punto hacia la parte posterior de la cabeza.

Supraloreal: Parte de la cabeza de un ave, específicamente la región por encima del lorum (la zona cerca del pico) y debajo de la línea superciliar (ceja).

Timoneras: Dicho de una pluma: grande, de la cola, y que sirve al ave para dirigir su vuelo


Vermiculaciones: Patrón superficial de líneas densas pero irregulares, al modo de asemejarse a pequeños gusanos.

Perdiz gris (*Tinamus tao*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Macuca, Gray tinamu.



- **Clase:** Aves
- **Orden:** Tinamiformes



Distribución continental:

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, La Paz, Cochabamba, Pando y Santa Cruz.

Ecorregiones: Amazonia (Bosque de tierra firme), Bosque Boliviano-tucumano, Yungas y excepcionalmente en la Chiquitania.

- **LRVB: NT:** Casi Amenazado
- **IUCN: VU:** Vulnerable
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** De hábito terrestre y arisco, casi siempre intenta pasar desapercibido alejándose calladamente, caminando, pero si se lo sorprende se levanta y vuela de manera ruidosa por el aleteo de sus alas. Frecuentemente en bosque amazónico de tierra firme, coloca de 2 a 9 huevos de color azul verdoso. Tiene un canto que es más probable oírlo en las mañanas o al atardecer.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** La pérdida y degradación de su hábitat, en particular esta especie de perdiz se encuentra entre las aves más presionadas por ser una fuente de alimento por su gran tamaño al igual que algunos Cracidos (Pavas).

Mapa: Asociación Civil Armonía

• Cabot, J., F. Jutglar, E. F. J. Garcia, P. F. D. Boesman, and C. J. Sharpe (2025). Gray Tinamou (*Tinamus tao*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.grytin1.01>

• Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., Maccormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía.

• <https://birdsofbolivia.org/es/tinamus-tao/>

• IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <<https://www.iucnredlist.org>>

• Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

• UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025


Perdiz grande (*Tinamus major*)

Nombre T'simane: Fofor

Nombre Mojeño-trinitario: Sororo'í

Otros nombres: Perdiz grande y Great Tinamou

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Tinamiformes

**Distribución continental:**

SE México a Panamá; NO Venezuela, O Colombia y O Ecuador; S Venezuela y Amazonia S a C Bolivia.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Ecorregiones: Amazonia (Bosque de tierra firme), Yungas y excepcionalmente en la Chiquitania.

- **LRVB:** NT: Casi Amenazado
- **IUCN:** LC: Preocupación menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Poco común a bastante común en la Amazonía, principalmente en bosque de várzea y ribereño, y en bosque húmedo del piedemonte. Prefiere bosque alto, pero ocasionalmente en matorral secundario denso. Temporada principalmente enero-julio. El nido en el suelo entre las raíces de los árboles grandes, y con una depresión revestida de grandes hojas muertas. Nidada normalmente de 3-6 huevos de color azul verdoso intenso, turquesa o violeta; incubación a cargo del macho.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No está globalmente amenazada. Actualmente considerada en la categoría de Preocupación Menor basándose en un modelo de deforestación futura en la cuenca del Amazonas y en la sensibilidad de esta especie a la fragmentación del hábitat y a la caza. Se prevé que su población disminuya significativamente en las próximas dos décadas.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Cabot, J., F. Jutglar, E. García, P. F. D. Boesman, and C. J. Sharpe (2020). Great Tinamou (*Tinamus major*), version 1.0. In *Birds of the World* (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.gretin1.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., Maccormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía.
- <http://birdsofbolivia.org/es/tinamus-major/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Perdiz ceniza (*Crypturellus cinereus*)

Nombre T'simane: Shó

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Perdiz ceniza y Cinerus Tinamou



- **Clase:** Aves
- **Orden:** Tinamiformes



Distribución continental: E de Colombia. E a S de Venezuela, las Guayanas y NC de Brasil, y S a NC de Bolivia (N de Cochabamba).

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Ecorregiones: Amazonia (Bosque de tierra firme), Yungas y Chiquitania.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

23

① **Hábitat y Biología:** Bastante común a común en la Amazonía, principalmente en bosque de várzea y ribereño, aunque también en bosque de tierra firme y bosque secundario. Se reproduce principalmente en agosto-octubre. No construye nido, coloca los huevos en la vegetación densa del suelo del bosque. Pone normalmente de dos huevos, de color salmón-violeta o chocolate con leche; no hay información sobre el período de incubación.

② **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No está globalmente amenazada. Relativamente común en la mayor parte de su área de distribución. Como muchas otras especies, el hábitat de las perdices está amenazado por la destrucción de los bosques amazónicos. También es objeto de caza en toda su área de distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía

• Cabot, J., D. A. Christie, F. Jutglar, and C. J. Sharpe (2020). Cinereous Tinamou (*Crypturellus cinereus*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.cintin1.01>.

• Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., Maccormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía.

• <https://birdsofbolivia.org/es/crypturellus-cinereus>.

• IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

• Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

• UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Fon fon (*Crypturellus undulatus*)

Nombre T'simane: Fofe

Nombre Mojeño-trinitario: Cochpokó'í

Otros nombres: Fon fon y Undulated Tinamou

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Tinamiformes



De tamaño mediano, con pico bastante largo y curvado en la punta; pico negruzco, gris en la base

Tiene la frente y la corona tiznadas de hollín, divididas en la parte posterior de la corona en barras o motas sobre un color de fondo entre marrón arenoso y rufo

Iris marrón rojizo intenso, puede parecer oscuro

28-32cm; macho y hembra.

Patas grisáceas a amarillo-oliva

La garganta son blancas, el pecho parece más liso y más pálido que el cuello, el resto de las partes inferiores y los muslos son de color beige con barras

Hábitat y Biología: Bastante común a común en bosque de várzea, ribereño, galería y ripario, incluyendo bordes y bosques secundarios en regiones secas y húmedas de tierras bajas; la perdiz más común de tierras bajas no amazónicas; menos común en el piedemonte y a lo largo de ríos en valles secos interandinos. Prefiere bosques con densa vegetación herbácea. Se conoce datos de reproducción entre Noviembre Febrero, nido en el suelo y coloca de 4-5 huevos, de coloraciones rosa pálido, rosa vinoso o ceniza pálido.

Amenazas generales en toda su área de distribución: No está globalmente amenazada, LC = Preocupación Menor. Generalmente común en llanuras aluviales, várzea y bosque de galería en toda la Amazonia, donde su canto fácilmente identificable es un sonido característico.

Mapa: Asociación Civil Armonía


- Cabot, J., D. A. Christie, F. Jutglar, and C. J. Sharpe (2020). Undulated Tinamou (*Crypturellus undulatus*), versión 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.undtin1.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/crypturellus-undulatus>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEP-WCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Perdiz chica (*Crypturellus soui*)

Nombre T'simane: Firi

Nombre Mojeño-trinitario: Panec'rogi

Otros nombres: Perdiz chica y Little Tinamou



Distribución continental: S México al O y N de Colombia, O de Ecuador y N de Venezuela; en toda Amazonia y ladera E de los Andes en el S a C Bolivia; E de Brasil.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Ecorregiones: Amazonia, Yungas y en la Chiquitania.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Bastante común a común en una variedad de bosques de la Amazonía y Yungas inferiores; prefiere bordes de bosque, bosque de bordes de río y secundarios y arbustales con sotobosque denso. La temporada reproductiva varía regionalmente. El nido se coloca directamente sobre hojas caídas en medio de una densa vegetación oculta. La nidada suele ser compartido el cuidado, Los huevos son brillantes y de color púrpura. Las crías abandonan el nido menos de un día después de nacer.

Amenazas generales en toda su área de distribución: No está amenazado a nivel mundial, con una clasificación de estado de conservación en la Lista Roja de la UICN de Preocupación Menor. No se han evaluado las tendencias globales de su población, pero se cree que se encuentra en buen estado. La principal amenaza a la que se enfrentan estas aves es la destrucción de su hábitat. Es necesario realizar un seguimiento para determinar el estado de las poblaciones.

Mapa: Asociación Civil Armonía

• Dema L. T., M. F. Ramos-Ordoñez, R. Bribiesca-Formisano, C. I. Rodríguez-Flores, C. A. Soberanes-González, and M. d. C. Arizmendi (2020). Little Tinamou (*Crypturellus soui*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.littin1.01>.

• Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., Maccormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía.

• <https://birdsofbolivia.org/es/crypturellus-soui>.

• IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

• Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

• UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Pato ala blanca (*Cairina moschata*)

Nombre T'simane: Pato

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Pato ala blanca, Pato negro y Muscovy Duck



- **Clase:** Aves
- **Orden:** Anseriformes



Distribución continental: S México al O y N de Colombia, O de Ecuador y N de Venezuela; en toda Amazonia y ladera E de los Andes en el S a C Bolivia; E de Brasil.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Ecorregiones: Amazonia, Yungas y en la Chiquitania.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Raro a bastante común en una variedad de hábitats acuáticos de tierras bajas, incluyendo pantanos, cochas, lagunas, arroyos, ríos y campos inundados. Solitario, en parejas o bandadas pequeñas; cauteloso por cacería. Regularmente posa en árboles. Aunque la temporada reproductiva es variable, el pato real suele criar durante la estación húmeda local. Anida en árboles huecos, cuevas o en pequeñas cavidades con revestimiento de plumón, a veces anida en la vegetación densa de las orillas de los arroyos. El tamaño de nidada es de 8-15 huevos, son ovalados, de color blanco a blanco verdoso.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** Tiene una distribución muy amplia; a pesar de las disminuciones locales de la población o incluso la extirpación regional, esta especie no está amenazada a nivel mundial y su estado de conservación en la Lista Roja de la UICN es de Preocupación Menor.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Eitnienar, J. C., R. Bribiesca-Formisano, C. I. Rodríguez-Flores, C. A. Soberanes-González, and M. d. C. Arizmendi (2020). Muscovy Duck (*Cairina moschata*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.muscduc.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía.
- <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/ducks-geese/cairina-moschata>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Guaracachi (*Penelope jacquacu*)

Nombre T'simane: emei

Nombre Mojeño-trinitario: Takuro

Otros nombres: Pava coto coloraua, Guaracachi y Spix's Guan



Distribución continental:

Surinam, Guayana, E de Venezuela, Amazonia S el O de Brasil, E de Colombia, E de Ecuador, Perú y N de Bolivia.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Ecorregiones: Amazonia, Yungas, Valles secos y en la Chiquitania.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

① **Hábitat y Biología:** La pava típica de la Amazonía. Poco común a bastante común en una variedad de bosques en la Amazonía, Chiquitania norte y Yungas inferiores, localmente también en bosque seco interandino y bosque de galería de los Llanos de Moxos. Forrajea en el suelo o en árboles, solitaria o en grupos pequeños. Su época reproductiva comienza en agosto-septiembre se han encontrado nidos y volantones en noviembre-febrero. Su nido es principalmente de hojas. Coloca 2-3 huevos blancos. No hay información publicada sobre los períodos de incubación o de salida del nido.

② **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No está globalmente amenazada (Preocupación Menor). Común en muchas partes de su área de distribución, excepto en zonas densamente pobladas o donde se ha talado el bosque. En las zonas pobladas ha cambiado sus hábitos, volviéndose más tímida.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- del Hoyo, J. and G. M. Kirwan (2020). Spix's Guan (*Penelope jacquacu*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.spigua1.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía.
- <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/guans-and-chachalacas-pavas-y-afines/penelope-jacquacu/>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Pava campanilla (*Pipile grayi*)

Nombre T'simane: Touij

Nombre Mojeño-trinitario: Jivi

Otros nombres: Pava campanilla y White-throated Piping-Guan


Una corona blanca con estrías y una mancha blanca con barras negras en las coberteras alares superiores externas

grayi

El color de la piel facial péndula y desnuda varía del blanco al azul cobalto.

Pava de tamaño mediano, de color blanco y negro, mayoritariamente negro con un brillo verdoso

cumanensis



- **Clase:** Aves
- **Orden:** Galliformes

**Distribución continental:**

Extremo sureste de Perú, centro-norte amazónico y este de Bolivia, suroeste de Brasil y norte de Paraguay.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz.

Ecorregiones: Amazonia, Yungas, Valles secos, Cerrado, Chaco y en la Chiquitania.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Casi amenazado
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Poco común a común en bosque amazónico de tierra firme y ribereño o en una variedad de bosques semi a hiper húmedos de tierras bajas y ladera este inferior de los Andes norte y centrales. En los Andes casi siempre encontrada a lo largo de ríos. Prefiere bosque no modificado. En parejas o grupos pequeños, ocasionalmente hasta 10 o más; principalmente arbórea. No se sabe casi nada de esta especie, los pocos datos de los nidos, son al estar situados en el denso dosel, sólo se encuentran en raras ocasiones.

Amenazas generales en toda su área de distribución: Actualmente considerada. Casi Amenazada. Común en toda la región del Pantanal. La especie sigue siendo razonablemente numerosa en Bolivia, a pesar de la presión de la caza, en el norte de Bolivia, se da con una densidad muy alta de 17 individuos/km². Se caza para el consumo alimentario local, también sufre en algunos lugares la destrucción del hábitat, principalmente para la agricultura y la tala, aunque aparentemente tolera hábitats muy modificados

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía.
- <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/guans-and-chachalacas-pavas-y-afines/pipile-cumanensis/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Kirwan, G. M., J. del Hoyo, N. Collar, D. A. Christie, and C. J. Sharpe (2022). White-throated Piping-Guan (*Pipile*

grayi), version 1.0. In Birds of the World (B. K. Keeney, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.butpig2.01>.

- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Pava guaraca (*Ortalis guttata*)

Nombre T'simane: Marase

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Pava guaraca y Speckled Chachalaca



- **Clase:** Aves
- **Orden:** Galliformes



- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

29

❗ **Hábitat y Biología:** Poco común a común en una variedad de bosques (incluyendo bordes) y arbustales de tierras bajas y ladera este inferior de los Andes norte y centrales. Generalmente en grupos y ruidosos; principalmente arbórea. Su voz fuerte viaja lejos; vocaliza con mayor frecuencia al amanecer. Poco conocida, se han observado nidos y volantones de la especie en noviembre-marzo y se encontró un nido con huevos en noviembre. Puesta reportada de 3-4 huevos, blancos.

🛡️ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No está globalmente amenazada (Preocupación Menor). Común en muchas partes de su área de distribución, incluso en zonas densamente pobladas; Parece tolerar bastante bien la actividad humana.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., Maccormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía.
- <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/guans-and-chachalacas-pavas-y-afines/ortalis-guttata/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Kirwan, G. M., J. del Hoyo, N. Collar, and D. A. Christie (2020). Speckled Chachalaca (*Ortalis guttata*), version 1.0. In Birds of the World (S. M. Billerman, B. K. Keeney,

- P. G. Rodewald, and T. S. Schulenberg, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.specha3.01>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Pava mutún (*Mitu tuberosum*)

Nombre T'simane: Opaj

Nombre Mojeño-trinitario: Chuni o Ku'i

Otros nombres: Pava mutún y Razor-billed Curassow

• **Clase:** Aves• **Orden:** Galliformes**Distribución continental:**

Desde el sureste de Colombia, norte y centro de Bolivia, y al este de Brasil, al sur del Amazonas y extremo oriental de Perú.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Ecorregiones: Amazonia, Yungas, Valles secos, Cerrado y en la Chiquitania.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** = Casi Amenazado
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

30

❗ **Hábitat y Biología:** La pava más común y de mayor distribución de Bolivia, pero mayormente raro a poco común debido a la cacería. Habita en una variedad de bosques semi a hiperhúmedos de tierras bajas norte, del piedemonte y Yungas inferiores. Solitario o en parejas, ocasionalmente en grupos pequeños. Terrestre y arbórea. Un nido en forma de "una taza redonda perfecta", construida con ramas, lianas y hojas, y colocada a 1,6 m del suelo. La puesta es de 2-3 huevos. se reportan nidos y volantones de noviembre a febrero.

⚠️ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** Tiene una distribución geográfica muy amplia, aunque se cree que la tendencia de la población es al declive, el estado de esta especie en la Lista Roja de la UICN es de Casi Amenazado, es muy cazado como alimento. Además, se utiliza como símbolos religiosos y con fines medicinales.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía.
- <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/guans-and-chachalacas-pavas-y-afines/mitu-tuberosum/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia.

Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

- Udoye, K. C. and T. S. Schulenberg (2020). Razor-billed Curassow (*Mitu tuberosum*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.rabcur.2.01>
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEP-WCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.


Codorniz estrellada (*Odontophorus stellatus*)

Nombre T'simane: Brofe

Nombre Mojeño-trinitario: Truworu

Otros nombres: Codorniz estrellada y Sterred Wood-Quail

Cresta grande castaño
rufo; cabeza y cuello
gris ceniza; ojeras
amarillas a veces
tiene motas blancas
en el superciliar. Color
general marrón a rufo



- **Clase:** Aves
- **Orden:** Galliformes



Distribución continental: E de Ecuador, E de Perú y O de Brasil (S del Amazonas, E al R de Madeira y más allá) S al NO y NE de Bolivia.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Piñal, Puerto Gerardo y Rosario de Tacuaral.

Ecorregiones: Amazonia y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Poco común a localmente común en bosque amazónico de tierra firme y transicional; menos frecuente en bosque de várzea; localmente en bosque húmedo del piedemonte generalmente en grupos familiares, difícil de ver, mayormente escuchada. Se conoce de muy pocos datos, pero el nido es la típica estructura abovedada en el suelo con un pequeño orificio de entrada, los huevos son blancos y se han encontrado pichones en noviembre y febrero.

🌐 **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No está globalmente amenazada (Menor Riesgo). Se dispone de muy poca información; la población total podría superar las 750.000 aves. Las posibles amenazas incluyen la deforestación y posiblemente la caza; sin embargo, su distribución aislada probablemente la hace más segura que la mayoría de los otros miembros de *Odontophorus*. Se requiere investigación.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía.
- <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/tinamous-perdices/odontophorus-stellatus/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio

de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

- Carroll, J. P. and G. M. Kirwan (2020). Starred Wood-Quail (*Odontophorus stellatus*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.stwqua1.01>.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.


Torcaza escamada (*Patagioenas speciosa*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Torcaza escamada y Scaled Pigeon

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Columbiformes



Bolivia

Distribución continental: S de México, Centroamérica y N de Sudamérica hasta E de Perú, N y E de Bolivia y S de Brasil.

Distribución Nacional: Beni, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Puerto Gerardo, Jorori, Pto. Salas, Rosario de Tacuaral y Chirisi.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chiquitania y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** = Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

32

Hábitat y Biología: Poco común a localmente común en bosque húmedo siempreverdes a semihúmedo, bordes de bosques y claros con árboles altos de tierras bajas del norte, ocupa el borde de la selva tropical, bosque de galería y también se da en zonas abiertas de bosque y sabana con árboles. Sobre su biología se conoce que el nido consiste en una plataforma ligeramente cóncava de finas ramitas e inflorescencias colocadas en matorrales a 45-60 cm sobre el nivel del suelo; curiosamente, aunque esta especie tiende a frecuentar las copas de los árboles, los nidos suelen colocarse bajos.

Amenazas generales en toda su área de distribución: No está globalmente amenazada (Menor Riesgo). Es una especie bastante común en su área de distribución. Las posibles amenazas incluyen la deforestación y la caza; sin embargo, su amplia distribución la hace más segura. Se requiere investigación en el país para conocer su estado poblacional.

Mapa: Asociación Civil Armonía


- Baptista, L. F., P. W. Trail, H. M. Horblit, and P. F. D. Boesman (2020). Scaled Pigeon (*Patagioenas speciosa*), version 1.0. In Birds of the World [J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors]. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.scapig2.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía.
- <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/doves-and-pigeons-palomas-y-tortolas/patagioenas-speciosa/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Torcaza guascaflojo (*Patagioenas cayennensis*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Torcaza guascaflojo y Pale-vented Pigeon



Distribución continental:

Desde el sur de México hacia el sur hasta el norte de Argentina, Paraguay y el sur de Brasil.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando, Santa Cruz y Tarija.

Distribución en Loma Santa: Se encuentra en toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Boliviano-Tucumano, Chaco, Cerrado, Chiquitania, Valle y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❶ **Hábitat y Biología:** Rara a común en bosque y arbustales secos a húmedos, generalmente en hábitats de borde de bosque y las márgenes de lagos y ríos, en Bolivia se la ha registrado en bordes de bosque chiquitano, amazónico de tierra firme, montano húmedo y en pueblos y parques urbanos. Sus nidos son pequeños y frágiles, consisten en una endeble plataforma de ramitas delgadas construida a varios metros del suelo en marañas de lianas o árboles, los nidos pueden estar hasta a 15 m del suelo, el huevo es blanco.

Ⓜ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** Tiene un área de distribución extremadamente extensa, es común en toda su área de distribución y el tamaño de su población es extremadamente grande. En consecuencia, su estado de conservación en la IUCN se evalúa como de Menor Riesgo.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Chalkowski, K. (2020). Pale-vented Pigeon (*Patagioenas cayennensis*), version 1.0. In *Birds of the World* (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.pavpig2.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., Maccormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía.
- <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/doves-and-pigeons-palomas-y-tortolas/patagioenas-cayennensis/>

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Torcaza plumiza (*Patagioenas plumbea*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Torcaza plumiza y Plumbeous Pigeon

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Columbiformes

**Distribución continental:**

Bolivia, Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Paraguay.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.**Distribución en Loma Santa:**

Se encuentra en casi toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania, Valle y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** = Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Selva tropical y subtropical y bosque nuboso, frecuenta las copas de los árboles en los bosques altos de zonas frías. En Bolivia bastante común a común en una variedad de bosques secos a húmedos de la Amazonía, Chiquitania norte y Andes norte. Construye una plataforma su nido de palos gruesos a 5 m del suelo. Pone 1 huevo blanco. No se dispone de más información.

Amenazas generales en toda su área de distribución: No está globalmente amenazada (Menor Riesgo). Extendida y aparentemente bastante común en gran parte de su extensa área de distribución, aunque se según un modelo de deforestación futura en la cuenca del Amazonas, se espera que esta especie pierda entre el 16 y el 20 % del hábitat dentro de su distribución. Dado que también puede estar en peligro por la caza, se prevé que su población disminuya y suba el estado de conservación a Vulnerable.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Baptista, L. F., P. W. Trail, H. M. Horblit, P. F. D. Boesman, and C. J. Sharpe (2020). Ruddy Pigeon (*Patagioenas subvinacea*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.rudpig.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía.
- <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/doves-and-pigeons-palomas-y-tortolas/patagioenas-subvinacea/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEP-WCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Torcaza rojiza (*Patagioenas subvinacea*)


Nombre T'simane: Vojgojó

Nombre Mojeño-trinitario: Chope civi

Otros nombres: Torcaza rojiza y Ruddy Pigeon

De color rojizo apagado a
púrpura, las alas, el dorso
y la cola son generalmente
de color marrón oscuro

(*Patagioenas plumbea*)
es más grande y
también está extendida
por gran parte del norte
de Sudamérica, las dos
especies coexisten en
muchas localidades



Torcaza
de tamaño
mediano
(27-28 cm.),

Se identifican
más fácilmente
por su canto.

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Columbiformes



Distribución continental:

Ampliamente distribuida en el Neotrópico. desde Costa Rica hacia el sur prácticamente en todo Sudamérica, hasta el norte de Bolivia

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Se encuentra en toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❶ **Hábitat y Biología:** Habita frecuentemente en el dosel en bosques de altitud media a alta; también el borde del bosque y el crecimiento secundario. En Bolivia, es poco común a bastante común en bosques de la Amazonia, Chiquitania Norte y Yungas inferiores. Construye una plataforma nido de palos gruesos a 5 m del suelo. Pone 1 huevo blanco.

❷ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No está globalmente amenazada (Menor Riesgo). Extendida y aparentemente bastante común en gran parte de su extensa área de distribución, aunque se carece de detalles precisos de sus poblaciones.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Baptista, L. F., P. W. Trail, H. M. Horblit, and P. F. D. Boesman (2020). Plumbeous Pigeon (*Patagioenas plumbea*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.plupig2.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía.
- <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/doves-and-pigeons-palomas-y-tortolas/patagioenas-plumbea/>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Paloma perdiz roja (*Geotrygon montana*)

Nombre T'simane: Pajshá

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Paloma perdiz roja y Ruddy Quail-Dove

• **Clase:** Aves• **Orden:** Columbiformes


La hembra es similar, pero las partes superiores son marrón oliva y el dibujo de los lados de la cara es más apagado y menos contrastado



El rasgo más distintivo es una franja de color rufo parduzco que cruza los costados hasta la cabeza, que son de color beige

♀

El macho es principalmente de color rufo parduzco



Tamaño mediano (18-21 cm.), con dimorfismo sexual en el plumaje

♂



Bolivia

Distribución continental:

Ampliamente distribuida en las tierras bajas del Neotrópico, desde el norte de México, centro América, hacia el sur, pasando por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y el sur de Brasil.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

Se encuentra en toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, boliviano tucumano, Cerrado, Chiquitania y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** = Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

36

Hábitat y Biología: Habita principalmente en el sotobosque de los bosques siempreverdes. En Bolivia es poco común a común en bosque primario y secundario amazónico de tierra firme y várzea, bosque húmedo a hiperhúmedo del piedemonte y Yungas inferiores. La temporada reproductiva varía a lo largo del área de distribución de la especie. El nido está formado por pequeñas ramitas, a veces sobre una plataforma de hojas, los huevos son de color crema pálido o crema oscuro.

Amenazas generales en toda su área de distribución: Es una especie que presenta una amplia distribución, se cree que su población es estable y, en consecuencia, su estado en la Lista Roja de la UICN se evalúa como de Menor Riesgo, pero tiende a ser sensible a la fragmentación de los bosques. Puede estar sufriendo extinciones locales debido a la tala de bosques.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía.
- <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/doves-and-pigeons-palomas-y-tortolas/geotrygon-montana/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Kuecker, Z., CA Soberanes-González, CI Rodríguez-Flores, M. d. J. Arizmendi y T. Johnson (2020). Ruddy Quail-Dove (*Geotrygon montana*), versión 1.0. En Aves

del Mundo (TS Schulenberg, Editor). Laboratorio de Ornitología de Cornell, Ithaca, NY, EE. UU. <https://doi.org/10.2173/bow.ruqdv01>.


- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Cuquiza (*Leptotila verreauxi*)

Nombre T'simane: fejfé

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Cuquiza y White-tipped Dove



Bolivia

Distribución continental:

Tiene una distribución muy amplia en América, desde el sur de Estados Unidos hasta el centro y norte de Argentina, abarcando la mayor parte de Centroamérica, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Venezuela y casi todo Brasil.

Distribución Nacional:

Se encuentra presente en casi todo Bolivia, menos en Oruro.

Distribución en Loma Santa:

Se encuentra en toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, boliviano tucumano, Cerrado, Chiquitania, Cerrado, Chaco, Puna húmeda y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

① **Hábitat y Biología:** Utiliza diversos hábitats en toda el área de distribución de la especie. En Bolivia es bastante común a común en diferentes hábitats en bosques, matorrales, claros, pasturas; en regiones húmedas en áreas abiertas, bordes de bosque primario. Su rango se expande con la deforestación. Su reproducción es variable y aparentemente durante todo el año en la mayor parte de su área de distribución. El nido está construido por pequeñas ramitas y el diseño típico de las palomas. Está dispuesto de forma suelta y débil, los huevos no tienen marcas y son de color beige crema o blanco.

② **Amenazas generales en toda su área de distribución:** Es una especie que presenta una amplia distribución, se cree que su población es estable y, en consecuencia, su estado en la Lista Roja de la UICN se evalúa como de Menor Riesgo.

Mapa: Asociación Civil Armonía

• Giese, J. C., K. M. Hogan, and H. A. Mathewson (2020). White-tipped Dove (*Leptotila verreauxi*), version 1.0. In Birds of the World (P. G. Rodewald, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.whtdov.01>.

• Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía.

• <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/doves-and-pigeons-palomas-y-tortolas/leptotila-verreauxi/>.

• IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

• Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.


• UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Cuquiza (*Leptotila rufaxilla*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Cuquiza y Gray-fronted Dove

• **Clase:** Aves• **Orden:** Columbiformes**Distribución continental:**

Tiene una distribución muy amplia en América, Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Brasil.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Se encuentra en toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chiquitania y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** = Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

38

❗ **Hábitat y Biología:** Habita los bosques, húmedos, evitando las zonas áridas; a veces se encuentra en los bordes de los bosques y en los claros; en los bosques de várzea, de tierra firme y de galería. En Bolivia es poco común a bastante común en bordes de bosque y arbustales semi a hiperhúmedos de tierras bajas, piedemonte y Yungas inferiores; también en bosque de galería e islas de ríos y a lo largo de riachuelos en bosque amazónico de tierra firme. Su rango se expande con la deforestación. Se reproduce casi todo el año el nido construido de ramitas a 1 o 5 m, sobre el suelo, en un arbusto o árbol.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** Es una especie que presenta una amplia distribución, se cree que su población es estable y en consecuencia, su estado en la Lista Roja de la UICN se evalúa como de Menor Riesgo.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Baptista, L. F., P. W. Trail, H. M. Horblit, A. Bonan, and P. F. D. Boesman (2020). Gray-fronted Dove (*Leptotila rufaxilla*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.grfdov1.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía.
- [https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/doves-and-](https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/doves-and-pigeons-palomas-y-tortolas/leptotila-rufaxilla/)

[pigeons-palomas-y-tortolas/leptotila-rufaxilla/](https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/doves-and-pigeons-palomas-y-tortolas/leptotila-rufaxilla/).

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.


Chai morada (*Columbina talpacoti*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Chai morada y Ruddy Ground Dove

Los machos con su plumaje rubicundo brillante



Paloma pequeña
(15-17 cm).

Las hembras son más pálidas, tendiendo más a los tonos pardos que al rubicundo, y se distinguen con manchas negras en las alas, las coberteras infracaudales monocromáticas y la ausencia de escamas

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Columbiformes



Distribución continental:

Tiene una distribución muy amplia en América, desde México, abarcando la mayor parte de Centroamérica, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Venezuela y todo Brasil

Distribución Nacional: En casi todo el país, no presenta registro Oruro.

Distribución en Loma Santa: Se encuentra en toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, boliviano tucumano, Cerrado, Chiquitania, Chaco, Puna húmeda y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN:** NT: Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Prefiere hábitats abiertos y húmedos, bosques ribereños, zonas taladas, campos cultivados y jardines. Requiere un terreno abierto y desnudo para buscar semillas, por lo que evita las zonas boscosas densas. En Bolivia es bastante común a abundante en una variedad de hábitats abiertos. Su rango se expande con la deforestación. Solitaria, en parejas o bandadas pequeñas; se alimenta en el suelo. Se reproduce durante todo el año, construyen un nido de copa resistente y poco profundo hecho de pajas, palos y raíces. Los huevos son blancos

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** Es una especie de común a abundante en toda su área de distribución. La UICN la clasifica como de Menor Riesgo, debido al gran tamaño de su población, que va en aumento, ya su extensa área de distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Hart, J. A. (2020). Ruddy Ground Dove (*Columbina talpacoti*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.rugdov.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., Maccormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía.
- <http://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/doves-and-pigeons-palomas-y-tortolas/columbina-talpacoti/>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEP-WCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Serere (*Guira guira*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: Tserere

Otros nombres: Serere, Pirincho, Guira Cuckoo

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Cuculiformes

**Distribución continental:**

Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Distribución Nacional:

Beni, Chuquisaca, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

Rosario y Chirisi.

Ecorregiones:

Amazonia, Bosque Boliviano-Tucumano, Cerrado, Chaco, Chiquitania, Chaco Serrano, Sabanas Inundables y Valles Secos Interandinos..

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No



❗ **Hábitat y Biología:** Se observan en pequeñas bandadas en hábitats abiertos y escasamente arbolados (incluyendo áreas urbanas) de tierras bajas y ladera este inferior del sur de los Andes; mucho más local y restringida a ríos y claros de la Amazonía y Chiquitania. Principalmente debajo de 1800 m; en Chuquisaca y Tarija hasta 2250 m.

❗ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** Es una especie que se adapta muy bien a cambios ocasionados por las actividades antrópicas, por lo tanto, no presenta grandes amenazas a nivel global.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/cuckoos-cuculillos/guira-guira/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- Payne, R. B. and G. M. Kirwan (2020). Guira Cuckoo (*Guira guira*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.guicuc1.01>.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Mauri curichero (*Crotophaga major*)

Nombre T'simane: Aguaresa

Nombre Mojeño-trinitario: Tswa tswa

Otros nombres: Mauri curichero, Greater Ani



- **Clase:** Aves
- **Orden:** Cuculiformes



Distribución continental:

Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En casi toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chaco, Chiquitania, Chaco Serrano y Sabanas Inundables.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Poco común a común en bosques y arbustales secos a húmedos adyacentes a cuerpos de agua de tierras bajas. En parejas o bandadas pequeñas y a menudo vocalizando; en la vegetación densa, pero ocasionalmente posa a la vista.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** Si bien, la población de *Crotophaga major* se encuentra como Preocupación menor para la IUCN, en algunos lugares de su área de distribución, se reportan lugares de nidificación destruidos por la tala de bosques a lo largo de ríos, lagos y otras vías fluviales, y por el relleno y dragado de marismas y pantanos.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/cuckoos-cuculillos/crotophaga-major/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia.

Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

- Riehl, C. (2020). Greater Ani (*Crotophaga major*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.greenii.01>.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Mauri (*Crotophaga ani*)

Nombre T'simane: Orús

Nombre Mojeño-trinitario: Uwori

Otros nombres: Mauri, Smooth-billed Ani

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Cuculiformes

Los machos por lo general son más grandes que las hembras

Pico arqueado, comprimido lateralmente, de apariencia grande y que recuerda al pico de un loro



De tamaño mediano (longitud de 30-36 y de unos 100 g de peso)

De color enteramente negruzco, cola larga, cuando le llega el sol se logran apreciar brillos de color violeta en algunas partes del cuerpo



Bolivia

Distribución continental:

Colombia, Venezuela, Trinidad, Guyana, Surinam, Guayana Francesa, Ecuador, Brasil, Perú, y Argentina, EE. UU. (Florida), Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, Cuba, República Dominicana y Jamaica.

Distribución Nacional: Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En casi toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Bosque Boliviano-Tucumano, Cerrado, Chaco, Chiquitania, Chaco Serrano y Sabanas Inundables, Valles Secos Interandinos, Yungas y Puna Húmeda.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Se mueve en pequeñas bandadas. Bastante común a abundante en una variedad de hábitats abiertos (incluyendo áreas urbanas) de tierras bajas y ladera este inferior de los Andes. Su rango se expande con la deforestación.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** Se conoce que prospera en zonas perturbadas donde se crean espacios abiertos, como zonas agrícolas y residenciales. Por otro lado, se conoce de un posible caso de disminución de una población al norte del continente americano a causa de intoxicación debido a la ingesta de insectos contaminados con pesticida.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/cuckoos-cuculillos/crotophaga-ani/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- Quinn, J. S. and J. M. Startek-Foote (2020). Smooth-billed Ani (*Crotophaga ani*), version 1.0. In *Birds of the World* (A. F. Poole and F. B. Gill, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.smbani.01>.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEP-WCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Dos tres (*Tapera naevia*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Dos tres, Striped Cuckoo



Bolivia

Distribución continental:

México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Belice, Nicaragua, Las Guyanas, Surinam, Colombia, Venezuela, Ecuador Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú y Argentina.

Distribución Nacional: Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Jorori, Rosario y Chirisi.

Ecorregiones: Amazonia, Bosque Boliviano-Tucumano, Cerrado, Chaco, Chiquitania, Chaco Serrano y Sabanas Inundables, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Una parte de su población
- **Migrante:** Austral parcial

❶ **Hábitat y Biología:** Raro a localmente bastante común en matorrales y arbustales (primarios y secundarios) secos a húmedos, pastizales, cerrado, claros y bordes de bosque de tierras bajas y ladera este inferior de los Andes. Solitario, arisco y acechador, pero vocaliza bastante; escuchado mucho más que visto. Canta principalmente en primavera y verano a lo largo del día y ocasionalmente de noche. Parásito de cría.

☹️ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** Es una especie que se ve afectada a cualquier alteración en su hábitat

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/cuckoos-cuculillos/tapera-naevia/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Lowther, P. E. (2020). Striped Cuckoo (*Tapera naevia*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg,

Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA <https://doi.org/10.2173/bow.strucuc1.01>.

- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Cuco Faisán (*Dromococcyx phasianellus*)

Nombre T'simane: Deytsi

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Cuco Faisán, Pheasant Cuckoo

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Cuculiformes




La garganta y el pecho están marcados de oscuro

Es marrón oscuro por encima; las partes inferiores son más pálidas

Tiene una cola larga y graduada y una cresta corta

De gran tamaño, 32 a 33 cm de longitud



- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN LC:** Preocupación menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Raro a poco común en sotobosque de bosque amazónico de tierra firme y várzea y del piedemonte húmedo. En cuanto a su reproducción, se conoce que esta especie parasita nidos.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No hay información específica, sin embargo, se sabe que la especie se ve afectada por cambios en el hábitat disponible. Aparentemente vulnerable a la fragmentación del hábitat.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/cuckoos-cucillos/dromococcyx-phasianellus/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Lowther, P. E. (2020). Pheasant Cuckoo (*Dromococcyx phasianellus*), version 1.0. In Birds of the World (T.

S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.phecu1.01>.


- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEP-WCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Cuco pequeño (*Coccyzua minuta*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Cuco pequeño, Little Cuckoo



Bolivia



Distribución continental:

Panamá, Colombia, Venezuela, Las Guyanas, Surinam, Ecuador Bolivia, Brasil y Perú

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Pto. Salas.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chiquitania y Sabanas Inundables.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

① **Hábitat y Biología:** Raro a localmente bastante común en sotobosque de bosque húmedo en bordes de riachuelos, ríos lagunitas y lagunas; especialmente en remansos y cochas de la Amazonía y cuerpos de agua cubiertos por vegetación acuática (yomomales) en otras regiones. Reservado y acechador, pero ocasionalmente posa a la vista. Mayormente detectado por voz.

② **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No hay información disponible nos indica que no presenta amenazas graves, por lo tanto, no se encuentra se encuentra amenazada a nivel global.

Mapa: Asociación Civil Armonía

• Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/cuckoos-cuculillos/coccyzua-minuta/>.

• IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

• Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

• Payne, R. B. (2020). Little Cuckoo (*Coccyzua minuta*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.litcuc2.01>

• UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Cuco ardilla (*Piaya cayana*)

Nombre T'simane: ijá

Nombre Mojeño-trinitario: Chikua

Otros nombres: Cuco ardilla, Cocinero, Squirrel Cuckoo

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Cuculiformes



Bolivia

Distribución continental:

México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Belice, Nicaragua, Las Guyanas, Surinam, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú y Argentina.

Distribución Nacional:

Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

En toda el área.

Ecorregiones:

Amazonia, Bosque Boliviano-Tucumano, Cerrado, Chaco, Chiquitania, Chaco Serrano y Sabanas Inundables, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN:** LC: Preocupación menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

46

❗ **Hábitat y Biología:** Poco común a bastante común en bosque y arbustales secos a hiperhúmedos de tierras bajas y ladera este de los Andes; en la Amazonia principalmente a lo largo de ríos y en bordes de bosque. Solitario o en parejas desde el estrato medio hasta el dosel. A menudo oculto en el follaje, pero regularmente posa a la vista; cruza espacios abiertos planeando. Forrajea saltando o corriendo con destreza a lo largo de ramas. Vocaliza mucho todo el año.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** El cuco ardilla presenta una distribución muy amplia y una población de gran tamaño. En consecuencia, su estado de conservación se evalúa como Preocupación Menor. La actividad humana tiene poco efecto directo sobre esta especie, son relativamente tolerantes a las alteraciones del hábitat, siempre y cuando se mantenga una vegetación leñosa moderadamente alta.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Fitzgerald, J., T. S. Schulenberg, and G. F. Seeholzer (2020). Squirrel Cuckoo (*Piaya cayana*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.squcuc1.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/cuckoos-cuculillos/piaya-cayana/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Guajojó Grande (*Nyctibius grandis*)

Nombre T'simane: Voru

Nombre Mojeño-trinitario: Wau'u

Otros nombres: Guajojó Grande, Great Potoo



Cabeza grande
y redondeada

Es el de
coloración
más pálida,
normalmente
con el plumaje
gris claro hasta
blanco

Es más
frecuente oír
a esta especie
que verla

Todos los
guajojos son
aves grandes
con cola larga

De este grupo,
*Nyctibius
grandis* es el
más grande
con 47 a 50
cm de longitud



Bolivia

Distribución continental:

México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Perú, Venezuela, Surinam, Guyana francesa, Guyana, Brasil, Paraguay, Ecuador y Bolivia.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:
En casi toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chiquitania, Sabanas Inundables y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Raro a poco común en una variedad de bosques semi a hiperhúmedos primarios y secundarios de tierras bajas y ladera este inferior de los Andes. Solitario y nocturno; de día posa erguido y a menudo a la vista en el dosel, permanece casi inmóvil aparentando una rama muerta. De noche realiza vuelos sobre el dosel desde ramas expuestas para cazar insectos aéreos; también en claros. Vocaliza bastante todo el año.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** En algunas zonas rurales de Brasil se cree que las plumas del Guajojó Grande tienen el poder de asegurar la castidad, por esta razón son cazados para obtener partes de su cuerpo que se utilizan en ceremonias para ahuyentar la seducción. También constituyen una fuente de alimento inusual para aquellas poblaciones locales.

Mapa: Asociación Civil Armonía

• Adams, K. (2020). Great Potoo (*Nyctibius grandis*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.greptot1.01>

• Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., Maccormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/potoos-guajojos/nyctibius-grandis/>

• IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

• Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

• UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEP-WCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Guajojó (*Nyctibius griseus*)

Nombre T'simane:Ejojo

Nombre Mojeño-trinitario: Pure

Otros nombres: Guajojó, Common Potoo

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Nyctibiiformes

Los ojos son
amarillosEn el pecho suele
verse un collar de
manchas negrasSu coloración va del
grisáceo al marrón
oscuro, jaspeada con
negro y beige. Este
patrón coincide con la
corteza de los árboles
en los que se posa,
y como resultado el
guajojó se asemeja al
tronco de una ramaDe tamaño
mediano 34
a 37 cm de
longitud**Distribución continental:**

Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Surinam, Guyana francesa, Guyana, Brasil, Paraguay, Ecuador, Argentina, Uruguay, Perú y Bolivia.

Distribución Nacional:

Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En casi toda el área.**Ecorregiones:** Amazonia, Boliviano -Tucumano, Cerrado, Chaco, Chiquitania, Chaco Serrano, Valles Secos Interandinos, Sabanas Inundables y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Raro a localmente bastante común en una variedad de arbustales y bordes de bosque secos a hiperhúmedos de tierras bajas y ladera este inferior de los Andes. Es el guajojó más común y ampliamente distribuido en Bolivia. Solitario y nocturno, muy difícil de detectar debido a la falta de movimiento y el plumaje camuflado; mejor detectado por voz en noches de luna.

Amenazas generales en toda su área de distribución: Se sospecha que una de las presiones para esta especie es la pérdida de hábitat.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/potoos-guajojos/nyctibius-griseus/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia.

Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.
- Voudouris, P. (2020). Common Potoo (*Nyctibius griseus*), version 1.0. In *Birds of the World* (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.compot1.01>.

Cuyabo (*Nyctidromus albigollis*)

Nombre T'simane: Cayevo

Nombre Mojeño-trinitario: -


Otros nombres: Cuyabo, Common Pauraque

La hembra con banda parda más estrecha en las alas y ápice blanco en las caudales laterales



En la fase canela-rojiza, más canela, especialmente en la corona y dorso, contrastando menos con las mejillas

De tamaño mediano
27 a 28 cm de longitud



Mancha blanca en la garganta, pecho grisáceo; por abajo, pardo con fino barrado oscuro

En el macho: mancha blanca en las primarias negruzcas y, en vuelo, cola negra con rectrices marginadas de blanco, principalmente en la margen interna

Corona y nuca grisáceos, contrastando con las mejillas canela; pardo oscuro en las partes superiores, con hileras de grandes manchas negras y castañas bordeadas de blanquecino en escapulares y pintas pardas en las cobertoras

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Caprimulgiformes



Bolivia

Distribución continental: La especie se extiende desde Argentina hasta Texas en los Estados Unidos, incluyendo también Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Guyana francesa, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En casi toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chaco, Chiquitania, Chaco Serrano, Valles Secos Interandinos, Sabanas Inundables y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❶ **Hábitat y Biología:** Poco común a localmente abundante en bordes de bosque seco a hiperhúmedo, arbustales abiertos y matorrales de tierras bajas y ladera este de los Andes. Solitario, de día se posa en ramas bajas dentro del bosque. De noche busca insectos mediante vuelos cortos desde el suelo, a menudo en caminos.

❷ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** Algunas amenazas en menor medida son la degradación de hábitats, colisiones con objetos en movimiento o inmóviles (vehículos, infraestructuras). Se ve afectada debido a la caza por parte de algunos nativos en Brasil.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/nyctidromus-albigollis/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Latta, S. C. and C. A. Howell (2020). Common Pauraque (*Nyctidromus albigollis*), version 1.0. In Birds of the World (A. F. Poole, Editor). Cornell Lab of Ornithology,

Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.compau.01>.

- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Cuyabo (*Setopagis parvula*)

Nombre T'simane: Charí bobó

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Cuyabo, Little Nightjar

El macho también tiene una banda blanca en las alas, y puntas blancas al extremo de la cola

La hembra carece de blanco en las alas y la cola.

Presenta plumaje generalmente marrón grisáceo, con un amplio collar leonado a lo largo de la nuca

El más chico de los cuyabos con 18 a 19 cm de longitud

La garganta es blanca en el macho, pero leonada en la hembra

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Caprimulgiformes

**Distribución continental:**

Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú, Argentina y Uruguay

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Piñal, Jorori, Rosario y Chirisi.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chaco, Chiquitania, Chaco Serrano, Valles Secos Interandinos y Sabanas Inundables.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Una parte de si población
- **Migrante:** Austral Parcial

50

❗ **Hábitat y Biología:** Raro a estacional, localmente común en una variedad de hábitats semiabiertos, secos a húmedos y en bordes de bosque de tierras bajas y ladera este inferior de los Andes. Nocturno y crepuscular, solitario; descansa en el suelo, busca su alimento mediante vuelos cortos desde el suelo o ramas bajas.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global, poco afectada por la actividad humana, y puede ocupar algunos hábitats no autóctonos, como las arboledas de eucaliptos.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/setopagis-parvulus/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- Provost, K. (2020). Little Nightjar (*Setopagis parvula*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.litnig1.01>.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Cuyabo tijereta (*Hydropsalis torquata*)

Nombre T'simane: Sij naty

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Cuyabo tijereta, Scissor-tailed Nightjar



Distribución continental:

Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú, Argentina y Uruguay

Distribución Nacional:

Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

Piñal, Jorori y Chirisi.

Ecorregiones:

Amazonia, Boliviano - Tucumano, Cerrado, Chaco, Chiquitania, Chaco Serrano, Valles Secos Interandinos, Sabanas Inundables y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Una parte de si población
- **Migrante:** Austral Parcial

Hábitat y Biología: Raro a estacionalmente común en pastizales secos a húmedos, bosques abiertos, borde de bosque, áreas agrícolas, áreas urbanas en tierras bajas y los Andes Orientales. Nocturno y crepuscular. Solitario o en parejas, busca alimento mediante vuelos desde el suelo a ramas bajas.

Amenazas generales en toda su área de distribución: Se ve poco afectada por la actividad humana. A veces aparece en parques urbanos y parece aclimatarse a las perturbaciones humanas, pero, hasta cierto punto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/hydropsalis-torquata/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.
- Witynski, M. (2020). Scissor-tailed Nightjar (*Hydropsalis torquata*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.sctnig2.01>.

Cuyabo (*Antrostomus sericocaudatus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Cuyabo, Silky-tailed Nightjar

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Caprimulgiformes



Distribución continental:
Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú y Argentina


Distribución Nacional: Beni, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:
Piñal, Pto. Vichiricansi y Rosario.

Ecorregiones: Amazonia y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No


Con alas y cola redondeadas. Los machos tienen un distintivo collar blanco y presentan blanco en las puntas de las plumas externas de la cola; el blanco es sustituido por beige en las hembras



El ave presenta un barrado oscuro general en el cuerpo y la cola con manchas negras en algunas plumas de las alas

No hay blanco en las alas en ninguno de los sexos

Mide aproximadamente de 22 a 23 cm de longitud



❗ **Hábitat y Biología:** Raro y probablemente pasado por alto localmente en los límites y dentro del bosque húmedo primario y secundario con sotobosque abierto en las estribaciones andinas y la Amazonia. Nocturno y crepuscular. Solitario, descansa y realiza vuelos desde el suelo o ramas bajas, fácilmente pasado por alto cuando no vocaliza.

🌍 **Amenazas generales en toda su área de distribución:** Esta especie es rara en toda su área de distribución. Todas sus poblaciones son susceptibles a la pérdida de hábitat y, con la Mata Atlántica y la cuenca del Amazonas constantemente amenazadas por el desarrollo humano (por ejemplo, presas, autopistas transcontinentales), las poblaciones conocidas de este cuyabo pueden disminuir rápidamente.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/antrostomus-sericocaudatus/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.
- Wilkinson, F. A. W. (2020). Silky-tailed Nightjar (*Antrostomus sericocaudatus*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.sitnig1.01>.

Vencejo (*Streptoprocne zonaris*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Vencejo, White-collared Swift

El color general es negro hollín, excepto por una ancha banda de plumas blancas que rodea el cuello. No existe dimorfismo sexual notorio

Es un vencejo de gran tamaño; en muchas partes de su distribución geográfica, de hecho, es la especie de vencejo más grande



Mide aproximadamente
de 19 a 20 cm de longitud

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Apodiformes



Distribución continental: Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Islas Caimán, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guayana Francesa, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Martinica, México, Montserrat, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Oruro, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En casi toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Boliviano - Tucumano, Cerrado, Chaco, Chaco Serrano, Valles Secos Interandinos, Sabanas Inundables y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Poco común a bastante común sobre bosques y arbustales secos a hiperhúmedos, pasturas, pueblos y ciudades de la ladera este de los Andes y tierras bajas adyacentes desde La Paz hasta Santa Cruz; rara e irregular en tierras bajas del este y Andes de Chuquisaca y Tarija. Se alimenta en vuelo alto en bandadas de hasta 100 o más, ocasionalmente con otros vencejos.

☹️ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No se tiene constancia de que las poblaciones se vean afectadas por las actividades humanas.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/swifts-vencejos/streptoprocne-zonaris/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia.

Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

- Roper, E. M. (2020). White-collared Swift (*Streptoprocne zonaris*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.whcswi.01>.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Vencejo (*Chaetura brachyura*)

Nombre Tsimane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Vencejo, Short-tailed Swift

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Apodiformes

**Distribución continental:**

Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Guayanas, Trinidad y Tobago, Brasil, Bolivia, Granada y San Vicente.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En casi toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Boliviano - Tucumano, Cerrado, Chaco, Chiquitano, Valles Secos Interandinos, Sabanas Inundables y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Poco común a localmente común sobre bosque de galería y ribereño, bosque secundario, claros, arbustales, cerrado, campos agrícolas y ciudades de tierras bajas húmedas a semihúmedas y del piedemonte al norte de los Andes. Su rango se expande con la deforestación. Forrajea en bandadas pequeñas, generalmente bastante alto.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No se tiene constancia de que las poblaciones se vean afectadas por las actividades humanas.

Mapa: Asociación Civil Armonía


- Chantler, P. and P. F. D. Boesman (2020). Short-tailed Swift (*Chaetura brachyura*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.shtswil.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/swifts-vengejos/chaetura-brachyura/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEP-WCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Picaflor (*Florisuga mellivora*)

Nombre T'simane: Chuchú

Nombre Mojeño-trinitario: Pítse

Otros nombres: Picaflor, White-necked Jacobin



Las hembras son muy variables, y pueden parecerse a los machos adultos o inmaduros, tienen el dorso verde, el vientre blanco, blanco en la garganta en escala verde o azul, blanco y en escala azul oscuro alrededor de la cola

Los machos inmaduros tienen menos blanco en la cola



Bolivia

Distribución continental:

Bolivia, Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago, Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

En casi toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Boliviano - Tucumano, Chiquitania y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** Apéndice II
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Raro a poco común en bosque semihúmedo de la Amazonia, Yungas inferior y Chiquitania norte. Típicamente solitario en el dosel y subdosel, ocasionalmente más bajo en bordes de bosque.

🌿 **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No se tiene constancia de que las poblaciones se vean afectadas por las actividades humanas. Parece muy capaz de utilizar hábitats perturbados y artificiales como las plantaciones de árboles.

Mapa: Asociación Civil Armonía

• Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., Maccormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/hummingbirds-picaflor/florisuga-mellivora/>.

• IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

• Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

• Stiles, F. G., G. M. Kirwan, and P. F. D. Boesman (2020). White-necked Jacobin (*Florisuga mellivora*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.whnjac1.01>.

• UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.


Picaflor (*Glaucis hirsutus*)

Nombre T'simane: Chuchú

Nombre Mojeño-trinitario: Pítse

Otros nombres: Picaflor, Rufous-breasted Hermit

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Apodiformes

**Distribución continental:**

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago, Venezuela..

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chiquitania y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** Apéndice II
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

56

Los sexos son semejantes, pero el macho tiene un rayo amarillo en la mandíbula superior, y la hembra tiene ligeramente más pálida el plumaje.

❗ **Hábitat y Biología:** Raro a localmente común en el sotobosque de arbustales secundarios y bosque semihúmedos a húmedos de la Amazonía, piedemonte de los Andes, Chiquitania norte y serranía de Huanchaca; prefiere bosque estacional inundado y ribereño, escaso en otros hábitats. Solitario o en parejas, en manchones de flores de Heliconia cerca del agua.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** Al parecer ha disminuido en algunas zonas debido a la degradación o destrucción de los bosques, por la gran pérdida de sus principales plantas alimenticias.

Mapa: Asociación Civil Armonía


- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/hummingbirds-picaflor/florisuga-mellivora/>.
- Hinkelmann, C., P. F. D. Boesman, and G. M. Kirwan (2020). Rufous-breasted Hermit (*Glaucis hirsutus*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.rubher.01>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Picaflor (*Threnetes leucurus*)

Nombre T'simane: Chuchú

Nombre Mojeño-trinitario: Pítse

Otros nombres: Picaflor, Pale-tailed Barbthroat



Distribución continental:

Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Guayana francesa, Guayana, Surinam, y Venezuela

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Piñal y Pto. Vichi'ricansi

Ecorregiones: Amazonia y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** Apéndice II
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Raro a poco común en arbustales secundarios y bosque húmedos de la Amazonía, piedemonte y Yungas inferiores. Solitario en el follaje denso del sotobosque en claros pequeños y bordes.

Amenazas generales en toda su área de distribución: No se tiene constancia de que las poblaciones se vean afectadas por las actividades humanas u otras.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- del Hoyo, J., N. Collar, and G. M. Kirwan (2020). Pale-tailed Barbthroat (*Threnetes leucurus*), version 1.0. In *Birds of the World* (S. M. Billerman, B. K. Keeney, P. G. Rodewald, and T. S. Schulenberg, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.patbarl.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., Maccormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/hummingbirds-picaflores/threnetes-leucurus/>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Picaflor ermitaño (*Phaethornis ruber*)

Nombre T'simane: Chuchú

Nombre Mojeño-trinitario: Pítse

Otros nombres: Picaflor ermitaño, Reddish Hermit

Colibrí de 6,5 a 7 cm de longitud total.
Es una de las aves más pequeñas

Pico curvado (pico 2 cm);
su pecho, vientre y rabadilla
son de color óxido o naranja
rojizo

Partes superiores con
pintas negras, color
castaño rufo o rojizo

El macho presenta
una estrecha faja
negra a la altura
del pecho y corona

Presenta barbilla y
motas en la base de
las patas blancuzcas
o amarillentas

♀ La hembra tiene
una coloración
más pálida y
no posee la faja
negra

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Apodiformes

**Distribución continental:**

Brasil, Bolivia, Colombia,
Ecuador, Perú, Guayana
francesa, Guayana, Surinam,
y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni,
Cochabamba, La Paz, Pando
y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:
En toda el área.

Ecorregiones: Amazonia y
Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** Apéndice II
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Bastante común a común en el sotobosque y bordes de bosque primario y secundario húmedo a hiperhúmedo de la Amazonia, piedemonte y Yungas inferiores, especialmente cerca de riachuelos y claros pequeños. Normalmente observado un individuo lanzándose rápidamente por el subdosel o rondando flores. Forrajea en rutas fijas en una gran variedad de flores; ladrón de néctar de flores grandes, también consume pequeños insectos.

Amenazas generales en toda su área de distribución: No se tiene constancia de que las poblaciones se vean afectadas por las actividades humanas u otras.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/hummingbirds-picaflor/phaethornis-ruber/>.
- Hinkelmann, C., G. M. Kirwan, and P. F. D. Boesman (2020). Reddish Hermit (*Phaethornis ruber*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.redheri.01>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Picaflor ermitaño (*Phaethornis hispidus*)

Nombre T'simane: Chuchú

Nombre Mojeño-trinitario: Pítse

Otros nombres: Picaflor ermitaño, White-bearded Hermit

Con la mandíbula inferior amarilla. Su tonalidad es principalmente verde-bronce encima, la coronilla es más morena. Tiene la rabadilla grisácea escamada y marginada blanquecino

Colibrí de 13 cm de longitud total (pico 3 cm).

La garganta es teñida pardusco con una estría central blanca, amplia y prominente

Posee un parche moreno a través de los ojos bordeado encima y debajo por una tenue estría blanca; sus partes inferiores van en un tono gris desvanecido a blanquecino en el vientre

La cola de color verde-bronce con una banda oscura y par central de plumas de la cola alargadas con puntas blancas.



Distribución continental:

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En casi toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** Apéndice II
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Raro a poco común en el sotobosque de bosque estacionalmente inundado y ribereño y en bordes de bosque húmedo. Forrajea en rutas fijas en el follaje denso. Vocaliza solo o en grupo.

🌍 **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No se tiene constancia de que las poblaciones se vean afectadas por las actividades humanas u otras.

Mapa: Asociación Civil Armonía

• Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/hummingbirds-picaflores/phaethornis-hispidus/>.

• Hinkelmann, C., G. M. Kirwan, and P. F. D. Boesman (2020). White-bearded Hermit (*Phaethornis hispidus*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.whbher1.01>.

• IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

• Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

• UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Picaflor ermitaño (*Phaethornis malaris*)

Nombre T'simane: Chuchú

Nombre Mojeño-trinitario: Pítse

Otros nombres: Picaflor ermitaño, Great-billed Hermit

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Apodiformes

**Distribución continental:**

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Boliviano-Tucumano, Chaco Serrano, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** Apéndice II
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Bastante común a común en el sotobosque y bordes de bosque amazónico de tierra firme y de bosque hiperhumedo a localmente seco de la ladera este de los Andes; raro y local en los Andes sur. Forrajea en rutas fijas; generalmente visto solo muy brevemente, pero a menudo emite llamados mientras vuela rápido. Macho canta principalmente en grupo.

❗ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No se tiene constancia de que las poblaciones se vean afectadas por las actividades humanas. Sin embargo, podría verse amenazada por un crecimiento en la destrucción de su hábitat.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., Maccormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/hummingbirds-picaflores/phaethornis-malaris/>.
- Hinkelmann, C., G. M. Kirwan, and P. F. D. Boesman (2020). Great-billed Hermit (*Phaethornis malaris*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.grbheri.01>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.


Picaflor (*Chlorostilbon mellisugus*)

Nombre T'simane: Chuchú

Nombre Mojeño-trinitario: Pítse

Otros nombres: Picaflor, Blue-tailed Emerald

El macho tiene un plumaje
verde brillante con blanco en los
flancos y una cola azul metálica



Colibrí de 6 a 7 cm
de longitud total
(pico 2 cm).

La hembra se diferencia por su coloración
grisácea en la parte inferior, un parche
auricular negruzco, un supercilio blanco
corto y blanco en los extremos de las
puntas de la cola



Bolivia

Distribución continental:

Bolivia, Brasil, Colombia,
Ecuador, Aruba, Curazao,
Margarita, Trinidad y Tobago,
Guyana Francesa, Guayana y
Surinam.

Distribución Nacional: Beni,
Cochabamba, La Paz, Pando
y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:
Pto. Calixto, Pto. Vichi'ricansi
y Rosario.

Ecorregiones: Amazonia,
Boliviano-Tucumano,
Cerrado, Chiquitania, Sabanas
Inundables, Valles Secos
Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** Apéndice II
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

① **Hábitat y Biología:** Rara a poco común en bordes de bosque y arbustales primarios y secundarios semi a híper húmedos; menos abundante y más local en tierras bajas que en los Andes. Posa a la vista; forrajea en rutas fijas a baja altura.

② **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No se tiene constancia de que las poblaciones se vean afectadas por las actividades humanas u otras.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Bündgen, R., G. M. Kirwan, P. F. D. Boesman, and H. F. Greeney (2020). Blue-tailed Emerald (*Chlorostilbon mellisugus*), version 1.0. In Birds of the World (S. M. Billerman, B. K. Keeney, P. G. Rodewald, and T. S. Schulenberg, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.blteme1.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., Maccormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/tinamus-major/>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.


Picaflor (*Thalurania furcata*)

Nombre T'simane: Chuchú

Nombre Mojeño-trinitario: Pítse

Otros nombres: Picaflor, Fork-tailed Woodnymph

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Apodiformes

**Distribución continental:**

Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Argentina, Bolivia, Brasil, Guyana Francesa, Guayana, Surinam y Paraguay.

Distribución Nacional:

Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En toda el área.**Ecorregiones:**

Amazonia, Boliviano-Tucumano, Cerrado, Chaco, Chaco Serrano, Chiquitania, Sabanas Inundables, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** Apéndice II
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

62

❶ **Hábitat y Biología:** Poco común a común en bosques y arbustales primarios y secundarios semi a hiperhúmedos, incluyendo plantaciones de café bajo sombra, de la ladera este de los Andes y tierras bajas, pero ausente en gran parte del Chaco. Presente en el sotobosque y estrato medio inferior. Forrajea en rutas fijas, pero el macho puede defender territorio de forrajeo; también atrapa insectos aéreos mediante vuelos cortos. Realiza movimientos estacionales.

❷ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No está globalmente amenazada, sin embargo, las poblaciones de algunas partes de Brasil, Colombia y Paraguay pronto pueden estar amenazadas por la deforestación.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., Maccormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/hummingbirds-picaflor/thalurania-furcata/>.
- Stiles, F. G., G. M. Kirwan, and P. F. D. Boesman (2020). Fork-tailed Woodnymph (*Thalurania furcata*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.fotwool.01>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Pava serere (*Opisthocomus hoazin*)

Nombre T'simane: Sijja

Nombre Mojeño-trinitario: Chavesi

Otros nombres: Pava serere, Hoatzin



Bolivia

Distribución continental:

Está presente en toda la Amazonia, a lo largo de las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco. Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Surinam y las Guayanas.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Pto. Gerardo, Jorori, Pto. Vichiricansi, Pto. Salas y Chirisi.

Ecorregiones: Amazonia y Sabanas Inundables.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Se lo encuentra en bosques tropicales de tierras bajas, normalmente a lo largo de la vegetación ribereña, es bastante común a común pero un tanto local en lagunitas, curichis y remansos en bosques tropicales de la Amazonia y Llanos de Moxos. Muy social; principalmente en bandadas, pasando mucho tiempo descansando a la vista en ramas al borde del agua. Suelen colocar sus nidos en árboles, arbustos y matorrales, construyendo nidos simples de plataforma de palos con un diámetro promedio de entre 25 y 30 cm, coloca de 1 a 3 huevos de color blanquecino con pequeñas manchas de marrón rojizo pálido y lavanda.

Amenazas generales en toda su área de distribución: La pava serere parece ser común en toda su área de distribución donde existe un hábitat apropiado. Es una especie de que se encuentra incluida dentro de la categoría de Menor Riesgo por la IUCN, con un área de reproducción estimada en 8.620.000 km².

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/hoatzin-hoazin/>.
- García-Amado, M. A. and S. M. Billerman (2025). Hoatzin (*Opisthocomus hoazin*), version 2.0. In Birds of the World (S. M. Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.hoatzin.02>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Carao (*Aramus guarauna*)

Nombre T'simane: Coĩchĩro

Nombre Mojeño-trinitario: Kchure

Otros nombres: Carao, Limpkin

La mayoría de las plumas tienen marcas blancas triangulares, las mayores en las alas y el dorso, lo que da al ave un aspecto moteado



Las patas y los pies son de color negro oliváceo, los machos suelen ser más grandes que las hembras

Cuello largo y patas largas, las alas son anchas y redondeadas, con una envergadura de aproximadamente 1 m. de color marrón oliváceo uniforme, aunque más pálido en la cara, la barbilla y la garganta

Es un ave zancuda grande (55-60 cm)

• **Clase:** Aves• **Orden:** Gruiformes**Distribución continental:**

EE.UU. (Florida) hacia el sur a través de las islas del Caribe y América Central y del Sur hasta Argentina, Perú y Bolivia.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz y Tarija.

Distribución en Loma Santa: Pto. Gerardo, Pto. Vichí, ricansi y Rosario.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chiquitania, Chaco y Sabanas Inundables.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** No enlistada.
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Utiliza una gran diversidad de hábitat, desde marismas abiertas de agua dulce, bosques ribereños, orillas de lagos y estanques. En Bolivia, es poco común a común en bordes de pantanos, lagunas, ríos, en sabana inundada, arbustales abiertos, pasturas y campos agrícolas húmedos y zanjas de tierras bajas y piedemonte inferior de los Andes sureños; puede ser escaso y local en hábitats aparentemente adecuados; raro y local en márgenes de lagunas amazónicas. Sus nidos son construidos en una gran variedad de sitios, los cuales son en forma de plataformas de cualquier material disponible a su alcance: en árboles o arbustos, palos muertos (o con más dificultad vivos), lianas, hojas o cualquier otro tipo de vegetación acuática. Coloca de 4 a 5 huevos con una gran variedad de colores desde: blanco grisáceo claro y marrón o tonos que varían, pero nunca claros y oscuros con marcas manchadas y estriadas.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** El carao parece ser común en toda su área de distribución donde existe un hábitat apropiado. Es una especie de que se encuentra incluida dentro de la categoría de Menor Riesgo por la IUCN.

Mapa: Asociación Civil Armonía


- Bryan, D. C. (2020). Limpkin (*Aramus guarauna*), version 1.0. In Birds of the World (A. F. Poole and F. B. Gill, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.limpki.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/limpkin-carau/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Trompetero (*Psophia leucoptera*)

Nombre T'simane: Vutiti

Nombre Mojeño-trinitario: Tjotete'i

Otros nombres: Jacamin, Trompetero y Pale-winged Trumpeter



- **Clase:** Aves
- **Orden:** Gruiformes



Bolivia

Distribución continental:
Bolivia, Brasil y Perú.

Distribución Nacional: Beni, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:
Piñal, Pto. Gerardo, Pto. Vichiricansi, Rosario y Chirisi.

Ecorregiones: Amazonia.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

65

❗ **Hábitat y Biología:** Bosque húmedo tropical maduro y denso, desde tierras bajas, en zonas alejadas de asentamientos humanos. En Bolivia, raro a localmente bastante común (donde no es cazado) en el interior de bosque amazónico de tierra firme, transición, várzea, piedemonte húmedo y Yungas inferior de Bolivia noroeste, con una población disyunta en Santa Cruz. Requiere de bosque bien conservado. Normalmente en grupos familiares; no es tímido. Principalmente terrestre, forrajea caminando lentamente. El nido se encuentra en un hueco elevado en el tronco de un árbol, a una media de 11 m sobre el suelo; no construye nido. Coloca de 2 a 4 huevos blancos, incubación 23-29 días.

⚠️ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No está globalmente amenazada. Actualmente considerada como Menor Riesgo aparentemente extendida en la selva tropical no perturbada, en zonas remotas que permanecen esencialmente sin explotar por el hombre. Densidad de población en condiciones ideales en selva tropical remota no perturbada.

Mapa: Asociación Civil Armonía

• Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., Maccormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/trumpeters-trompeteros/psophia-leucoptera/>.

• IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

• Sherman, P.T., P. F. D. Boesman, C. J. Sharpe, and D. A. Christie (2020). Pale-winged Trumpeter (*Psophia leucoptera*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.pawtru2.01>.


• UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Taracoé (*Aramides Cajaneus*)

Nombre T'simane: Ch'ivia

Nombre Mojeño-trinitario: Ktare

Otros nombres: Taracoé y Gray-necked Wood-Rail

• **Clase:** Aves• **Orden:** Gruiformes**Distribución continental:**

Desde Costa Rica, Colombia (incluidas las islas frente a Panamá), Ecuador, Perú, Guayanas, Brasil, Bolivia, Argentina Paraguay y Uruguay

Distribución Nacional:

Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando, Santa Cruz y Tarija.

Distribución en Loma Santa:

En toda el área de Conservación.

Corregiones: Amazonia.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: En una gran diversidad de hábitat como ser: bosques pantanosos, arroyos forestales y ríos de crecimiento secundario y bosques caducifolios; pantanos costeros y manglares; pantanos y matorrales pantanosos, sobre todo en zonas boscosas; arrozales, e incluso cañaverales y pastizales de matorral siempre que incluyan zonas húmedas. En Bolivia, poco común a bastante común en casi todo tipo de bosque, arbustales, pastizales o humedales de tierras bajas y ladera este inferior de los Andes, incluyendo campos agrícolas. El nido en forma de un recipiente profundo construido de ramitas, tallos secos de malas hierbas y materiales similares, o una masa compacta y voluminosa de hojas y ramitas muertas con una depresión central poco profunda; suele estar a 1-7 m de altura en un arbusto, enredadera, árbol bajo o en un tocón de árbol, a menudo sobre o cerca del agua, a veces en el suelo, coloca de 3 a 7 huevos blancuzcos.

Amenazas generales en toda su área de distribución: No está globalmente amenazada. Actualmente considerada como Menor Riesgo aparentemente sigue siendo de bastante común a común en gran parte de su extensa área de distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/rails-gallinules-coots-crakes-rascones-gallinetas-gallaretas-y-pollas-de-agua/aramides-cajaneus/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia.

Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

- Taylor, B. (2020). Gray-cowled Wood-Rail (*Aramides cajaneus*), versión 1.0. En *Aves del Mundo* (SM Billerman, BK Keeney, PG Rodewald y TS Schulenberg, Editores). Laboratorio de Ornitología de Cornell, Ithaca, NY, EE. UU. <https://doi.org/10.2173/bow.gycwor1.01>.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Patito pun pun (*Heliornis fulica*)

Nombre T'simane: Tsu tsú

Nombre Mojeño-trinitario: Pojigira

Otros nombres: Patito pun pun y Sungrebe



Bolivia

Distribución continental:

Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guayana Francesa, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando, Santa Cruz y Tarija.

Distribución en Loma Santa:

En casi toda el área de Conservación..

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania y sabanas inundadas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❶ **Hábitat y Biología:** Es una especie acuática, que prefiere lugares con vegetación que sobresalga del agua, incluidos arroyos, manglares, estanques y lagunas, incluso ocupará zanjas anchas llenas de agua. En Bolivia, es considerada rara a bastante común en tierras bajas húmedas; prefiere lagunas pequeñas, remansos y arroyos pequeños en bosque alto. Solitaria o en parejas; típicamente tímida y retraída; generalmente bucea y vuela bajo (por encima del agua) de inmediato cuando se siente observada. El nido es una plataforma de ramitas, cañas y forrado de hojas muertas de aproximadamente 22 cm de diámetro y 7 cm de profundidad. Colocade de dos a cuatro huevos de color blanco teja y están "manchados" finamente de canela y púrpura de manera bastante uniforme por toda la superficie.

❷ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** Dado que el área de distribución es muy amplia y que la especie no es objetivo directo del uso humano, la IUCN califica el estado de conservación como Menor Riesgo.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/sungrebe-ave-del-sol/>.
- Luo, M. K. (2020). Sungrebe (*Heliornis fulica*), version 1.0. In *Birds of the World* (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.sungre1.01>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Leque leque (*Vanellus chilensis*)


Nombre T'simane: Temteyīs

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Leque leque y Southern Lapwing

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Charadriiformes

Las alas presentan un brillo iridiscente verde bronce



En la superficie del ala, las coberteras mayores y medianas son blancas, formando una banda blanca diagonal que atraviesa el ala en vuelo

Tiene las partes superiores de color marrón grisáceo con el vientre y las coberteras blancas



Una característica muy distintiva del leque leque es la cresta negra filamentososa.

Una banda negra en el pecho, una mancha blanca de plumas de tamaño variable puede rodear la parte de la corona

De tamaño mediano (31-36 cm)

68

Las primarias y la mayoría de las secundarias son negras

❗ **Hábitat y Biología:** Puede encontrarse en la costa, cerca de lagos, lagunas y ríos, es una especie que se adaptada a los pastizales abiertos, pudiendo encontrarse en prados, pastos, granjas, césped, así como en cualquier otro paisaje urbano en el que el sustrato predominante sea la vegetación herbácea corta. En Bolivia, es bastante común a abundante en áreas abiertas en la mayor parte de tierras bajas y piedemonte de los Andes. Principalmente habita en pastizales, orillas de ríos, pasturas, zonas agrícolas; también en áreas verdes urbanas.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** Es una especie que está ampliamente distribuida y son comunes en toda Sudamérica, por lo que la especie está considerada como Menor Riesgo por la UICN.

Mapa: Asociación Civil Armonía

**Distribución continental:**

Desde Costa Rica, Panamá y toda Sudamérica.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando, Santa Cruz y Tarija.

Distribución en Loma Santa: En Rosario y Chirisi.

Ecorregiones: Cerrado, Chaco, Chiquitania y sabanas inundadas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/lapwings-plovers/vanellus-chilensis/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia.

Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.


- Santos, E. S. A. (2020). Southern Lapwing (*Vanellus chilensis*), version 1.0. In *Birds of the World* (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.soulap1.01>.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Tibibi (*Actitis macularius*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -


Otros nombres: : Tibibi y Spotted Sandpiper



Plumaje alterno parduzco a gris oliva por encima, blanco por debajo con llamativas manchas negras. Plumaje reproductivo muy moteado, diferente al de cualquier otro tibibi



En plumaje básico, partes superiores más grises y menos marcadas, partes inferiores sólo ligeramente manchadas



De tamaño mediano (18-20 cm).



Bolivia

Distribución continental:

Todo el continente americano.

Distribución Nacional: Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando, Santa Cruz y Tarija.

Distribución en Loma Santa:

Puerto Gerardo y sobre orilla de los ríos.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania, Valles y sabanas inundadas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** No
- **Migrante:** Boreal

❶ **Hábitat y Biología:** Se encuentra en cualquier lugar donde haya agua, incluida la costa, normalmente prefiere el hábitat de agua dulce como lagos, ríos y playas. Durante la migración otoñal, en las riberas de ríos y lagunas. Construye su nido principalmente de hierba muerta y pequeño material leñoso y, ocasionalmente algunas hierbas vivas. Coloca de 1 a 3 huevos de color blanquecino al beige rosáceo pálido y a veces verde opalino.

❷ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No está globalmente amenazada, aunque el riesgo de pesticidas puede ser alto. Es el Scolopácido más ampliamente distribuido y uno de los más comunes.

Mapa: Asociación Civil Armonía

• Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., Maccormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/sandpipers/actitis-macularius/>.

• IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

• Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

• Reed, J. M., L. W. Oring, and E. M. Gray (2020). Spotted Sandpiper (*Actitis macularius*), version 1.0. In *Birds of the World* (A. F. Poole, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.sposan.01>.

• UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.


Ave lira (*Eurypyga helias*)

Nombre T'simane: Jarú

Nombre Mojeño-trinitario: Rira

Otros nombres: Ave Lira y Sunbittern

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Eurypygiformes



Bolivia

Distribución continental:

México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Venezuela, Surinam, las Guayanas, Brasil, Perú y Bolivia.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

En casi toda el área de Conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania y sabanas inundadas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Su hábitat preferido son los arroyos boscosos, los bancos de arena de los ríos y las pozas forestales. Utiliza tanto arroyos rápidos y rocosos, así como arroyos de movimiento más lento y fondo arenoso o limoso. En Bolivia, es rara y localmente bastante común en arroyos bajo sombra, orillas de ríos (de corriente lenta y rápida), lagunitas y lagunas en bosque húmedo de tierras bajas y ladera este de los Andes. Construye su nido de hojas descompuestas, palos y musgo verde, unido por barro, coloca de 2 a 3 huevos de color rosa canela pálido a marrón amarillento, con manchas irregulares de marrón rojizo y lila grisáceo

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** El ave lira actualmente en la lista de especies de Menor riesgo (IUCN) con una población estimada de al menos 500.000 individuos y un área de distribución estimada de 8.420.000 km².

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Fitzgerald, J., T. S. Schulenberg, and G. F. Seeholzer (2020). Squirrel Cuckoo (Playa cayana), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.squcucil.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/cuckoos-cuculillos/playa-cayana/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEP-WCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Bato (*Jabiru mycteria*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: Kcipi

Otros nombres: Bato y Jabiru

Plumaje totalmente blanco
con abultamiento del cuello
desnudo principalmente
negro con anillo rojizo de piel
desnuda en su base

Pico negro

Patas negras

En un ave grande
(122-140 cm. Con una
envergadura 230-260
cm.)



Bolivia

Distribución continental: EE México, América Central y el N de Sudamérica (Colombia, Perú, Bolivia, Brasil y Argentina).

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando, Santa Cruz y Tarija.

Distribución en Loma Santa: Rosario de Tacuaral.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania y sabanas inundadas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Menor Riesgo
- **CITES:**
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❶ **Hábitat y Biología:** Áreas pantanosas, sabana, llanos, tierras de ranchos con estanques y lagunas, orillas de grandes ríos y lagos con árboles dispersos y cultivos inundados. En Bolivia, poco común a común en sabana estacional inundada, humedales, lagunas poco profundas y hábitats acuáticos similares de tierras bajas; en menor número a lo largo de ríos grandes. Construye su nido en arboles grandes donde coloca de 3 a 4 huevos.

❷ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No está globalmente amenazada (Menor riesgo) donde se estima que las poblaciones combinadas de Centroamérica y el N de Sudamérica se encuentran dentro de un rango de 10.000 - 25.000 individuos.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Elliott, A., E. García, G. M. Kirwan, and P. F. D. Boesman (2020). Jabiru (*Jabiru mycteria*), version 1.0. In *Birds of the World* (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.jabiru.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/storks/jabiru-mycteria/>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species - CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Cabeza seca (*Mycteria americana*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Cabeza seca y Wood Stork

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Ciconiiformes



Los adultos son completamente blancos, menos en las plumas primarias, secundarias del ala y la cola corta, que son negras, con brillos verdosos y violáceos



Bolivia

Distribución continental:

Ampliamente distribuida en Sudamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, las Guayanas y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando, Santa Cruz y Tarija.

Distribución en Loma Santa: Pto. Gerardo, Pto. Salas, Rosario y Chirisi.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chaco, Chiquitania y sabanas inundadas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Menor riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Áreas pantanosas, sabana, llanos, tierras de ranchos con estanques y lagunas, orillas de grandes ríos y lagos con árboles dispersos y cultivos inundados. En Bolivia, poco común a común en una variedad de hábitats acuáticos de agua dulce de tierras bajas. Los nidos son estructuras grandes y voluminosas situadas en vegetación leñosa sobre el agua o en islas. Coloca de 1 a 5 huevos de color blanco cremoso.

Amenazas generales en toda su área de distribución: Dado que el área de distribución es muy amplia y que la especie no es objetivo directo del uso humano, la IUCN califica el estado de conservación como Menor Riesgo.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Coulter, M. C., J. A. Rodgers Jr., J. C. Ogden, and F. C. Depkin (2020). Wood Stork (*Mycteria americana*), version 1.0. In Birds of the World (A. F. Poole and F. B. Gill, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.woosto.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/storks/mycteria-americana/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEP-WCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Pato víbora (*Anhinga anhinga*)

Nombre T'simane: Arará

Nombre Mojeño-trinitario: Scokre

Otros nombres: Pato víbora, pato aguja y Anhinga



- **Clase:** Aves
- **Orden:** Suliformes



Distribución continental:

Ampliamente distribuida
Argentina, Belice, Bolivia, Brasil,
Colombia, Ecuador, Guayana
Francesa, Guatemala, Guyana,
Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, Surinam
y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni,
Cochabamba, La Paz, Pando,
Santa Cruz y Tarija.

Distribución en Loma Santa:
Pto. Salas, Rosario y Chirisi.

Ecorregiones: Amazonia,
Cerrado, Chaco, Chiquitania y
sabanas inundadas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Menor Riesgo
- **CITES:**
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Aguas poco profundas, de movimiento lentos, con perchas y orillas cercanas disponibles para secarse y tomar el sol, también en pantanos que proporcionan zonas poco profundas y con vegetación para la caza. En Bolivia, es raro a localmente bastante común en lagunas y ríos de tierras bajas y piedemonte inferior de los Andes sur. Nido en forma de plataforma voluminosa de palos, algo más compacta que los nidos de garza, normalmente sobre el agua, a menudo, pero no siempre forrada con hojas frescas y ramitas verdes. Coloca de 3 a 5 huevos de color verde azulado pálido.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** Dado que el área de distribución es muy amplia y que la especie no es objetivo directo del uso humano, la IUCN califica el estado de conservación como Menor Riesgo.

Mapa: Asociación Civil Armonía

• Frederick, P. C. and D. Siegel-Causey (2020). Anhinga (*Anhinga anhinga*), version 1.0. In Birds of the World (A. F. Poole and F. B. Gill, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.anhing.01>.

• Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/anhinga/>.

• IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

• Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

• UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEP/WCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Pato cuervo (*Phalacrocorax brasilianus*)

Nombre T'simane: Cajno

Nombre Mojeño-trinitario: Ktino

Otros nombres: Pato cuervo y Neotropic Cormorant

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Suliformes



Distribución continental:

Presenta una amplia distribución abarcando desde EEUU, Centro América y toda Sudamérica.

Distribución Nacional: Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando, Santa Cruz y Tarija.

Distribución en Loma Santa: Pto. Vichi'ricansi, Pto. Salas, Rosario y Chirisi.

Ecorregiones: Amazonia, Yungas, Chaco, Cerrado, Chiquitania y sabanas inundadas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Menor riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Áreas pantanosas, sabana, llanos, tierras de ranchos con estanques y lagunas, orillas de grandes ríos y lagos con árboles dispersos y cultivos inundados. En Bolivia, poco común a común en una variedad de hábitats acuáticos de agua dulce de tierras bajas. Los nidos son estructuras grandes y voluminosas situadas en vegetación leñosa sobre el agua o en islas. Coloca de 1 a 5 huevos de color blanco cremoso.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** Dado que el área de distribución es muy amplia y que la especie no es objetivo directo del uso humano, la IUCN califica el estado de conservación como Menor Riesgo.

Mapa: Asociación Civil Armonía


- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/cormorant/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.
- Il, R. C. and M. L. Morrison (2022). Neotropic Cormorant (*Nannopterum brasilianum*), version 2.2. In Birds of the World (P. G. Rodewald and B. K. Keeney, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.neocor.02.2>.

Garza (*Tigrisoma lineatum*)

Nombre T'simane: Jeé

Nombre Mojeño-trinitario: Wakarena

Otros nombres: Garza y Rufescent Tiger-Heron



Bolivia

Distribución continental:

Desde el E de Honduras, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Bolivia, Argentina, Paragay y Uruguay.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando, Santa Cruz y Tarija.

Distribución en Loma Santa:

En casi toda el área de Conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chaco, Chiquitania, Yungas y sabanas inundadas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Suele encontrarse a lo largo de orillas boscosas de corrientes lentas en ríos, pantanos y marismas de la zona tropical; con un único registro a 1150 metros de altitud en Bolivia, donde es poco común a bastante común en una variedad de hábitats acuáticos de bosques de tierras bajas y piedemonte andino, incluyendo humedales, pantanos, campos y pastizales inundados, lagunas, riachuelos y ríos. Se conoce muy poco sobre su reproducción, pero se conoce que coloca de 1-3 huevos de color blanco azulado a blanco sucio, huevos con marcas violeta pálido, rojo apagado y marrón grisáceo.

Amenazas generales en toda su área de distribución: No está globalmente amenazada (Menor riesgo). No hay información disponible sobre el estado general y el tamaño de la población, pero está muy extendida, incluso se da en zonas verdes de algunas grandes ciudades y presumiblemente no está amenazada, a pesar de la deforestación y las perturbaciones humanas en gran parte de su área de distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/herons-egrets-bitterns/tigrisoma-lineatum/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Martínez-Vilalta, A., A. Motis, and G. M. Kirwan (2020). Rufescent Tiger-Heron (*Tigrisoma lineatum*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J.

Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.rutherl01>.

- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEP-WCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Garza azul (*Agamia agami*)

Nombre T'simane: Tsonare

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Garza azul y Agami Heron

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Pelecaniformes

**Distribución continental:**

México a través de Centroamérica y N de Sudamérica hasta el NE de Ecuador, Bolivia y Brasil.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Jorori, Pto. Salas y Chirisi.

Ecorregiones: Amazonia y Chiquitania.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Casi Amenazado
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No



Inconfundible, con rostro negro azulado y corona, largas plumas de la cresta azul pálido, barbilla blanca, cuello muy largo en forma de serpiente, castaño con franja central blanca bordeada, volviéndose gris pizarra en parte inferior del cuello, con plumas de color azul plateado

Dorso verde brillante, alas y cola a veces de color azul empolvado, pecho gris pizarra a verde pizarra y vientre castaño

❗ **Hábitat y Biología:** Bordes pantanosos de lagos y márgenes de arroyos en medio de bosques tropicales, más raramente en bosques secos; también pantanos estacionales, cochas y otros cuerpos de agua pequeños. En Bolivia, es escasa y local en riachuelos, bordes de lagunas y pantanos en bosque húmedo a semihúmedo de tierras bajas. Poco se conoce sobre su biología reproductiva, nido construido de palos con depresión central, coloca de 2-4 huevos de color verde azulado pálido o azulado.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** Es una garza, catalogada como Casi Amenazada (IUCN), ya que habita en la densa vegetación ribereña, rara vez se aventura en zonas abiertas y es difícil de ver. Hay pocos datos de gran parte de su área de distribución, pero, aunque está muy extendida parece ser de escasa a localmente frecuente.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/cormorant/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.
- Il, R. C. and M. L. Morrison (2022). Neotropical Cormorant (*Nannopterum brasilianum*), version 2.2. In Birds of the World (P. G. Rodewald and B. K. Keeney, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.neocor.02.2>.

Garza chura (*Cochlearius cochlearius*)

Nombre T'simane: Vaïga

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Garza chura y Boat-billed Heron.

Frente y mejillas blancas, la parte superior de la espalda es negra, el manto pardo-amarillento, el cuello vináceo, el resto de las partes superiores grises


Los ojos son oscuros o marrones (enormes y saltones)

De color blanco y con un ancho, aplastado y grueso pico (negro con amarillo en la base)

Las patas y los pies verdes

Garganta de color amarillo y gris o rosa

Garza de tamaño mediano (45-53)



Bolivia

Distribución continental:

México, Belice, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia, las Guayanas, Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay y Argentina.

Distribución Nacional:

Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

En casi toda el área protegida.

Ecorregiones: Amazonia, Sabanas inundadas y Chiquitania.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: En bosque denso a lo largo de la costa ríos, márgenes de arroyos de agua dulce, lagos, marismas y pantanos. En Bolivia, es rara a poco común y al parecer un tanto local, en lagunas, ríos y riachuelos dentro de bosque húmedo a semihúmedo de tierras bajas.

Construye su nido bastante pequeño a veces utilizan nidos de otras especies. Coloca de 1-4 huevos de color azul pálido a verde, a menudo manchados de canela en el extremo más grande.

Amenazas generales en toda su área de distribución: No está globalmente amenazada (Menor Riesgo), generalmente se encuentra en todos los hábitats adecuados dentro de su área de distribución; no se dispone de datos sobre su estado real ni sobre el tamaño de la población.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/herons-egrets-bitterns/cochlearius-cochlearius/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Martínez-Vilalta, A., A. Motis, and G. M. Kirwan (2020). Boat-billed Heron (*Cochlearius cochlearius*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal,

D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.bobher1.01>.

- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.


Garza cuajo (*Nycticorax nycticorax*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Garza cuajo y Black-crowned Night-Heron

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Pelecaniformes



Bolivia

Distribución continental:

La garza nocturna más ampliamente distribuida en el mundo y se reproduce en todos los continentes excepto en la Antártida y Australia.

Distribución Nacional: En todo el país.

Distribución en Loma Santa: En casi toda el área protegida.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Yungas, Chaco, Sabanas inundadas y Chiquitania.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

78

Hábitat y Biología: Especialmente en zonas con vegetación acuática o en los márgenes arbolados de ríos poco profundos, arroyos, lagunas, charcas, estanques, lagos, pantanos, marismas y manglares; también en marismas costeras. En Bolivia, poco común a localmente común en humedales, pantanos, bofedales, bordes de lagos y bosque ribereño. El nido suele ser una plataforma compuesta de palos de árboles y otra vegetación disponible, colocan de 2 a 3 huevos de color azul verdoso.

Amenazas generales en toda su área de distribución: No está globalmente amenazada (Menor Riesgo). De común a localmente abundante en la mayor parte de su área de distribución; su amplísima distribución hace muy difícil una estimación poblacional global.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/herons-egrets-bitterns/nycticorax-nycticorax/>.
- Hothem, R. L., B. E. Brussee, W. E. Davis Jr., A. Martínez-Vilalta, A. Motis, and G. M. Kirwan (2020). Black-crowned Night Heron (*Nycticorax nycticorax*), version 1.0. In Birds of the World (S. M. Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.bcnher.01>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEP-WCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Cuajito (*Butorides striata*)

Nombre T'simane: Tsam

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Cuajito y Striated Heron

De color pardusco, fuertemente estriado en el cuello y manchado de blanquecino y beige en la parte superior de las alas



- **Clase:** Aves
- **Orden:** Pelecaniformes



Distribución continental: El cuajito es una garza ampliamente distribuida en el mundo y se encuentra en todo el continente sudamericano.

Distribución Nacional: Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando, Santa Cruz y Tarija.

Distribución en Loma Santa: En casi toda el área protegida.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Valles, Chaco, Sabanas inundadas y Chiquitania.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN:** NT: Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❶ **Hábitat y Biología:** Frecuenta tanto el agua dulce como la salada. Normalmente en vegetación densa a lo largo de arroyos, ríos, lagos, estanques, pastizales, arrozales y otros cultivos inundados. En Bolivia, poco común a común en humedales, pantanos y vegetación acuática emergente en bordes de lagunas y ríos de tierras bajas y ladera este de los Andes. Construye su nido de palitos o ramas donde coloca 3-5 huevos de color azul verdoso pálido.

❷ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No amenazada globalmente (Menor Riesgo). Generalmente común a localmente abundante en toda su área de distribución casi cosmopolita; se dispone de pocos detalles sobre el tamaño de las poblaciones.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., Maccormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/herons-egrets-bitterns/butorides-striata/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Martínez-Vilalta, A., A. Motis, D. A. Christie, and G. M. Kirwan (2020). Striated Heron (*Butorides striata*), version 1.0. In Birds of the World (S. M. Billerman, B. K.

Keeney, P. G. Rodewald, and T. S. Schulenberg, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.strher.01>.

- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.



Manguarí (*Ardea cocoi*)

Nombre T'simane: Garajpé

Nombre Mojeño-trinitario: Guaji

Otros nombres: Manguarí y Cocoi Heron

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Pelecaniformes

**Distribución continental:**

Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Brasil, Bolivia, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

Distribución Nacional: Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando, Santa Cruz y Tarija.**Distribución en Loma Santa:** En casi toda el área protegida.**Ecorregiones:** Beni, La Paz, Chuquisaca, Cochabamba, Pando, Santa Cruz y Tarija.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

80

Hábitat y Biología: Generalista; el manguarí puede utilizar varios tipos de humedales, incluidos manglares, pantanos, orillas de lagos, ríos, pequeños arroyos, pastizales inundados. En Bolivia, poco común a bastante común en una amplia variedad de hábitats acuáticos y abiertos de tierras bajas y ladera este inferior de los Andes. Construyen sus nidos grandes con ramas y palos secos donde llegan a colocar de 2 a 5 huevos de color azul cielo.

Amenazas generales en toda su área de distribución: No amenazada globalmente (Menor Riesgo). Generalmente común a localmente abundante en toda su área de distribución casi cosmopolita.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/herons-egrets-bitterns/ardea-cocoi>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Martínez-Vilalta, A., A. Motis, G. M. Kirwan, S. Arias, P. F. D. Boesman, B. Bosarreyes, T. Galluppi, C. Marqués Ferri, E. C. Olsen, P. Pyle, D. Rodríguez, and K. L. Sheehan (2025). Cocoi Heron (*Ardea cocoi*), version 1.1. In Birds of

the World (F. Medrano, J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.cocher1.01.1>.

- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Garza real (*Pilherodius pileatus*)

Nombre T'simane: Jogoyi

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Garza real y Capped Heron

Las alas y el dorso están cubiertos de plumas blancas. De tres a cuatro largas plumas blancas se extienden desde la corona negra

Es la única con pico y cara azules y corona negra



El vientre, el pecho y el cuello están cubiertos de plumas de color blanco amarillento o crema claro

Garza mediana
(45-50 cm)



Bolivia

Distribución continental:

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En casi toda el área protegida.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chaco, Sabanas inundadas y Chiquitania.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: La garza real, en Bolivia puede ser rara a poco común en bosque pantanoso y bosque de bordes de lagunas, riachuelos y ríos de tierras bajas húmedas a semihúmedas. Se conoce muy poco sobre su biología reproductiva, donde construye sus nidos en árboles bajos y donde coloca de 2 a 3 huevos.

Amenazas generales en toda su área de distribución: Esta especie tiene una distribución extremadamente amplia, por lo que no se acerca a los umbrales de Vulnerabilidad según el criterio de tamaño de distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Buderman, F. E. (2020). Capped Heron (*Pilherodius pileatus*), version 1.0. In *Birds of the World* (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.capher1.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/herons-egrets-bitterns/pilherodius-pileatus/>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Garza blanca (*Egretta thula*)


Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Garza blanca y Snowy Egret

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Pelecaniformes

Ave con plumaje
completamente
blanco



Piel desnuda de color amarillo
brillante y patas largas,
comparativamente delgadas
y negras, con pies de color
amarillo brillante



Pico largo y
delgado de
color negro

Una garza
mediana
(45-55 cm)



Bolivia

Distribución continental: Con una amplia distribución nativa de América, desde Canadá a Argentina y Chile.

Distribución Nacional: Con una amplia distribución nativa de América.

Distribución en Loma Santa: Pto. Gerardo, Jorori, Rosario y Chirisi.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chaco, Sabanas inundadas, Valles y Chiquitania.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Bastante común a abundante en una variedad de hábitats de tierras bajas y más localmente en la ladera este de los Andes centrales y sur, incluyendo pantanos, lagunas, ríos y áreas agrícolas; rara y poco común en el Altiplano noreste (principalmente en los lagos Titicaca y Uru Uru). Construyen sus nidos en forma redondeada donde utilizan ramitas sueltas y pequeños palos, colocan de 3 a 5 huevos de color azul verdoso pálido.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No amenazada globalmente (Menor Riesgo). Generalmente común a localmente abundante en toda su área de distribución casi cosmopolita.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/herons-egrets-bitterns/egretta-thula/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia.

Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

- Parsons, K. C. and T. L. Master (2020). Snowy Egret (*Egretta thula*), version 1.0. In *Birds of the World* (A. F. Poole and F. B. Gill, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.snoegr.01>.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Ibis verde (*Mesembrinibis cayennensis*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Ibis Verde y Green Ibis



Distribución continental:

Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay y Argentina.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando, Santa Cruz y Tarija

Distribución en Loma Santa:

Pto. Gerardo, Jorori, Rosario y Chirisi.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chaco, Sabanas inundadas, Valles y Chiquitania.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Poco a localmente bastante común en humedales, pantanos de palma real y márgenes de ríos, riachuelos y lagunas con bosque adyacente de tierras bajas. El nido es una plataforma de palos colocados sin apretar. Coloca de 2 a 4 huevos de color verde oliva intenso.

🌿 **Amenazas generales en toda su área de distribución:** Aunque la población parece estar disminuyendo, el Ibis verde tiene una amplia área de distribución geográfica y una gran población mundial, por lo que su estado de conservación se califica como Menor Riesgo (IUCN).

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/ibises/mesembrinibis-cayennensis/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia.

Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

- Molfetto, D. (2020). Green Ibis (*Mesembrinibis cayennensis*), version 1.0. In *Birds of the World* (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.greibil.01>.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.


Cóndor de los llanos (*Sarcoramphus papa*)

Nombre T'simane: Guirĩj

Nombre Mojeño-trinitario: 'Seno'i

Otros nombres: Cóndor de los Llanos, King Vulture

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Cathartiforme



Las aves jóvenes son completamente oscuras y alcanzan el plumaje blanco y el colorido de la cabeza y el cuello de los adultos gradualmente en el transcurso de sus primeros cuatro años

La cabeza y el cuello están desnudos y cubiertos de sobresalientes pliegues cutáneos e intrincados dibujos de color púrpura, naranja y amarillo

El cuerpo del adulto es mayoritariamente blanco, con plumas externas del ala negras contrastadas y un collar negruzco

Ave grande, entre 67 y 81 cm de longitud



Bolivia

Distribución continental:

México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guyana, Guyana Francesa, Surinam, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Paraguay y Argentina.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

Pto. Calixto, Pto. Gerardo, Jorori, Rosario.

Ecorregiones: Amazonia, Boliviano-Tucumano, Cerrado, Chiquitania, Chaco, Chaco Serrano, Sabanas Inundables, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** Apéndice III
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Raro a poco común en una amplia variedad de hábitats secos a húmedos de tierras bajas y ladera este inferior de los Andes; principalmente debajo de 1500 m; en los Andes sureños hasta 2000 m, rara vez más alto. Principalmente habita en bosques, pero también planea y desciende por carroña a pastizales y arbustales abiertos.

⚠️ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Sin embargo, cuenta con algunas amenazas identificadas como ser: la tala de bosques maduros y la conversión del hábitat para la agricultura y la ganadería, la caza furtiva y el envenenamiento por plomo.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. http://birdsofbolivia.org/es/sarcoramphus_papa/.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Holste, M., J. M. Ruth, and J. C. Eitniear (2020). King Vulture (*Sarcoramphus papa*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.kinvull1.01>.

Sucha cabeza negra (*Coragyps atratus*)

Nombre T'simane: Tsié

Nombre Mojeño-trinitario: Spugi

Otros nombres: Sucha Cabeza Negra, Black Vulture



Cola muy
corta y
cuadrada

En todas las edades, plumaje es enteramente negro, excepto las plumas externas del ala que son blanquecinas con puntas negruzcas en las partes inferiores, formando una mancha plateada reflectante en la superficie inferior del ala externa que es visible cuando el ala está extendida

Ave grande con una longitud de 60-68 cm, su peso varía entre 1,6 y 2,2 kg



Pico relativamente largo y ganchudo. En los adultos, pico negro con la punta clara y cabeza sin plumas, gris y muy arrugada. Los juveniles muestran un pico oscuro con la punta negra y la cabeza cubierta de cortas plumas grises

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Cathartiforme



Bolivia

Distribución continental: Estados Unidos, México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guyana, Guyana Francesa, Surinam, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando, Potosí, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En toda el área.

Ecorregiones: Boliviano-Tucumano, Cerrado, Chiquitania, Chaco, Chaco Serrano, Sabanas Inundables, Valles Secos Interandinos, Yungas y Puna Húmeda.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

① **Hábitat y Biología:** Bastante común a abundante en zonas abiertas de tierras bajas y ladera este de los Andes; menos abundante a mayor altura; mayor abundancia cerca de ciudades, especialmente vertederos de basura. Ausente en áreas con bosque extenso; su rango se expande con la deforestación.

② **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Sin embargo, cuenta con algunas presiones debido a las actividades humanas como ser: Pérdida y degradación del hábitat, disparos y trampas, pesticidas y otros contaminantes/tóxicos y colisiones con estructuras u objetos fijos/en movimiento.

Mapa: Asociación Civil Armonía

• Buckley, N. J., B. M. Kluever, R. Driver, and S. A. Rush (2022). Black Vulture (*Coragyps atratus*), version 2.0. In Birds of the World (P. G. Rodewald and B. K. Keeney, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.blkvul.02>.

• Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.

• Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., Maccormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/coragyps-atratus/>.

• IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.


Peroquí (*Cathartes aura*)

Nombre T'simane: Cayen

Nombre Mojeño-trinitario: Giovesi

Otros nombres: Peroquí, Sucha Cabeza Roja, Turkey Vulture

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Cathartiforme



jota

Su pico es corto, ganchudo, y de color marfil

Es un ave grande, con una longitud de 64-81 cm y un peso que puede variar entre 0,85 y 2,26 kg



ruficollis

Su plumaje es marrón oscuro hasta negro; la cabeza y el cuello no tienen plumas y son de color púrpura-rojo



Bolivia

Distribución continental: Canadá, Estados Unidos, México, Belice, Bahamas, Cuba, Puerto Rico, Jamaica, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guyana, Guyana Francesa, Surinam, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina.

Distribución Nacional: Beni, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro, Pando, Potosí, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Boliviano-Tucumano, Cerrado, Chiquitania, Chaco, Chaco Serrano, Sabanas Inundables, Valles Secos Interandinos, Yungas, Prepuna, Puna Seca y Puna Húmeda.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** No Enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Bastante común a abundante en una gran variedad de hábitats, incluyendo urbanos y agrícolas, pero en bosque húmedo raro y restringido a bordes y ríos; ausente en gran parte del Altiplano. Muy aéreo; planea solo o en bandadas, balanceándose de un lado a otro; rara vez aletea. Descansa en árboles. Olfato muy desarrollado, encuentra carroña debajo del dosel.

🚫 **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Sin embargo, cuenta con algunas presiones debido a las actividades humanas como ser: Pérdida y degradación del hábitat, disparos, trampas, envenenamiento, colisiones con estructuras u objetos fijos/en movimiento y perturbaciones en los lugares de nidificación y descanso.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/cathartes-aura/>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Kirk, D. A., M. J. Mossman, K. L. Bildstein, A. Naveda-Rodríguez, and J. M. Mallon (2024). Turkey Vulture (*Cathartes aura*), version 2.0. In *Birds of the World* (N. D. Sly, P. G. Rodewald, and B. K. Keeney, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.turvul.02>.


Sucha cabeza amarilla (*Cathartes melambrotus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Sucha cabeza amarilla, Gallinazo cabeza amarilla, Greater Yellow-headed Vulture.

El plumaje del cuerpo es negro, la cabeza y el cuello, que no tienen plumas, varían en color de amarillo profundo a naranja pálido.



Es un ave bastante grande, tiene un peso de 1,2 a 3,2 kg y un tamaño de 70-84 cm de largo



Bolivia

Distribución continental:

Colombia, Venezuela, Guyana, Guayana Francesa, Surinam, Brasil, Bolivia, Perú y Ecuador.

Distribución Nacional:

Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

En casi toda el área..

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Raro a localmente bastante común en bosque húmedo continuo de tierras bajas. Muy aéreo; planea sobre el dosel solo o en bandadas pequeñas; olfato muy desarrollado, puede encontrar carroña debajo del dosel.

🌍 **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Sin embargo, cuenta con algunas presiones debido a las actividades humanas como ser: pérdida de hábitat debido a la destrucción y fragmentación del bosque primario; también es susceptible a la acumulación de toxinas y metales pesados ingeridos de la carroña.

Mapa: Asociación Civil Armonía

• Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.

• Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/cathartes-melambrotus/>.

• IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

• Jones, M. F. (2020). Greater Yellow-headed Vulture (*Cathartes melambrotus*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.gyhvu1.01>.

Milano Cabeza Gris (*Leptodon cayanensis*)

Nombre T'simane: Uac vaeyity

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Milano Cabeza Gris, Gray-headed Kite

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Accipitriforme

**Distribución continental:**

México, Belice, Bahamas, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guyana, Guyana Francesa, Surinam, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Paraguay y Argentina.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Pto. Gerardo, Jorori, Chirisi.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania, Sabanas Inundables, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** Apéndice II
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Raro a poco común en bosque semihúmedo a húmedo de tierras bajas y piedemonte, incluyendo fragmentos grandes de bosque, islas de bosque y bosque secundario. Solitario o en parejas; posa oculto o en ramas expuestas del dosel; planea por encima de este.

🚨 **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). No se tiene constancia de que las poblaciones se vean afectadas por las actividades humanas, se necesitan más estudios en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Bierregaard, R. O. and G. M. Kirwan (2020). Gray-headed Kite (*Leptodon cayanensis*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.grhkit1.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/leptodon-cayanensis/>.
- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

Tijereta (*Elanoides forficatus*)


Nombre T'simane: Cesen

Nombre Mojeño-trinitario: Ujisropejgi

Otros nombres: Tijereta, Swallow-tailed Kite



El macho y la hembra son similares. El plumaje es blanco y negro, muy contrastado



Las plumas externas del ala, junto a la cola, las patas y el pico son negros.

Se caracteriza por la cola ahorquillada

Mide entre 55 y 65 cm de longitud



Distribución continental:

Estados Unidos, México, Belice, Cuba, Haití, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guyana, Guyana Francesa, Surinam, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Paraguay y Argentina.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Casi toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Boliviano-Tucumano, Cerrado, Chaco, Chiquitania, Chaco Serrano, Sabanas Inundables, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** Apéndice III
- **Residente:** Una parte de su población
- **Migrante:** Austral Parcial

① **Hábitat y Biología:** Raro a bastante común en una variedad de bosques secos a hiperhúmedos de tierras bajas y la mayor parte de la ladera este de los Andes; ausente en los valles secos de los Andes sur; ocasionalmente sobre sabana, arbustales abiertos, ríos y pantanos.

② **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Sin embargo, cuenta con algunas presiones debido a las actividades humanas como ser: degradación del hábitat, tiroteo y captura con trampas, recolección de huevos, pesticidas y otros contaminantes/tóxicos y colisiones con estructuras u objetos fijos/en movimiento.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/elanoides-forficatus/>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Meyer, K. D. (2020). Swallow-tailed Kite (*Elanoides forficatus*), version 1.0. In Birds of the World (A. F. Poole and F. B. Gill, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.swtkit.01>.

Águila arpía (*Harpia harpyja*)

Nombre T'simane: Boñij

Nombre Mojeño-trinitario: Chope yasi

Otros nombres: Águila Arpía, Harpy Eagle

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Accipitriforme

**Distribución continental:**

México, Belice, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Colombia, Guyana, Venezuela, Surinam y Guyana Francesa, Bolivia, Brasil, Paraguay y Argentina.

Distribución Nacional:

Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

Casi toda el área.

Ecorregiones:

Amazonia, Chiquitania y Yungas.

- **LRVB:** Vulnerable
- **IUCN:** VU: Vulnerable
- **CITES:** Apéndice I
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

90

❗ **Hábitat y Biología:** Rara y local en extensiones grandes de bosque húmedo intacto de la Amazonia, piedemonte húmedo, Yungas inferiores y Chiquitania norte; típicamente en áreas con abundancia de monos araña. Solitaria o en parejas; posa en el dosel, oculta o en ramas expuestas desde donde caza; rara vez planea bajo sobre el dosel.

🐼 **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global (IUCN) y a nivel local (LRVB) se encuentra como Vulnerables (VU). La población del Águila Arpía está disminuyendo debido a la pérdida de hábitat y a la persecución directa; y ya es muy rara o está ausente en los límites sureños y, sobre todo, al norte de su área de distribución. En Bolivia puede que merezca estatus de "En Peligro" ya que sufre de pérdida de hábitat y persecución humana. Se registran poblaciones muy pequeñas sólo en zonas remotas.

Mapa: Asociación Civil Armonía


- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/harpia-harpyja/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Schulenberg, T. S. (2020). Harpy Eagle (*Harpia harpyja*), version 1.0. In *Birds of the World* (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.hareagl.01>.

Águila Negra (*Spizaetus tyrannus*)


Nombre T'simane: Ungorio

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Águila Negra, Black Hawk-Eagle



Tiene las alas rayadas, y la cola es larga y estrecha y rara vez la expande. Las cuatro rayas color gris-violeta que se les ve en las plumas de la cola, así como la línea blanca que tienen ligeramente por encima de sus ojos, son distintivos de esta especie.



Tiene un plumaje negro oscuro con diferentes patrones en el cuerpo y en cada una de sus alas, y una coloración blanca moteado en diferentes lugares



Distribución continental:

México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guyana, Surinam, Guayana Francesa, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y Argentina.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Pto. Gerardo y Pto. Salas.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** Apéndice II
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❶ **Hábitat y Biología:** Rara a localmente poco común pero ampliamente distribuida en bosque semihúmedo a húmedo de tierras bajas, piedemonte norte y localmente Yungas inferiores. Solitaria o en parejas; caza desde ramas del dosel, también planea sobre el dosel. A menudo emite llamados mientras planea.

❷ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Sin embargo, cuenta con algunas presiones debido a las actividades humanas como ser: la deforestación y el desarrollo urbano. Los granjeros matan a esta ave porque se dice que depreda gallinas domésticas.

Mapa: Asociación Civil Armonía

• Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.

• Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/spizaetus-tyrannus/>.

• IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

• Rivas-Fuenzalida, T., K. Burgos-Andrade, and M. Canuto (2025). Black Hawk-Eagle (*Spizaetus tyrannus*), version 2.0. In Birds of the World (J. van Dort, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.blheag1.02>.

Águila Penachuda (*Spizaetus ornatus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: Pij pore'i

Otros nombres: Águila Penachuda, Ornate Hawk-Eagle.



Un par de bigotes negros que delimitan una garganta blanca, y una cresta también negra que se para cuando se excita

Es una rapaz de tamaño medio a grande de entre 60 a 70 cm de longitud, y un peso que ronda los 1,6 kg.



Tiene la espalda de color pardo oscuro o chocolate y alas negras, las partes inferiores con un hermoso barrado de gruesas bandas blancas y negra

Las patas son robustas, con uñas de un considerable tamaño, emplumadas hasta el torso

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Accipitriforme



Bolivia

Distribución continental:

México, Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guyana, Surinam, Guayana Francesa, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y Argentina.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando, Santa Cruz y Tarija.

Distribución en Loma Santa: Casi toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania, Chaco Serrano y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Casi Amenazado
- **CITES:** Apéndice II
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

92

Hábitat y Biología: Rara pero ampliamente distribuida en bosque primario y secundario semihúmedo de tierras bajas, piedemonte norte y Yungas inferiores. Solitario o en parejas; caza desde ramas del dosel; también planea.

Amenazas generales en toda su área de distribución: A nivel global se encuentra como Casi Amenazado (NT). La destrucción del hábitat y la caza. la baja reproductividad, que además es dependiente de grandes extensiones de bosque vuelve a esta especie cada vez más vulnerable. Se han observado disminuciones y desapariciones locales en muchas zonas, además, las tendencias continuas de desarrollo y tala de bosques garantizan que la población mundial seguirá disminuyendo.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/spizaetus-ornatus/>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Iliff, M.J. (2020). Ornate Hawk-Eagle (*Spizaetus ornatus*), version 1.0. In *Birds of the World* (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.orheag1.01>.

Elanio Bidentado (*Harpagus bidentatus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Double-toothed Kite



Distribución continental:

México, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana francesa, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Casi toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Boliviano-Tucumano, Chiquitania, Chaco Serrano, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** Apéndice II
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❶ **Hábitat y Biología:** Raro a poco común en bosque semi a hiperhúmedo de la Amazonía, piedemonte, Yungas inferiores, Chiquitania norte; ocasionalmente encontrado fuera de su rango normal. Solitario, ocasionalmente en parejas; caza dentro y planea por encima del dosel; a menudo sigue a monos y captura lagartijas y artrópodos espantados.

🐼 **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). No se tiene constancia de que las poblaciones se vean afectadas por las actividades humanas, se necesitan más estudios en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Bierregaard, R. O., J. S. Marks, and G. M. Kirwan (2020). Double-toothed Kite (*Harpagus bidentatus*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.dotkit1.01>.
- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/harpagus-bidentatus/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

Elanio Plomizo (*Ictinia plumbea*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Elanio Plomizo, Plumbeous Kite

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Accipitriforme



Distribución continental: México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guyana, Surinam, Guayana Francesa, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y Argentina.

Distribución Nacional: Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando, Santa Cruz y Tarija.

Distribución en Loma Santa: Casi toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Boliviano-Tucumano, Chiquitania, Chaco, Chaco Serrano, Cerrado, Valles Secos Interandinos, Sabanas Inundables y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** Apéndice II
- **Residente:** Una parte de su población
- **Migrante:** Austral Parcial

❗ **Hábitat y Biología:** Poco común a bastante común en una variedad de bosques secos a hiperhúmedos primarios y secundarios y arbustales de tierras bajas y ladera este inferior de los Andes. Solitario, en parejas o bandadas pequeñas; descansa en ramas expuestas en el dosel y planea sobre el mismo para cazar insectos aéreos.

⚠️ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Sin embargo, cuenta con algunas presiones debido a las actividades humanas. La pérdida generalizada de hábitat y la deforestación tendrán un efecto negativo en las poblaciones de esta especie, mientras que la fragmentación del hábitat puede suponer una amenaza menor, es probable que se adapte mejor a un cambio hacia el uso agrícola de la tierra.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/ictinia-plumbea/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Yu, H. (2020). Plumbeous Kite (*Ictinia plumbea*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.plukit1.01>.

Gavilán Pizarroso (*Buteogallus schistaceus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: Mo'ti

Otros nombres: Gavilán Pizarroso, Slate-colored Hawk



Distribución continental:

Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil y Guayana Francesa.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Casi toda el área.

Ecorregiones: Amazonia y Sabanas Inundables.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** Apéndice II
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❶ **Hábitat y Biología:** Raro a localmente poco común en bosques amazónicos cerca del agua, incluyendo bosque pantanoso, de galería, de bordes de lagunas, pantanos y riachuelos. Solitario dentro del bosque a media altura; caza desde ramas; se queda inmóvil durante periodos largos; fácilmente pasado por alto. Rara vez planea sobre el bosque.

🐼 **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). No se tiene constancia de que las poblaciones se vean afectadas por las actividades humanas, se necesitan más estudios en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

• Bierregaard, R. O., P. F. D. Boesman, and J. S. Marks (2020). Slate-colored Hawk (*Buteogallus schistaceus*), version 1.0. In *Birds of the World* (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.slchaw2.01>.

• Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.

• Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Mailland O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/buteogallus-schistaceus/>.

• IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

Gavilán Negro (*Buteogallus urubitinga*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Gavilán Negro, Great Black Hawk

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Accipitriforme



Distribución continental: México, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana francesa, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Pto Gerardo, Pto. Salas y Chirisi.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chaco, Chiquitania, Chaco Serrano, Valles Secos Interandinos y Sabanas Inundables.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** Apéndice II
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Raro a bastante común cerca del agua en una variedad de hábitats abiertos de tierras bajas y ladera este inferior de los Andes sureños, incluyendo sabana estacional inundada, pastizales, arbustales abiertos, áreas agrícolas, bordes de bosque, márgenes de pantanos, lagunas y ríos. Solitario; típicamente posa a la vista en vegetación a baja altura o en postes, también en riberas de ríos o en árboles; caza en vuelos cortos o caminando; a menudo planea.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). No se tiene constancia de que las poblaciones se vean afectadas por las actividades humanas, se necesitan más estudios en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/Buteogallus-urubitinga/>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- van Dort, J. (2020). Great Black Hawk (*Buteogallus urubitinga*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.grbhaw1.01>.

Chuubi (*Rupornis magnirostris*)

Nombre T'simane: Itse Itsé

Nombre Mojeño-trinitario: Si'a

Otros nombres: Aguilucho Caminero, Chuubi, Roadside Hawk



ad.



juv.

El plumaje varía considerablemente en una amplia zona de distribución: en Bolivia, de manera general, la población presenta la espalda y la cabeza gris oscura, la garganta rayada o moteada de gris o leonado

Pico con base amarilla y negro en la parte media y la punta



ad.

Las plumas de la cola barradas de canela y café claro, el cuello delantero y la parte superior del pecho café claro apagado

occiduus



saturatus

Mide entre 33 y 41 cm



Bolivia

Distribución continental: México, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana francesa, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Surinam, Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando, Potosí, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Casi toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Boliviano-Tucumano, Chiquitania, Chaco, Chaco Serrano, Cerrado, Valles Secos Interandinos, Sabanas Inundables, Prepuna, Puna Húmeda y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** Apéndice II
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Poco común a común en bordes de bosque y en todos los tipos de hábitats semiabiertos a abiertos con al menos algunos árboles de tierras bajas y ladera este de los Andes, incluyendo ciudades; en bosque continuo sólo a lo largo de ríos. Solitario o en parejas; conspicuo, a menudo emite llamados mientras planea; caza desde ramas, lanzándose sobre su presa en áreas abiertas.

Amenazas generales en toda su área de distribución: Si bien se han observado descensos en algunas zonas de Centro América aparentemente como resultado de los efectos combinados de la pérdida de hábitat y del uso especialmente intenso de pesticidas, las poblaciones de esta especie se encuentran estables a nivel global, por lo tanto, se encuentra en Menor Riesgo (LC).

Mapa: Asociación Civil Armonía

• Bierregaard, R. O., P. F. D. Boesman, and G. M. Kirwan (2024). Roadside Hawk (*Rupornis magnirostris*), version 1.1. In *Birds of the World* (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, E. de Juana, and F. Medrano, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.roahaw.011>.

• Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.

• Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/rupornis-magnirostris/>.

• IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

Aguilucho Cola Blanca (*Geranoaetus albicaudatus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Aguilucho Cola Blanca, White-tailed Hawk

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Accipitriforme

La cola corta es blanca con una estrecha banda negra cerca del extremo, visible en vuelo

subad.

Pico es negro con la base un poco más clara

Una mancha roja oxidada en el hombro es igualmente característica cuando el ave está sentada con las alas cerradas. Las alas son gris oscuro por encima. La parte inferior del ala es blanquecina, con un barrado pardo

El iris es color café, la piel presente debajo de la base del pico es verde amarillento pálido

Las aves adultas son grises por encima y blancas por debajo y en la rabadilla

Puede alcanzar una longitud total de 44 a 60 cm

Las patas son amarillas con garras negras



Bolivia

Distribución continental:

México, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guyana francesa, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panamá, Trinidad y Tobago, Perú, Surinam, Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Pto. Gerardo.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania, Chaco, Cerrado, Valles Secos Interandinos, Sabanas Inundables y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** Apéndice II
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

98

❗ **Hábitat y Biología:** Raro a poco común en sabana estacional inundada, pastizales, pasturas, cerrado y bordes de bosque, matorrales arbustales abiertos secos a semihúmedos de tierras bajas y localmente en la ladera este inferior de los Andes. Solitario o en parejas; caza mientras planea o en vuelo estacionario; posa en árboles o postes.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). No se tiene constancia de que las poblaciones se vean afectadas por las actividades humanas, se necesitan más estudios en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Farquhar, C. C. (2020). White-tailed Hawk (*Geranoaetus albicaudatus*), version 1.0. In Birds of the World (A. F. Poole, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.whthaw.01>.

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/geranoaetus-albicaudatus/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

Gavilán Blanco (*Pseudastur albicollis*)

Nombre T'simane: Jó

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Gavilán Blanco, White Hawk



Distribución continental:

México, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Guyana francesa, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panamá, Trinidad y Tobago, Perú, Surinam y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

Piñal, Pto. Calixto, Pto. Gerardo y Chirisi.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitanía y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN:** LC: Preocupación menor
- **CITES:** Apéndice II
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❶ **Hábitat y Biología:** Raro a poco común en bosque primario semi a hiperhúmedo en regiones extensamente boscosas de la Amazonía oeste y este, piedemonte húmedo, Yungas inferiores y Chiquitanía norte. Al parecer prefiere terreno con colinas; ausente en la Amazonía norte llana. Solitario o en parejas; posa en el dosel superior donde fácilmente es pasado por alto; regularmente planea por encima del dosel.

❷ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Sin embargo, cuenta con algunas presiones debido a las actividades humanas como ser: tala de bosques maduros y la conversión de bosques para la agricultura y la ganadería.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/Pseudastur-albicollis/>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Magnier, B. and T. S. Schulenberg (2020). White Hawk (*Pseudastur albicollis*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.whihaw1.01>.

Sumurucucu (*Megascops choliba*)

Nombre T'simane: Mosaro gogo

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Sumurucucu, Tropical Screech-Owl



Presenta un disco o máscara facial bordeada de negro por detrás y penachos auriculares pequeños, aunque evidentes que puede levantar o replegar como si fueran orejas



Su coloración en la espalda es parda con estrías negras y manchitas canelas; por debajo es blanco también con estrías negras y un borrado ondulado con el tono canela difundido en todas partes

Su longitud total varía de 22,5 cm (macho) a 24 cm (hembra)

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Strigiformes



Distribución continental: Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, Guyana Francesa, Guyana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Pto. Gerardo, Joroni y Chirisi.

Ecorregiones: Amazonia, Boliviano-Tucumano, Cerrado, Chaco, Chaco Serrano, Chiquitania, Sabanas Inundables, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN:** LC: Preocupación menor
- **CITES:** Apéndice II
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Poco común a común en tierras bajas y parte de la ladera este de los Andes en el bosque seco abierto, degradado, de galería e islas de bosque, bordes de bosque húmedo, arbustales, pueblos y parques urbanos. Solitario o en pareja: caza desde ramas expuestas: vocaliza todo el año.

Amenazas generales en toda su área de distribución: Puede verse afectado por la persecución humana local y el uso de pesticidas. La mortalidad por el tráfico vehicular puede ser un factor de riesgo, ya que esta especie caza a veces a los lados de las carreteras.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolombia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., Maccormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/tinamus-major/>.
- Ong, C. (2020). Tropical Screech-Owl (*Megascops choliba*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.trswowl.01>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

Sumurucucu (*Megascops watsonii*)

Nombre T'simane: Eemi

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Sumurucucu, Tawny-bellied Screech-Owl

Tiene penachos
como orejas
alargadas y
presenta cejas
y anillo facial
negruzcos



La coloración de las partes inferiores
varía según la subespecie: en *O. w.*
watsonii (al norte del Amazonas) el
color de fondo es leonado rojizo a
ocráceo, con notorias líneas negras;
en *O. w. usta* (al sur del Amazonas), el
color de fondo es pálido (con matices
acanelados, grisáceos o amarillentos),
con marcas blancuzcas desde el pecho
y pocas líneas negras delgadas

El plumaje de las partes
superiores es de diferentes
tonos de color marrón.
Existen formas de plumaje
grisáceo y castaño rojizo



En promedio
mide 22 cm
de longitud y
pesa 115 g



Bolivia

Distribución continental:

Bolivia, Brasil, Colombia,
Ecuador, Guayana francesa,
Guyana, Perú, Surinam, y
Venezuela.

Distribución Nacional: Beni,
Cochabamba, Chuquisaca, La
Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:
En toda el área.

Ecorregiones: Amazonia,
Cerrado, Chaco Serrano,
Chiquitania y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN:** LC: Preocupación menor
- **CITES:** Apéndice II
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Poco común a bastante común en bosque húmedo a semihúmedo primario y secundario de tierras bajas y ladera este inferior de los Andes. Solitaria o en parejas en el sotobosque y estrato medio bajo. Vocaliza casi todo el año.

Amenazas generales en toda su área de distribución: Dado que parece estar restringida a los bosques, la principal amenaza para su supervivencia debe ser sin duda la destrucción de su hábitat. No está amenazado globalmente, sin embargo, su estado de conservación necesita revisión.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/tinamus-major/>.

- Holt, D. W., R. Berkley, C. Deppe, P. L. Enríquez, J. L. Petersen, J. L. Rangel Salazar, K. P. Segars, K. L. Wood, E. de Juana, and J. S. Marks (2020). Tawny-bellied Screech-Owl (*Megascops watsonii*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.tabscoi.01>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

Búho Penachudo (*Lophotrix cristata*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Búho Penachudo, Crested Owl

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Strigiformes

**Distribución continental:**

Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana Francesa, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Surinam, y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En casi toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** Apéndice II
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Raro a poco común en bosque húmedo primario y secundario maduro de la Amazonía, piedemonte andino norte y límite norte de la Chiquitania. Solitario o en parejas principalmente en el subdosel y dosel.

Amenazas generales en toda su área de distribución: Se requiere información sobre el tamaño, la ecología y el comportamiento de la población. La pérdida de hábitat y la deforestación son una amenaza probable para la especie, que necesita al menos parches de bosque.

Mapa: Asociación Civil Armonía


- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/tinamus-major/>.
- Holt, D. W., R. Berkley, C. Deppe, P. L. Enríquez, J. L. Petersen, J. L. Rangel Salazar, K. P. Segars, K. L. Wood, G. M. Kirwan, and J. S. Marks (2020). Crested Owl (*Lophotrix cristata*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.creowl1.01>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

Búho de Anteojos (*Pulsatrix perspicillata*)

Nombre T'simane: Oboyo

Nombre Mojeño-trinitario: Túturo

Otros nombres: Búho de Anteojos, Spectacled Owl



Distribución continental: México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, Colombia, Venezuela, Surinam, Guayana Francesa, Guyana, Paraguay, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Argentina.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Boliviano-Tucumano, Cerrado, Chaco, Chiquitania, Chaco Serrano, Sabanas Inundables, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** Apéndice II
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❶ **Hábitat y Biología:** Poco común a bastante común en bosque seco a hiperhúmedo de tierras bajas y ladera este inferior de los Andes. Un generalista de bosque, pero normalmente ausente en bosque secundario joven. Solitario o en parejas en el estrato medio y subdosel; caza desde ramas algo expuestas.

❷ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** Se requiere información sobre el tamaño, la ecología y el comportamiento de la población. No se tiene constancia de que las poblaciones se vean afectadas por las actividades humanas u otras.

Mapa: Asociación Civil Armonía

• Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.

• Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/tinamus-major/>.

• Holt, D. W., R. Berkley, C. Deppe, P. L. Enríquez, J. L. Petersen, J. L. Rangel Salazar, K. P. Segars, K. L. Wood, G. M. Kirwan, and J. S. Marks (2020). Spectacled Owl (*Pulsatrix perspicillata*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.speowl1.01>.

• IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

Buho (*Ciccaba huhula*)

Nombre T'simane: Adyity

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Búho, Black-banded Owl

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Strigiformes

**Distribución continental:**

Colombia, Venezuela, Surinam, Guayana Francesa, Guyana, Paraguay, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Argentina.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En casi toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Boliviano-Tucumano, Cerrado, Chaco Serrano y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** Apéndice II
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Raro a poco común en bosque semi a hiperhúmedo primario y secundario de la ladera este inferior de los Andes y en bosque amazónico de tierra firme, varzea y galería. Estrictamente nocturno; bastante silencioso y fácilmente pasado por alto. Solitario o en parejas en el estrato medio y dosel.

Amenazas generales en toda su área de distribución: No esta globalmente amenazada. La especie es susceptible a la destrucción de su hábitat por la transformación de la selva tropical en monocultivos y ranchos. Su estado de conservación quizá merezca una reevaluación.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr, J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/tinamus-major/>
- Holt, D. W., R. Berkley, C. Deppe, P. L. Enríquez, J. L. Petersen, J. L. Rangel Salazar, K. P. Segars, K. L. Wood, E. de Juana, J. S. Marks, and P. Pyle (2022). Black-banded Owl (*Strix huhula*), version 1.1. In Birds of the World (N. D. Sly, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.bkbowl1.01.1>
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <<https://www.iucnredlist.org>>

Lechucita Amazónica (*Glaucidium hardyi*)


Nombre T'simane: Popoigo rotý

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Lechucita Amazónica, Amazonian Pygmy-Owl

Los adultos tienen una cabeza grande y redonda que está salpicada de marcas negras, que falsamente parecen ojos. Su corona es de color marrón grisáceo, salpicada de puntos blancos muy pequeños

Las plumas de la cola y alas son de color marrón oscuro con tres barras irregulares de grandes manchas blancas



Tienen partes inferiores blancas con amplias manchas marrones o marrón rojizo

Mide de 14 a 15 cm de longitud

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Strigiformes



Distribución continental:

Colombia, Bolivia, Brasil, Guyana Francesa, Guyana, Perú, Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En toda el área.

Ecorregiones: Amazonia y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** Apéndice II
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Poco común a común en el estrato medio y subdosel de bosque amazónico de tierra firme y bosque húmedo del piedemonte; principalmente en el interior del bosque, evita bordes. Solitaria o en parejas. Canta todo el año, principalmente en el crepúsculo.

🌿 **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No está amenazado globalmente, sin embargo, como en el caso de otras especies restringidas a los bosques, es vulnerable a la pérdida de hábitat.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolombia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/tinamus-major/>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Schulenberg, T. S. (2020). Amazonian Pygmy-Owl (*Glaucidium hardyi*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.amapyo1.01>.

Caburé (*Glaucidium brasilianum*)


Nombre T'simane: Sonson yiti

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Caburé, Ferruginous Pygmy-Owl

Presenta disco facial pequeño de color café o café claro con moteado blancuzco y línea superciliar blanca. Su coronilla, nuca y partes superiores son de color café grisáceo y en la coronilla y la nuca presenta manchas blanco amarillento

Sus partes inferiores son blancas ampliamente estriadas de café claro, especialmente en los lados



Mide de 15
a 16 cm

También presenta un par de manchas redondas de color negro bordeadas de blanco y 5 a 8 barras en la cola de color blanquecino

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Strigiformes



Distribución continental: México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, en Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guyana, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Paraguay, Chile, Uruguay y Argentina.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En casi toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Boliviano-Tucumano, Cerrado, Chiquitania, Chaco, Chaco Serrano, Sabanas Inundables, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** Apéndice II
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Poco común a común en el estrato medio y subdosel de una variedad de arbustales y bosques de tierras bajas y del piedemonte, incluyendo islas de bosque en sabanas y fragmentos en zonas agrícolas. Más común en bosque secundario que primario donde se restringe a los bordes. Solitaria o en parejas. Es nocturna, pero puede presentar también actividades diurnas

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No está amenazado globalmente, sin embargo, las presiones que presenta son: degradación de hábitat, perturbaciones en sus lugares de nidificación y persecución directa debido a que se mantienen como aves de jaula en la creencia de que traen suerte y éxito.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr, J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/tinamus-mayor/>.


- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Proudfoot, G. A., R. R. Johnson, and R. Larsen (2020). Ferruginous Pygmy-Owl (*Glaucidium brasilianum*), version 1.0. In Birds of the World (S. M. Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.fepowl.01>.

Aurora (*Trogon melanurus*)

Nombre T'simane: Cocó

Nombre Mojeño-trinitario: Puckure

Otros nombres: Aurora y Black-tailed Trogon



Distribución continental:

Panamá, Colombia, Venezuela, las Guayanas, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil.

Distribución Nacional:

Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma

Santa: En toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Bastante común a común en el estrato medio superior y dosel de bosque húmedo de la Amazonía, Yungas inferiores, Chiquitania norte (donde es menos abundante); también en bordes de bosque. Hace su nido en termiteros donde coloca de 2 a 3 huevos blancos.

Amenazas generales en toda su área de distribución: Tiene una amplia área de distribución geográfica y una gran población, por lo que su estado de conservación se califica como Menor Riesgo (IUCN).

Mapa: Asociación Civil Armonía

• Collar, N. and G. M. Kirwan (2024). Black-tailed Trogon (*Trogon melanurus*), version 1.1. In *Birds of the World* (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.blttro1.01.1>.

• Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/trogons/trogon-melanurus>.

• IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

• Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

• UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Aurora amazónico (*Trogon ramonianus*)

Nombre T'simane: Cocó


Nombre Mojeño-trinitario: Puckure

Otros nombres: Aurora amazónico y Amazonian Trogon

Tienen la cabeza, cuello, hasta la mitad del pecho, negro azulado metálico oscuro, azul más intenso en la corona, la garganta es negra, con la capucha azul, por debajo de la capucha azul, una estrecha franja pectoral blanca cruza el pecho, matizándose en amarillo brillante en el resto de la parte inferior

Partes superiores verde metálico a verde azulado, hombro alar muy tenuemente vermiculado en blanco y negro

También presenta un par de manchas redondas de color negro bordeadas de blanco y 5 a 8 barras en la cola de color blanquecino



Aurora de tamaño mediano (23-25 cm)

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Trogoniformes

**Distribución continental:**

Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil

Distribución Nacional: Beni, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Pto. Gerardo, Jorori y Chirisi.

Ecorregiones: Amazonia.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: A lo largo de su área de distribución, esta especie frecuenta el dosel y el bosque medio del bosque de transición, el bosque de tierra firme, el bosque abierto de palmeras, bambú y el igapó. En Bolivia, raro a poco común en el estrato medio y sub-dosel de bosque húmedo de la Amazonía y piedemonte andino norte, incluyendo bosque secundario y arbustales. Construye su nido en termiteros, donde coloca 2 huevos de color blanco brillante.

Amenazas generales en toda su área de distribución: Aunque la Aurora amarilla no ha sido evaluada, tiene una amplia área de distribución y puede ser de común a bastante común en algunas zonas, presentando una categoría de amenaza como Menor Riesgo (IUCN).

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Greeney, H. F. (2020). Amazonian Trogon (*Trogon ramonianus*), version 1.0. In Birds of the World (S. M. Billerman, B. K. Keeney, P. G. Rodewald, and T. S. Schulenberg, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.viotro3.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/trogons/trogon-ramonianus>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.


Aurora Corona Azul (*Trogon curucui*)

Nombre T'simane: Cocó

Nombre Mojeño-trinitario: Puckure

Otros nombres: Aurora corona azul y Blue-crowned Trogon

Pico amarillo,
anillo ocular
naranja; corona
anterior, cara
y garganta
negruzcas



Resto de la corona, lados del
cuello y pecho azul verdoso
brillante, verde turquesa en la
nuca, banda pectoral blanca

parte inferior de
la cola negra con
estrechas barras
blancas y puntas
blancas más anchas



Aurora de
tamaño
mediano
(22-24 cm)



Distribución continental:

Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Ecuador, Paraguay,
y Perú.

Distribución Nacional: Beni,
Cochabamba, Chuquisaca,
La Paz, Pando y Santa Cruz.

**Distribución en Loma
Santa:** En toda el área de
conservación.

Ecorregiones: Amazonia,
Cerrado, Chiquitania,
Sabanas inundadas, Yungas
y Chaco.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Poco común a común desde el sotobosque superior hasta el dosel inferior en una variedad de bosques y arbustales secos a hiperhúmedos de tierras bajas y ladera este de los Andes; en bosque húmedo denso prefiere bordes y hábitats secundarios. Construye sus nidos en termiteros donde coloca de 2-3 huevos.

Amenazas generales en toda su área de distribución: Tiene una amplia área de distribución y puede ser de común a bastante común en algunas zonas, presentando una categoría de amenaza como Menor Riesgo (IUCN).

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Collar, N. (2020). Blue-crowned Trogon (*Trogon curucui*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.blcro1.01>
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/trogons/trogon-curucui>

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <<https://www.iucnredlist.org>>
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025

Aurora Acollarado (*Trogon collaris*)

Nombre T'simane: Cocó

Nombre Mojeño-trinitario: Puckure

Otros nombres: Aurora acollarado y Collared Trogon

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Trogoniformes

**Distribución continental:**

Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guayana, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Surinam y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.


Distribución en Loma Santa: Pto. Gerardo y Jorori.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

El macho tiene pico amarillo, cara y garganta negruzcas, anillo ocular anaranjado

Cabeza, pecho y dorso verdes con intensos reflejos dorados y cobrizos, timoneras centrales con tinte azulado



Mide 25 cm

Notable dimorfismo sexual

Alas finamente barradas de negro y blanco, collar pectoral blanco separando del vientre, cola ventral con barrado variable negro y blanco

110

❗ **Hábitat y Biología:** Bosques siempreverdes y altos secundarios, bastante común en el estrato medio superior y dosel de una variedad de bosques húmedos a semihúmedos de la Amazonía, Chiquitania norte, y Yungas inferiores; también en bordes de bosque. Anida en un agujero en nido de termitas arborícolas a una altura entre 5 y 10 m, donde coloca 2 a 3 huevos blancos.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** Dado el elevado tamaño de la población del de la Aurora de collar IUCN (2025) y su amplia distribución, se considera una baja prioridad de conservación, además debido a la cantidad relativamente alta de información sobre la especie, también se considera una baja prioridad.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/trogons/trogon-collaris>.
- Inman, S. (2020). Collared Trogon (*Trogon collaris*), version 1.0. In *Birds of the World* (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Burgo pico ancho (*Electron platyrhynchum*)

Nombre T'simane: Don'

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Burgo pico ancho y Broad-billed Motmot

Su plumaje es llamativo, la cabeza, el cuello y el pecho son naranjas; por encima es verdusco; y el vientre, el mentón y la cola son de color verde azulado, presenta un antifaz negro en la cara, y una mancha, también negra, en el pecho

Su cola es larga y fina

Su pico es ancho y plano

Es un ave de tamaño medio (33-35 cm)



Bolivia

Distribución continental:

Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá y el Perú.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

En casi todo el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

- ① **Hábitat y Biología:** Bosque húmedo y bosque antiguo secundario; tierras bajas y pie de monte. En Bolivia, poco común a común en el sotobosque y estrato medio inferior de bosque amazónico de tierra firme y transicional, del piedemonte y Yungas inferiores húmedos a hiperhúmedos, especialmente cerca de riachuelo. Hace nido en los barrancos de los ríos o arroyos, donde coloca de 2 a 3 huevos.



Amenazas generales en toda su área de distribución: No está globalmente amenazada. Bastante común en algunas zonas, pero se ha reportado un declive en zonas que sufren una gran deforestación.

Mapa: Asociación Civil Armonía

• Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., Maccormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/motmots/electron-platyrhynchum>.

• IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

• Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

• Snow, D. and G. M. Kirwan (2020). Broad-billed Motmot (*Electron platyrhynchum*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.brbrmot1.01>.

• UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Burgo colorado (*Baryphthengus martii*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Burgo colorado y Rufous Motmot


- **Clase:** Aves
- **Orden:** Coraciiformes

El dorso, las coberteras de las alas y el costado son de color verde profundo. El vientre y las coberteras son azul verdoso y las timoneras y las remeras son azul oscuro

El iris es rojo oscuro, el pico es negruzco y aserrado

La cola larga y delgada con raquetas más bien pequeñas o sin ellas

Mide 46 cm



Bolivia

Distribución continental:

Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Perú.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Pto. Vichí ricansi y Chirisi.

Ecorregiones: Amazonia y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** El Burgo colorado prefiere los bosques húmedos siempreverdes altos de tierras bajas o los bosques secundarios con árboles emergentes más altos, a lo largo de cursos de agua. En Bolivia, raro a poco común, en sotobosque y estrato medio inferior de bosque amazónico de tierra firme, del piedemonte y Yungas inferiores húmedos. Caban en barracos donde hacen sus nidos y donde colocan de 2 a 6 huevos de color blancos casi esféricos.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No está amenazada a escala mundial, se considera una especie de Menor Riesgo (IUCN). Razonablemente común en algunas partes de su área de distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/motmots/baryphthengus-martii>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Master, T. L. (2020). Rufous Motmot (*Baryphthengus martii*), version 1.0. In Birds of the World (T. S.

Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.rufmotl.01>.


- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Burgo amazónico (*Momotus momota*)

Nombre T'simane: Vurim

Nombre Mojeño-trinitario: Chututú

Otros nombres: Burgo y Amazonian Motmot



- **Clase:** Aves
- **Orden:** Coraciiformes



Distribución continental:

Colombia, Venezuela, Surinam y Guayana francesa, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, y Argentina.

Distribución Nacional: Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando, Santa Cruz y Tarija.

Distribución en Loma Santa: En toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chiquitania, Valle, Chaco y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** El burgo de mayor distribución en Bolivia. Bastante común a común en una amplia variedad de bosques y arbustales; en los Yungas húmedos restringido a bosque secundario y bordes de bosque; en la Amazonía particularmente común en bosque de várzea. Al igual que los otros burgos cavan en barracos donde hacen sus nidos y donde colocan de 2 a 5 huevos de color blancos.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** La conservación no es actualmente motivo de preocupación significativa para el Burgo Amazónico debido a su amplísima área de distribución geográfica, el gran tamaño de su población y su tendencia estable.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., Maccormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/motmots/momotus-momota/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

- Orzechowski, S. C. and T. S. Schulenberg (2020). Amazonian Motmot (*Momotus momota*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.bucmot4.01>.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Martín Pescador grande (*Megaceryle torquata*)

Nombre T'simane: Charará

Nombre Mojeño-trinitario: Schakra

Otros nombres: Martín Pescador grande y Ringed Kingfisher

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Coraciiformes



Plumaje azul intenso o gris azulado con manchas blancas, una cresta y collar blanco alrededor del cuello, el vientre completamente rojizo, que también cubre todo el pecho del macho

♂

Las hembras son más coloridas que los machos y tienen el pecho gris azulado y una estrecha franja blanca que separa el pecho del vientre



♀

Mide (40 y 42 cm)



Bolivia

Distribución continental:

Amplia distribución desde EEUU hasta Argentina y Chile.

Distribución Nacional: Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando, Santa Cruz y Tarija.

Distribución en Loma Santa:

En casi toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chiquitania, Valle, Chaco, Sabanas inundadas y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: A lo largo de ríos, riachuelos, lagunas, pantanos y zanjas inundadas de tierras bajas y ladera este inferior de los Andes, incluyendo pueblos y suburbios. Cavan en barracos donde hacen sus nidos y donde colocan de 3 a 6 huevos de color blancos.

Amenazas generales en toda su área de distribución: La conservación no es actualmente motivo de preocupación significativa para el Martín pescador grande por su amplísima área de distribución geográfica, el gran tamaño de su población y su tendencia estable.

Mapa: Asociación Civil Armonía


- Brush, T. (2020). Ringed Kingfisher (*Megaceryle torquata*), version 1.0. In Birds of the World (A. F. Poole, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.rinkini.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Solís, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/kingfishers-martin-pescadores/megaceryle-torquata/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Martín Pescador amazónico (*Chloroceryle amazona*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Martín Pescador amazónico y Amazon Kingfisher



Distribución continental:

México a través de Centroamérica y Sudamérica (no en Chile).

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando, Santa Cruz y Tarija.

Distribución en Loma Santa:

En los ríos Cavito, Apere y sus afluentes en el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chiquitania, Valle, Chaco, Sabanas inundadas y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Grandes ríos con flujos lentos o rápidos con rápidos y pozas profundas, también orillas de lagos y lagunas arboladas. En Bolivia, poco común a bastante común a lo largo de márgenes mayormente boscosos o arbolados de ríos, arroyos, lagunas, lagunitas y pantanos de tierras bajas y ladera este inferior de los Andes. Construyen su nido en la orilla de un río, barranco de erosión, normalmente cerca del agua, la pareja excava, el túnel, recto o curvado, de 1-2-1-6 m de largo, 8-10 cm de diámetro, terminando en una cámara-nido de 25 cm de ancho, 45 cm de largo y 16 cm de alto. Colocan de 3-4 huevos.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No está globalmente amenazada. Extendida y bastante común en algunas localidades, el gran tamaño de su población y su tendencia es estable.

Mapa: Asociación Civil Armonía

• Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., Maccormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/kingfishers-martin-pescadores/chloroceryle-amazona>.

• IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

• Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

• UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

• Woodall, P. F. and G. M. Kirwan (2020). Amazon Kingfisher (*Chloroceryle amazona*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.amakin1.01>.


Martín Pescador chico (*Chloroceryle aenea*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Martín Pescador chico y American Pygmy Kingfisher

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Coraciiformes

**Distribución continental:**

EE. UU. a través de América Central hasta el centro de Argentina (no en Chile)

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.**Distribución en Loma Santa:**

En los arroyos afluentes de ríos principales en el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado y Sabanas inundadas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Habita ríos o arroyos con flujos lentos y orilla de lagunas arboladas. En Bolivia, raro a poco común a lo largo de arroyos en bosque húmedo con dosel cerrado, en bosque pantanoso e inundado de várzea y en márgenes boscosos de lagunas. El nido es un túnel, excavado de 40 cm de profundidad en los barrancos de los ríos o arroyos. La hembra pone de 3 a 4 huevos blancos.

Amenazas generales en toda su área de distribución: No está globalmente amenazada. Ampliamente distribuida; poco común y local en algunas localidades de su área de distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía


- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/kingfishers-martin-pescadores/chloroceryle-aenea>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEP-WCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.
- Woodall, P. F. (2020). American Pygmy Kingfisher (*Chloroceryle aenea*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.ampkin1.01>.

Martín Pescador verde (*Chloroceryle americana*)

Nombre T'simane: jityi tyi

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Martín Pescador verde y Green Kingfisher



- **Clase:** Aves
- **Orden:** Coraciiformes



Distribución continental:

EEUU, México y Centroamérica y otras pequeñas islas frente a Panamá, toda Sudamérica, Colombia, Venezuela, Chile y Argentina

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando, Santa Cruz y Tarija.

Distribución en Loma Santa:

En los arroyos afluentes de ríos principales en el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chiquitania, Yungas y Sabanas inundadas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN:** NT: Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

- ① **Hábitat y Biología:** Generalmente a lo largo de márgenes arbolados o boscosos de arroyos, ríos, lagunas y pantanos de tierras bajas y piedemonte andino. Para sus nidos excava una madriguera, situada a lo largo de un río o arroyo, donde colocan 3 a 6 huevos blancos.
- ② **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No está globalmente amenazada. Ampliamente distribuida; común y local en algunas áreas de sus localidades de su área de distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., Maccormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/kingfishers-martin-pescadores/chloroceryle-americana>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

- Moskovoff, W. (2020). Green Kingfisher (*Chloroceryle americana*), version 1.0. In *Birds of the World* (A. F. Poole and F. B. Gill, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.grnkin.01>.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Burguillo (*Galbula ruficauda*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: Sitgire

Otros nombres: Burguillo y Rufous-tailed Jacamar



El pico negruzco es relativamente largo y puntiagudo, sostenido con una inclinación hacia arriba

El burguillo mide 24 cm

Es un ave de plumaje llamativo, una ancha banda en el pecho y dos o cuatro rectrices centrales son de un verde metálico, la garganta blanca, y el resto de las plumas del cuerpo son de color rufo, incluida la cola

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Galbuliformes



Distribución continental:

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guayana Francesa, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Pto. Calixto, Pto. Gerardo, Pto. Vichí ricansi, Rosario y Chirisi.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chiquitania, Yungas y Sabanas inundadas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

① **Hábitat y Biología:** En bordes de bosques húmedos de tierras bajas, en las aberturas (como a lo largo de los arroyos y en las caídas de los árboles) dentro del bosque, en el sotobosque abierto de los bosques y en los altos bosques secundarios, y bosques secos tropicales. Construye su nido en termiteros o barrancos donde la hembra coloca 2 a 4 huevos blancos con manchas rojas.

② **Amenazas generales en toda su área de distribución:** El estado de conservación del Burguillo está clasificado como de Menor Riesgo por la IUCN, tiene una distribución geográfica muy amplia y, su abundancia relativa suele evaluarse como de común a bastante común o común en algunas áreas de su distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Chaine, N. M. (2020). Rufous-tailed Jacamar (*Galbula ruficauda*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.rutjac1.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/jacamars/galbula-ruficauda>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.


Bati bati (*Monasa nigrifrons*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: Chiwatuaru

Otros nombres: Bati bati y Black-fronted Nunbird

Pico rojo; iris oscuro, una
pequeña zona de piel desnuda
oscura detrás del ojo



Patas negras

Con plumaje todo
negro hollín, más
negro alrededor del
pico, con la parte
posterior del cuerpo
gris azulado, cola
negro azulado,
cuberteras inferiores
del ala negro hollín

El bati bati mide
(24-26 cm)

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Galbuliformes

**Distribución continental:**

Bolivia, Brasil, Colombia,
Ecuador y Perú.

Distribución Nacional: Beni,
Cochabamba, La Paz, Pando
y Santa Cruz.

**Distribución en Loma
Santa:** En toda el área de
conservación.

Ecorregiones: Amazonia,
Cerrado, Chiquitania, Yungas
y Sabanas inundadas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Forrajea en pequeños grupos, en sotobosques abiertos de várzea, igapó y galería, bosques secos caducifolios y a través de la sabana, islas fluviales pantanosas, bosques de transición y bosques inundables de sucesión media. Excava para el nido en agujero en orilla, terreno suavemente inclinado de 1 m de profundidad, coloca 3 huevos.

👤 **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No está globalmente amenazada (Menor Riesgo). Común a abundante, en un lugar de estudio hasta 28 aves/km², tamaño del territorio 8 ha. Bastante común a frecuente en Bolivia.

Mapa: Asociación Civil Armonía


- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/puffbirds-nunbirds-nunlets-bucos/monasa-nigrifrons>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- Rasmussen, P. C., N. Collar, and G. M. Kirwan (2020). Black-fronted Nunbird (*Monasa nigrifrons*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.blfnun1.01>.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Bati bati frente blanca (*Monasa morphoeus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Bati bati frente blanca y White-fronted Nunbird.



Bolivia

Distribución continental:

Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Piñal, Pto. Gerardo, Jorori y Pto. Vichi'ricansi.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania, y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

① **Hábitat y Biología:** Forrajea en pequeños grupos, en los niveles medios a dosel de bosque amazónico de tierra firme y monte bajo, huecos de árboles caídos, zonas adyacentes semiabiertas sombreadas, bosque de galería, bosque de transición, bosque de llanura aluvial maduro, también claros, bordes en zonas parcialmente deforestadas. Excava para el nido en agujero en orilla, terreno suavemente inclinado de 1 m de profundidad, coloca 2 a 3 huevos.

② **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No está globalmente amenazada (Menor Riesgo). Considerada de común a abundante en diferentes países de su distribución, donde la densidad de población registrada fue de 1 pareja o grupo/km².

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., Maccormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/puffbirds-nunbirds-nunlets-bucos/monasa-morphoeus>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio

de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

- Rasmussen, P. C. and N. Collar (2020). White-fronted Nunbird (*Monasa morphoeus*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.whfnun1.01>.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.


Barbudo brillante (*Capito auratus*)

Nombre T'simane: Ototó

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Barbudo brillante y Gilded Barbet

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Piciformes



Bolivia

Distribución continental:

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba La Paz, Pando y Santa Cruz.**Distribución en Loma Santa:**

Piñal, Pto. Gerardo, Jorori y Pto. Vichi'ricansi.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania, y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada.
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Bosque inundable várzea, bosque amazónico de tierra firme, bosque de ribera en fases sucesiones más tardías, de segundo crecimiento, bosque húmedo montano bajo. En Bolivia, poco común a localmente común en los bosques húmedos de los Yungas inferiores y piedemonte, en bosque amazónico de tierra firme y várzea. Construye su nido en huecos en troncos de árboles secos, donde la hembra pone 3 a 4 huevos blancos.

Amenazas generales en toda su área de distribución: No está globalmente amenazada (Menor Riesgo). Considerada una especie relativamente común en diferentes países de su distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- del Hoyo, J., N. Collar, and G. M. Kirwan (2020). Gilded Barbet (*Capito auratus*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.gilbar1.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/barbets-barbudos/capito-auratus>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Tucán (*Ramphastos tucanus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: Sovejve

Otros nombres: Tucán y White-throated Toucan

El tucán mide (53 a 58 cm)

Tiene las coberteras superiores de la cola de color blanco amarillento

De color negro, con un pico muy largo, un babero blanco bordeado por una banda roja en la parte posterior y coberteras rojas



El pico de color rojo oscuro a anaranjado con rayas verdes amarillentas, las órbitas oscuras o violetas y los iris marrones

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Piciformes



Distribución continental:

Venezuela, las Guayanas, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania, y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN:** NT: Menor Riesgo
- **CITES:** II
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❶ **Hábitat y Biología:** Habita principalmente en bosques tropicales de tierras bajas, especialmente alrededor de antiguos cauces de ríos, y en las últimas etapas de sucesión y bosques maduros cerca del agua. También forrajea en los bosques ribereños. Anida en cavidades naturales (huecos) de árboles donde colocan de 2 a 3 huevos de color blancos.

❷ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** Se considera no amenazado a nivel mundial (Menor Riesgo) (CITES II). Es relativamente común en gran parte de su área de distribución, es una especie con gran importancia en la dispersión de semillas de árboles.

Mapa: Asociación Civil Armonía

• del Hoyo, J., L. L. Short, N. Collar, C. J. Sharpe, and G. M. Kirwan (2025). White-throated Toucan (*Ramphastos tucanus*), version 1.1. In Birds of the World (N. C. García, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.whttou1.011>.

• Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/toucans/ramphastos-tucanus>.

• IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

• Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

• UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Tucán Pico Acanalado (*Ramphastos vitellinus*)

Nombre T'simane: Gue raj

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Tucán pico acanalado y Channel-billed Toucan

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Piciformes



Distribución continental:

Venezuela, Trinidad y Tobago, Colombia, Ecuador, las Guayanas, Bolivia y Brasil.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania, y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** II
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Bosques altos y húmedos de tierras bajas y pie de monte, especialmente en los que están cerca del agua. También se encuentra cerca del borde del bosque, bosques pantanosos, claros, bosques ribereños, parches en sabanas y bosques cerrados y ribereños. Anida en las cavidades naturales de árboles o palmeras con entradas pequeñas, donde coloca de 2 a 4 huevos blancos.

Amenazas generales en toda su área de distribución: Se considera no amenazado a nivel mundial (Menor Riesgo) (CITES II). Es relativamente común en gran parte de su área de distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía


- del Hoyo, J., L. L. Short, N. Collar, E. de Juana, G. M. Kirwan, and C. J. Sharpe (2024). Channel-billed Toucan (*Ramphastos vitellinus*), version 2.0. In *Birds of the World* (N. C. García and N. D. Sly, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.chbtou1.02>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/toucans/ramphastos-vitellinus>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Tucancillo (*Pteroglossus castanotis*)

Nombre T'simane: Piñij

Nombre Mojeño-trinitario: Ktso'i

Otros nombres: Tucancillo y Chestnut-eared Acari



Bolivia



Distribución continental:

Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Argentina y Paraguay.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Valle, Sabanas Inundadas, Chiquitania, y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** III
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Tiene una gran variedad de hábitat, desde bosques húmedos alrededor de lagos y ríos, bosques inundados de várzea, islas forestales en ríos, bosques pantanosos, bosques de galería, bordes, claros y áreas perturbadas, bosque en cerrado y Pantanal. Hace nido en cavidades de árboles, donde colocan de 2 a 4 huevos.

🌍 **Amenazas generales en toda su área de distribución:** Se considera no amenazado a nivel mundial (Menor Riesgo) (CITES III). Es considerada de común a relativamente común en gran parte de su área de distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/toucans/pteroglossus-castanotis>.
- 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio

de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.
- Short, L. L. (2020). Chestnut-eared Aracari (*Pteroglossus castanotis*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.cheareal.01>.


Tucancillo crespo (*Pteroglossus beauharnaisii*)

Nombre T'simane: Vushú

Nombre Mojeño-trinitario: Ktso'i

Otros nombres: Tucancillo crespo y Curl-crested Acari

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Piciformes



Bolivia

Distribución continental: Perú, Brasil y Bolivia.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba y La Paz.

Distribución en Loma Santa: Toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada.
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

126

Hábitat y Biología: En tierras bajas húmedas, bosques bien drenados como pantanosos, bordes de bosques y claros, también bosques de colinas bajas. En Bolivia, raro a poco común en y a los bordes de bosque amazónico de tierra firme y várzea, del piedemonte y Yungas inferiores húmedos. No se conoce mucho sobre su biología reproductiva.

Amenazas generales en toda su área de distribución: No está globalmente amenazada (Menor Riesgo). Relativamente extendida, pero no bien conocida.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/toucans/pteroglossus-beauharnaisii>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEP-WCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.
- Short, L. L. and A. Bonan (2021). Curl-crested Aracari (*Pteroglossus beauharnaisii*), version 1.1. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.cucara1.01.1>.

Carpintero Penacho Amarillo (*Melanerpes cruentatus*)

Nombre T'simane: Emeregue

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: : Yellow-tufted Woodpecker

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Piciforme



Distribución continental:

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana francesa, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Chaco, Chaco Serrano, Chiquitania, Cerrado, Sabanas Inundables, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

① **Hábitat y Biología:** Bastante común a común en bordes y claros de una amplia variedad de bosques semi a hiperhúmedos de tierras bajas y ladera este inferior de los Andes en Bolivia norte y central; también en pueblos, suburbios y parque urbanos. Normalmente se los ve en grupos familiares; posa preferiblemente sobre ramas muertas y postes. Vocaliza todo el año.

② **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Sin embargo, cuenta con algunas presiones debido a las actividades humanas, como ser: la eliminación de todos los árboles disponibles por la tala y la ganadería; en menor medida, se venden como mascotas en el norte de Perú.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolombia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/melanerpes-cruentatus/>.


- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Jones, K. (2020). Yellow-tufted Woodpecker (*Melanerpes cruentatus*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.yetwoo2.01>.

Carpintero Chico (*Dryobates passerinus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Little Woodpecker



El macho presenta una boina roja manchada de gris en la parte delantera, que en la hembra es marrón grisáceo con puntos blancos. En otras razas frente y coronas grisáceas o con ceja y línea en la cara de color blanco



Partes superiores de color pardo oliváceo, cara pardo oscuro, garganta y resto de partes inferiores barradas de blanquecino y gris-negruzco; barrado en el dorso y suave moteado en la parte superior de las alas

Mide entre 15 y 17 cm de longitud

Cola oscura

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Piciforme



Distribución continental: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana francesa, Guyana, Perú, Surinam, Argentina, Paraguay y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En casi toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Boliviano-Tucumano, Chaco, Chaco Serrano, Chiquitania, Cerrado, Sabanas Inundables, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Poco común a bastante común en los bordes de una variedad de bosques primarios y secundarios semihúmedos a húmedos, en arbustales abiertos, claros, parques y jardines de tierras bajas y ladera este inferior de los Andes. Solitario, en parejas o grupos familiares en el estrato medio y dosel, a menudo en bandadas mixtas.

Amenazas generales en toda su área de distribución: A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). No se tiene constancia de que las poblaciones se vean afectadas por las actividades humanas, se necesitan más estudios en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía


- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/dryobates-passerinus/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Winkler, H. and D. A. Christie (2020). Little Woodpecker (*Dryobates passerinus*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.litwoo2.01>.

Carpintero Cuello Rojo (*Campephilus rubricollis*)

Nombre T'simane: Conieya

Nombre Mojeño-trinitario: Kiowure

Otros nombres: Red-necked Woodpecker



- **Clase:** Aves
- **Orden:** Piciforme



- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Poco común a bastante común en bosque semi a hiperhúmedo de la ladera este de los Andes norte y central, en bosque de tierra firme, transición y mucho menos frecuente en várzea de la Amazonía y Chiquitania norte. Prefiere el interior de bosque primario y secundario maduro. Solitario o en parejas; forrajea en todos los estratos. Tamborilea intermitentemente casi todo el año.

🌿 **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Sin embargo, cuenta con algunas presiones debido a las actividades humanas, como la deforestación a causa de actividades madereras.

Mapa: Asociación Civil Armonía

• Benish, W. S. (2020). Red-necked Woodpecker (*Campephilus rubricollis*), version 1.0. In *Birds of the World* (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.renwoo1.01>.

• Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.

• Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., Maccormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/campephilus-rubricollis/>.

• IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

Carpintero Cresta Roja (*Campephilus melanoleucos*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Crimson-crested Woodpecker



La hembra tiene la parte delantera de la cresta y la parte de atrás de la cabeza negras, la parte media de la cresta es roja, además, presenta una larga línea blanca o amarillenta entre los ojos y la base del pico

Ambos sexos tienen una franja blanca a cada lado del cuello

Mide entre 33 y 38 cm de longitud y pesa en promedio 250 g



El macho presenta la cabeza y cresta roja, con una mancha blanca o amarillenta en la base del pico y un punto blanco y negro a la altura del oído

El vientre es blanco pardusco o crema amarillento con rayas negras

La espalda es negra con una "V" blanca. La garganta, la parte anterior del cuello y el pecho son negro uniforme

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Piciforme



Distribución continental:

Panamá, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana francesa, Guyana, Trinidad y Tobago, Perú, Surinam, Argentina, Paraguay y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En casi toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Boliviano-Tucumano, Cerrado, Chaco, Chaco Serrano, Chiquitania, Sabanas Inundables, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Poco común a bastante común en una amplia variedad de bosques y arbustales altos primarios y secundarios secos a húmedos de la ladera este de los Andes y tierras bajas, incluyendo islas pequeñas de bosque en sabanas. Principalmente encontrado en bordes de bosque y ambientes abiertos; ausente en el interior de bosque húmedo continuo. Generalmente en parejas; forrajea en el estrato medio y dosel. Tamborilea intermitentemente casi todo el año.

Amenazas generales en toda su área de distribución: A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Sin embargo, la deforestación es una de las actividades humanas que genera más presión en esta especie.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/Campephilus-melanoleucos/>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Rosenblatt, C. (2020). Crimson-crested Woodpecker (*Campephilus melanoleucos*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.crcwo1.01>.

Carpintero Lineado (*Dryocopus lineatus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Lineated Woodpecker

Los machos adultos presentan un parche rojo en la cara y una cresta también roja. En las hembras la frente es de color negro y el parche está ausente

El pico generalmente es negro

Los adultos son prácticamente negros en sus partes superiores con un penacho de plumas rojo en cabeza y franjas blanquecinas que van de la base del pico por el cuello hasta los hombros



Ambos sexos presentan una garganta blanca con manchas negras

Miden de 31,5 a 36 cm de largo



Cuando están en vuelo muestran la parte inferior blanca de las alas.

Sus partes inferiores son blanquecinas densamente pintadas con listas negras



Bolivia

Distribución continental: México, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana francesa, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, Argentina, Paraguay y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En casi toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Boliviano-Tucumano, Cerrado, Chaco, Chaco Serrano, Chiquitania, Sabanas Inundables, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❶ **Hábitat y Biología:** Poco común a bastante común en y a los bordes de una amplia variedad de arbustales altos y bosques primarios y secundarios secos a hiperhúmedos de tierras bajas y ladera este de los Andes; en área con bosque húmedo continuo se restringe a los bordes y orillas de ríos. Solitario o en parejas; forrajea en ramas y troncos muertos o podridos desde el sotobosque superior hasta el dosel; también en arboles aislados cerca de bordes de bosque. Vocaliza y tamborilea todo el año.

❷ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). No se tiene constancia de que las poblaciones se vean afectadas por las actividades humanas, se necesitan más estudios en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/dryocopus-lineatus/>.


- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Malekan, I. S. (2020). Lineated Woodpecker (*Dryocopus lineatus*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.linwool.01>.

Carpintero Amarillento (*Celeus flavus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Cream-colored Woodpecker



- **Clase:** Aves
- **Orden:** Piciforme

**Distribución continental:**

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana francesa, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.

Distribución Nacional:

Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma

Santa: Pto. Calixto y Pto. Vich'iricansi.

Ecorregiones: Amazonia y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Poco común a bastante común en bosque amazónico de várzea, ribereño (incluyendo islas de río), de galería y en bordes de lagos. Solitario, en parejas o grupos familiares en el estrato medio y subdosel, ocasionalmente más alto o más abajo; se alimenta principalmente de hormigas y termitas arbóreas; generalmente no se une a bandadas mixtas.

Amenazas generales en toda su área de distribución: A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). No se tiene constancia de que las poblaciones se vean afectadas por las actividades humanas, se necesitan más estudios en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Solís, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/celeus-flavus/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Winkler, H., D. A. Christie, and A. Bonan (2020). Cream-colored Woodpecker (*Celeus flavus*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.crcwoo2.01>.

Carpintero Garganta Blanca (*Piculus leucolaemus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -


Otros nombres: White-throated Woodpecker



Los machos tienen rojo brillante en la cabeza y mejillas, mientras que las hembras tienen la zona roja limitada a la parte posterior de la corona. Ambos sexos tienen una garganta y mentón blancos

Partes superiores y gran parte del cuerpo de color verde bronce y un patrón distintivo de la cabeza entre machos y hembras

Mide entre 16 y 17 cm de longitud



Pico bastante corto y puntiagudo

El pecho presenta formaciones tipo escamas blanca amarillentas con barras oliváceas



Distribución continental:

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Raro a localmente bastante común en bosque amazónico de tierra firme, várzea, transicional y bosque semihúmedo a húmedo del piedemonte y Yungas inferiores. Solitario o en parejas en el dosel, a menudo en bandadas mixtas.

🌍 **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). No se tiene constancia de que las poblaciones se vean afectadas por las actividades humanas, se necesitan más estudios en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/piculus-leucolaemus/>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Winkler, H. and D. A. Christie (2020). White-throated Woodpecker (*Piculus leucolaemus*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.whtwoo2.01>.

Carpintero Verde Dorado (*Piculus chrysochloros*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -


Otros nombres: Golden-green Woodpecker



Los dos géneros presentan una faja amarilla que va desde la base del pico hasta la nuca, pero solo en los machos se observa un parche rojo en la cara

Los machos presentan en la cabeza plumaje rojo, mientras que las hembras, tienen la cabeza verde oliva o amarilla

Mide entre 18 y 20 cm de longitud



El iris puede ser blanco o azulado

El pico es gris oscuro

El dorso es de color verde oliva y el vientre es amarillo con rayas color oliváceo o marrón.

Las patas son de color oliva.

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Piciforme

**Distribución continental:**

Panamá, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana francesa, Guyana, Perú, Surinam, Argentina, Paraguay y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En casi toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Boliviano-Tucumano, Chaco, Chiquitania, Cerrado, Sabanas Inundables y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Raro a poco común en y a los bordes de una amplia variedad de bosques y arbustales secos a húmedos de tierras bajas y piedemonte andino. Solitario o en parejas en el estrato medio y dosel, ocasionalmente en bandadas mixtas.

Amenazas generales en toda su área de distribución: A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). No se tiene constancia de que las poblaciones se vean afectadas por las actividades humanas, se necesitan más estudios en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/piculus-chrysochloros/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Winkler, H., D. A. Christie, and G. M. Kirwan (2020). Golden-green Woodpecker (*Piculus chrysochloros*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.gogwool.01>.

Halcón Reidor (*Herpetotheres cachinnans*)

Nombre T'simane: Agavá

Nombre Mojeño-trinitario: Moko'o

Otros nombres: Macono, Laughing Falcon



Posee un dorsal color marrón oscuro, una máscara negra y ancha que le cubre las mejillas y le rodea la cabeza hasta detrás de la nuca

Sus ojos son oscuros, parte debajo de la base del pico



Sus principales características son la cabeza y cuello blanco o blancuzco

Las patas son amarillas

La cola es larga y redondeada, de color negro y blancuzco

Su cuerpo es grueso y su cabeza grande, tiene alas cortas y redondeadas

Mide de 42 a 50 cm de longitud y pesa 600 g



Bolivia

Distribución continental:

México, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana francesa, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, Argentina, Paraguay y Venezuela.

Distribución Nacional:

Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En casi toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Chaco, Chaco Serrano, Chiquitania, Cerrado y Sabanas Inundables.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** Apéndice II
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❶ **Hábitat y Biología:** Raro a bastante común en bordes de bosque seco a húmedo de tierras bajas y piedemonte de los Andes sur; ausente en grandes extensiones de bosque no intervenido. A menudo posa quieto por largos períodos en ramas horizontales de árboles altos; depredador especializado en serpientes.

❷ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). No se tiene constancia de que las poblaciones se vean realmente afectadas por las actividades humanas, se necesitan más estudios en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Barkley, B. (2020). Laughing Falcon (*Herpetotheres cachinnans*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.laufal1.01>.
- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolombia.com/>.

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/herpetotheres-cachinnans/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

Halcón Montés Barrado (*Micrastur ruficollis*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Barred Forest-Falcon

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Falconiforme

Los adultos suelen ser de color gris oscuro en la parte superior; la cola tiene la punta blanca y presenta de tres a seis barras blancas estrechas. La garganta es de color gris pálido, que se vuelve más oscuro de la corona

ad. forma
gris



Los ojos son de color crema a marrón anaranjado claro

El pico es negro y se torna amarillo en la base de la mandíbula inferior; las partes desnudas de la cara son amarillos

La parte superior del pecho es de un gris más oscuro. También se presenta una variación de color marrón, donde la mayor parte de las partes superiores, la cabeza y el pecho son marrones en lugar de grises

ad.
forma
marrón

Mide de 32 a 36 cm de longitud

ad.
forma
gris



ad.
forma
marrón

El resto de las partes inferiores, son blancas, fina y claramente barradas de negro o gris oscuro.

Las patas son de color amarillo anaranjado



inm.



Bolivia

Distribución continental: México, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana francesa, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Surinam, Argentina, Paraguay y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Jorori, Pto. Vichi'ricans y Rosario.

Ecorregiones: Amazonia, Boliviano-Tucumano, Chaco, Chaco Serrano, Chiquitania, Cerrado, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** Apéndice II
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Poco común a bastante común en una variedad de bosques semi a hiperhúmedos de tierras bajas y ladera este inferior de los Andes; prefiere el interior de bosque alto. Mayormente detectado por voz. Caza en el sotobosque cerca o en el suelo; puede rastrear la hojarasca con las patas en busca de presas. Vuela bajo y rápido con aleteos rápidos y planeos cortos. Canta frecuentemente todo el año desde ramas ocultas en el estrato medio y dosel.

Amenazas generales en toda su área de distribución: A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). No se tiene constancia de que las poblaciones se vean realmente afectadas por las actividades humanas, se necesitan más estudios en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Bierregaard, R. O. and G. M. Kirwan (2020). Barred Forest-Falcon (*Micrastur ruficollis*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.baffal1.01>.
- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/micrastur-ruficollis/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

Halcón Montés Ojo Blanco (*Micrastur gilvicollis*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Lined Forest-Falcon



Distribución continental:

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana francesa, Guyana, Perú, Surinam, y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz y Pando.

Distribución en Loma Santa: Pto. Calixto y Pto. Gerardo.

Ecorregiones: Amazonia y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** Apéndice II
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

137

① **Hábitat y Biología:** Raro a poco común en bosque amazónico de tierra firme y bosque húmedo a hiperhúmedo del piedemonte y Yungas inferiores a lo largo de la base de los Andes norte y en Pando; prefiere el interior de bosque alto. Mayormente detectado por voz. Generalmente caza en el sotobosque cerca o en el suelo. Canta todo el año desde ramas ocultas en el estrato medio y dosel.

② **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). No se tiene constancia de que las poblaciones se vean realmente afectadas por las actividades humanas, se necesitan más estudios en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Bierregaard, R. O., P. F. D. Boesman, and J. S. Marks (2020). Lined Forest-Falcon (*Micrastur gilvicollis*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.liffal1.01>.
- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr., J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/micrastur-gilvicollis/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

Halcón Montés Acollarado (*Micrastur semitorquatus*)

Nombre T'simane: Jódýis

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Collared Forest-Falcon

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Falconiforme



Distribución continental: México, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana francesa, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Surinam, Argentina, Paraguay y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Piñal, Pto. Calixto, Rosario y Chirisi.

Ecorregiones: Amazonia, Boliviano-Tucumano, Chaco, Chaco Serrano, Chiquitania, Cerrado, Valles Secos Interandinos, Sabanas Inundables y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** Apéndice II
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Raro a poco común y local en y a los bordes de bosque primario y secundario seco a hiperhúmedo de tierras bajas y ladera este inferior de los Andes. Mayormente detectado por voz. Canta todo el año principalmente cuando está terminando el día, menos frecuente durante el día.

Amenazas generales en toda su área de distribución: A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). No se tiene constancia de que las poblaciones se vean realmente afectadas por las actividades humanas, se necesitan más estudios en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Bierregaard, R. O., G. M. Kirwan, and P. F. D. Boesman (2020). Collared Forest-Falcon (*Micrastur semitorquatus*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.coffall1.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., Maccormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/micrastur-semitorquatus/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.

Caracara Garganta Roja (*Ibycter americanus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: 'Poparawa


Otros nombres: Red-throated Caracara



Plumaje principalmente negro, con el vientre, las plumas que rodean los muslos y las plumas del vientre blancas

Pico base gris con el resto amarillento

Mide entre 46 y 54 cm de longitud



Las patas son rojizas

Tanto la cara como la garganta están desnudas con algunas plumas negras dispersas en la garganta; la piel expuesta es roja

Tanto los machos como las hembras son similares en apariencia

ad.



Bolivia

Distribución continental:

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Guayana Francesa, Surinam, Guyana, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil.

Distribución Nacional: Beni, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Piñal, Pto. Calixto, Rosario y Chirisi.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** Apéndice II
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❶ **Hábitat y Biología:** Raro a localmente bastante común en y a los bordes de bosque amazónico de tierra firme y várzea, bosque chiquitano norte y del piedemonte húmedo. En parejas o pequeños grupos familiares de crianza cooperativa, principalmente en el dosel. Muy vocal y ruidoso. Depredador especializado en nidos de avispas y abejas, pero también se alimenta de otros artrópodos y frutos.

❷ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Sin embargo, cuenta con algunas presiones debido a las actividades humanas, como la Fragmentación de hábitat ocasionado por la tala de bosques maduros y la conversión del hábitat para la agricultura y la ganadería.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Davis, C. and S. McCann (2020). Red-throated Caracara (*Ibycter americanus*), version 1.0. In *Birds of the World* (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.retcar2.01>.

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/ibyc-ter-americanus/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.


Caracara Negro (*Daptrius ater*)

Nombre T'simane: Sheya

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Black Caracara

Los jóvenes se pueden identificar por su plumaje negro opaco, la cara de color amarillo pálido y las 3 o 4 barras negras y blancas que se encuentran en la cola



Tienen alas y cola distintivamente largas y estrechas, así como un pico negro

Mide entre 38 y 40 cm de longitud



Es de color negro brillante, excepto por la distintiva banda blanca en la base de la cola, y las patas y la cara de color amarillo a rojo anaranjado

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Falconiforme

**Distribución continental:**

Colombia, Venezuela, Guayana Francesa, Surinam, Guyana, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En casi toda el área.

Ecorregiones: Amazonia y Chiquitania.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** Apéndice II
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Raro a localmente bastante común en bordes de bosque húmedo de la Amazonía y Chiquitania norte, principalmente a lo largo de ríos. Solitario, en parejas o grupos pequeños; arbóreo y terrestre. Mayormente observado cuando vuela a lo largo de ríos, parado en orillas de ríos o por vocalización.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). No se tiene constancia de que las poblaciones se vean realmente afectadas por las actividades humanas, se necesitan más estudios en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Bierregaard, R. O., G. M. Kirwan, and P. F. D. Boesman (2020). Black Caracara (*Daptrius ater*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.blacar1.01>.
- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/daptrius-ater/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

Caracara Chimachima (*Milvago chimachima*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Yellow-headed Caracara


Cola barrada intercalando
amarillo castaño claro y
marrón



En vuelo deja ver
una mancha de color
blanco en las alas,
con manchas oscuras
desde la parte inferior,
con bordes también
oscuros

Partes desnudas de
la cara color amarillo,
pico gris claro

La longitud total es
de aproximadamente
37 a 46 cm de
longitud



Espalda color marrón
negruzco, presenta
una línea detrás del
ojo marrón negruzca.

Posee un plumaje
color amarillo castaño
claro y las alas
castaño oscuro

Patas gris claro



Bolivia

Distribución continental:

Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Guayana Francesa, Surinam, Guyana, Trinidad y Tobago, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil.

Distribución Nacional:

Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

Jorori y Chirisi.

Ecorregiones: Amazonia, Chaco, Cerrado, Chiquitania, Chaco Serrano, Sabanas Inundables y Valles Secos Interandinos.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** Apéndice II
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❶ **Hábitat y Biología:** Poco común a común en sabana estacional inundada, cerrado, arbustales, campos agrícolas y en hábitats abiertos similares de tierras bajas y piedemonte de los Andes sur. Generalmente solitario o en pequeños grupos; terrestre y arbóreo, también posa en postes de cercas. Caza activamente y suele alimentarse de carroña.

Ⓜ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). No se tiene constancia de que las poblaciones se vean realmente afectadas por las actividades humanas, se necesitan más estudios en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

• Bierregaard, R. O., G. M. Kirwan, P. F. D. Boesman, and J. S. Marks (2022). Yellow-headed Caracara (*Milvago chimachima*), version 1.1. In *Birds of the World* (N. D. S. Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.yehcar1.01.1>.

• Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.

• Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr., J. V., Mailland O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/milvago-chimachima/>.


• IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

Perico Ala Amarilla (*Brotogeris chiriri*)

Nombre T'simane: Utyú

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Cinco Libra, Yellow-chevroned Parakeet



- **Clase:** Aves
- **Orden:** Psittaciforme

**Distribución continental:**

Bolivia, Brasil, Argentina y Paraguay.

Distribución Nacional:

Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando, Potosí, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

Jorori y Chirisi.

Ecorregiones: Amazonia, Boliviano-Tucumano, Chaco, Chaco Serrano, Chiquitania, Cerrado, Sabanas Inundables, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** Apéndice II
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Poco común a común en una amplia variedad de bosques y arbustales secos a húmedos de la ladera este de los Andes y tierras bajas; en los Andes principalmente en regiones secas; en tierras bajas húmedas se encuentra en bosque de galería, isla de bosque en sabana, bosque ribereño y secundario, también en áreas cultivadas, pueblos y suburbios. Principalmente en parejas o bandadas pequeñas, en invierno se los suele ver en bandadas más grandes. Ruidoso y fácil de distinguir.

Amenazas generales en toda su área de distribución: A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Sin embargo, cuenta con algunas presiones debido a las actividades humanas, entre ellas la cacería, para luego ser vendidos en los mercados, la alteración del hábitat también es una presión identificada para esta especie.

Mapa: Asociación Civil Armonía


- Brightsmith, D., K. R. Burgio, B. J. Hiller, K. E. Block, P. Pyle, and M. A. Patten (2020). Yellow-chevroned Parakeet (*Brotogeris chiriri*), version 1.0. In *Birds of the World* (P. G. Rodewald, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.yecpar.01>.
- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/brotogeris-chiriri/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

Perico Ala Cobalto (*Brotogeris cyanoptera*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: Chora

Otros nombres: Cobalt-winged Parakeet



Distribución continental:

Bolivia, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En toda el Área.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania, Sabanas Inundables y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** Apéndice II
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

143

① **Hábitat y Biología:** Poco común a bastante común en bosque amazónico de tierra firme, várzea, transicional, bosque de galería y semihúmedo chiquitano norte; también en islas de bosque grandes de los Llanos de Moxos sur. En parejas o bandadas de hasta 40 aves en el dosel y subdosel.

② **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). No se tiene constancia de que las poblaciones se vean realmente afectadas por las actividades humanas, no se descarta la cacería para ser comercializado y/o para mascota, sin embargo, se necesitan más estudios en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

• Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.

• Collar, N. and P. F. D. Boesman (2020). Cobalt-winged Parakeet (*Brotogeris cyanoptera*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.cowpar1.01>.

• Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr, J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/brotogeris-cyanoptera/>.


• IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

Loro Cabeza Azul (*Pionus menstruus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: Chichri

Otros nombres: Loro Chuto, Blue-headed Parrot



En los adultos la cabeza y el cuello son principalmente de color azul brillante, mezclado con rojo rosáceo en la garganta, y la mancha que presenta a la altura del oído es negra

El resto de su cuerpo es verde oscuro, la cola azul por la parte de arriba, y por debajo las plumas que cubren el bajo vientre son rojo rosáceo

Mide entre 22,5 y 24, 5 cm de longitud

El iris es café oscuro

El pico, y las partes desnudas de la cara son de color negruzco, con una mancha rojiza rosácea a cada lado del pico

El pecho es verdoso oscuro con un escamado azul y el abdomen verde

Las patas son pardas a gris



- **Clase:** Aves
- **Orden:** Psittaciforme

**Distribución continental:**

Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Guayana Francesa, Surinam, Guyana, Trinidad y Tobago, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En casi toda el Área.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chiquitania, Sabanas Inundables, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** Apéndice II
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Bastante común a común en una variedad de bosques primarios y secundarios secos a hiperhúmedos de tierras bajas en el norte y este y la ladera este de la parte norte de los Andes. Raro a poco común en bosque de galería e islas de bosque grandes en cerrado/sabana. En parejas o bandadas pequeñas. Forrajea discretamente en el dosel en busca de frutas y semillas de una variedad amplia de árboles. Vuelo continuo con aleteos profundos típico para el género.

Amenazas generales en toda su área de distribución: A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). No se tiene constancia de que las poblaciones se vean realmente afectadas por las actividades humanas, no se descarta la cacería para ser comercializado y/o para mascota, sin embargo, se necesitan más estudios en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía


- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Collar, N., J. del Hoyo, A. Bonan, G. M. Kirwan, P. F. D. Boesman, and C. J. Sharpe (2022). Blue-headed Parrot (*Pionus menstruus*), version 1.1. In Birds of the World (B. K. Keeney, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.blhpar1.011>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/pionus-menstruus/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

Loro Hablador (*Amazona farinosa*)

Nombre T'simane: Utyü

Nombre Mojeño-trinitario: Woru

Otros nombres: Loro Hablador, Mealy Parrot, Southern Mealy Amazon



Bolivia

Distribución continental:

Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Guayana Francesa, Surinam, Guyana, Trinidad y Tobago, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En toda el Área.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chiquitania, Sabanas Inundables, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** Apéndice II
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Bastante común en bosque semi a hiperhúmedo de la Amazonia, piedemonte, Yungas inferior y Chiquitania norte. En parejas o bandadas pequeñas; ruidoso y conspicuo. Forrajea en el dosel. Vuela con aleteos rápidos y poco profundos típicos para el género. Se alimenta de semillas y frutas de una variedad amplia de especies de árboles. Anida en huecos de árboles.

⚠️ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Sin embargo, cuenta con algunas presiones debido a las actividades humanas, como ser: caza y captura como alimento, animal de compañía y para el comercio internacional.

Mapa: Asociación Civil Armonía

• Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.

• Collar, N., J. del Hoyo, A. Bonan, G. M. Kirwan, and P. F. D. Boesman (2022). Mealy Amazon (*Amazona farinosa*), version 1.1. In *Birds of the World* (B. K. Keeney, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.meapar.011>.

• Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr., J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/amazona-farinosa/>.

• IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

Loro Viente Blanco (*Pionites xanthomerius*)


Nombre T'simane: Briñh

Nombre Mojeño-trinitario: Tijujo

Otros nombres: Pacula & Black-legged Parrot

La parte de las alas es verde, las puntas presentan coloración azulada. Los pichones tienen plumas marrones o negras en la cabeza y la cara, amarillas en el vientre y patas grises. Por lo general, las plumas sin color caen y son reemplazadas por otras naranjas o blancas, a medida que el ave va madurando

Mide entre
20 y 22 cm
de longitud



Plumaje de la corona naranja amarillento que llega hasta la parte trasera del cuello juntándose con la espalda que presenta color verde; garganta amarilla al igual que los muslos y la parte baja de la cola y bajo vientre

Su vientre es blanco, sus alas y espalda verdes y su pico rosáceo claro.

Patas rosáceas o negras

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Psittaciforme



Distribución continental: Perú, Bolivia y Brasil.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En toda el Área.

Ecorregiones: Amazonia y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** Apéndice II
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Bastante común a localmente común en bosque amazónico de tierra firme, várzea y transicional; raro a poco común en bosque húmedo del piedemonte y Yungas inferior; tal vez prefiere bordes de bosque, especialmente a lo largo de ríos. En parejas o bandadas pequeñas en el dosel superior, a menudo en la copa de los árboles más altos. Fácilmente pasado por alto cuando no vocaliza. Anida en huecos de árboles.

Amenazas generales en toda su área de distribución: A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Sin embargo, cuenta con algunas presiones debido a las actividades humanas, como ser: Pérdida de hábitat y mascotismo.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Collar, N., J. del Hoyo, G. M. Kirwan, and P. F. D. Boesman (2020). White-bellied Parrot (*Pionites leucogaster*), version 1.0. In *Birds of the World* (S. M. Billerman, B. K. Keeney, P. G. Rodewald, and T. S. Schulenberg, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.whbparl01>.


- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., Maccormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/pionites-leucogaster/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

Cotorra Cabeza Oscura (*Aratinga weddellii*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Cara Sucia, Dusky-headed Parakeet



Distribución continental:

Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En toda el Área.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Sabanas Inundables, Chaco y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** Apéndice II
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Bastante común a común en bosque de galería, ribereño, secundario y amazónico de várzea de tierras bajas de las zonas norte y centrales, piedemonte andino y localmente en el este de Santa Cruz; también en bordes de bosque húmedo a semihúmedo. A menudo sobrevuela sabana y cerrado. Especie ruidosa que se puede observar en parejas o en bandadas de típicamente 4-8 aves, ocasionalmente en bandadas más grandes de hasta 20-30 en invierno.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). No se tiene constancia de que las poblaciones se vean realmente afectadas por las actividades humanas, se necesitan más estudios en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Collar, N. and P. F. D. Boesman (2020). Dusky-headed Parakeet (*Aratinga weddellii*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.duhpar.01>.

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr., J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/aratinga-weddellii/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.


Paraba Azul y Amarillo (*Ara ararauna*)

Nombre T'simane: Uyá

Nombre Mojeño-trinitario: Tiocko parawa

Otros nombres: Paraba, Guacamayo, Blue-and-yellow Macaw

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Psittaciforme



Distribución continental:

Panamá, Colombia, Venezuela, Guayana Francesa, Surinam, Guyana, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En toda el Área.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chiquitania, Sabanas Inundables y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** Apéndice II
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Bastante común a abundante en islas de palmeras y bosque de galería en sabana estacional inundada y cerrado; rara a poco común en bosque ribereño del piedemonte andino húmedo y Chiquitania, y en bosque amazónico de várzea, pantanoso y de palma real. En parejas o bandadas a menudo grandes. Se alimenta principalmente de frutos de palmera.

Amenazas generales en toda su área de distribución: A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Sin embargo, cuenta con algunas presiones debido a las actividades humanas, como ser: Pérdida de hábitat y extracción de pichones, además de la caza para comercio a lo largo de su distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Collar, N., P. F. D. Boesman, and C. J. Sharpe (2020). Blue-and-yellow Macaw (*Ara ararauna*), version 1.0. In *Birds of the World* (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.baymac.01>.


- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., Maccormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/ara-ararauna/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

Paraba Frente Castaña (*Ara severus*)

Nombre T'simane: Shu vaj

Nombre Mojeño-trinitario: Ajo

Otros nombres: Parabachi, Chestnut-fronted Macaw



Distribución continental:

Panamá, Colombia, Venezuela, Guayana Francesa, Surinam, Guyana, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil.

Distribución Nacional: Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En toda el Área.

Ecorregiones: Amazonia, Boliviano-Tucumano, Cerrado, Chaco, Chaco Serrano, Chiquitania, Sabanas Inundables y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** Apéndice II
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Poco común a bastante común en bordes de una variedad de bosques semihúmedos a húmedos de tierras bajas y ladera este inferior de los Andes norte y central; también en árboles aislados de claros, parches de bosque remanente en zonas agrícolas y parques urbanos. En parejas o bandadas pequeñas de hasta 10 aves, pero puede ser encontrada en mayor número en los dormideros. Se alimenta en el dosel.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). En la actualidad no se tiene constancia de que las poblaciones se vean realmente afectadas por las actividades humanas como antes, se necesitan estudios actuales en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

• Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.

• Collar, N., P. F. D. Boesman, and C. J. Sharpe (2020). Chestnut-fronted Macaw (*Ara severus*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.chfmac1.01>.

• Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr., J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/ara-severus/>.

• IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

Paraba Roja y Verde (*Ara chloropterus*)


Nombre T'simane: Uvá

Nombre Mojeño-trinitario: Titsi parawa

Otros nombres: Paraba roja, Red-and-green Macaw

Líneas rojas características alrededor de los ojos, formadas por hileras de pequeñas plumas sobre la mancha blanca de piel, por lo demás desnuda

Paraba de gran tamaño, mide entre 76 y 84 cm de longitud



La mayor parte del cuerpo es rojo brillante, las plumas que cubren las alas son mayoritariamente verdes en la parte superior y azul en la parte baja

Las plumas verdes azulado están rodeadas de rojo en la cola

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Psittaciforme



Distribución continental:

Panamá, Colombia, Venezuela, Guayana Francesa, Surinam, Guyana, Ecuador, Perú, Paraguay, Bolivia y Brasil.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En toda el Área.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chaco, Chiquitania, Sabanas Inundables y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** Apéndice II
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Poco común a bastante común en una variedad de bosques húmedos a semihúmedos de tierras bajas y piedemonte de los Andes norte. Solitaria, en parejas o bandadas pequeñas en el dosel.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Sin embargo, cuenta con algunas presiones identificadas a lo largo de su distribución como la pérdida de hábitat y captura de pichones para el comercio. Esta especie suele desaparecer pronto de las zonas perturbadas o colonizadas por el hombre.

Mapa: Asociación Civil Armonía


- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Collar, N., P. F. D. Boesman, and C. J. Sharpe (2020). Red-and-green Macaw (*Ara chloropterus*), version 1.0. In *Birds of the World* (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.ragmac1.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/ara-chloropterus/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

Cotorra Ojo Blanco (*Psittacara leucophthalmus*)

Nombre T'simane: Erej

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: White-eyed Parakeet



Distribución continental:

Colombia, Venezuela, Guayana Francesa, Surinam, Guyana, Ecuador, Perú, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Brasil.

Distribución Nacional:

Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando, Potosí y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

En casi toda el Área.

Ecorregiones: Amazonia, Boliviano-Tucumano, Cerrado, Chaco, Chiquitania, Chaco Serrano, Sabanas Inundables, Valles Secos Inundables y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** Apéndice II
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Bastante común a estacionalmente abundante en los bordes de una variedad de bosques y arbustales secos a hiperhúmedos de tierras bajas y ladera este inferior de los Andes; más abundante en zonas agrícolas, donde es considerada plaga de cultivos. Esta ave ruidosa generalmente es vista en bandadas de hasta varias decenas de aves. Realiza movimientos locales y probablemente regionales en relación a la abundancia de alimentos. Se alimenta de frutas y semillas de una variedad amplia de árboles; y anida en huecos de árboles.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). En la actualidad no se tiene constancia de que las poblaciones se vean realmente afectadas por las actividades humanas como antes, sin embargo, no se descarta la presión por la cacería para ser comercializado y/o para mascota. Se necesitan más estudios en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolombia.com/>.
- Collar, N., P. F. D. Boesman, and C. J. Sharpe (2020). White-eyed Parakeet (*Psittacara leucophthalmus*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.whepar2.01>.

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/psittacara-leucophthalmus/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

Batará Lineado (*Cymbilaimus lineatus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Batará liniada y Fasciated Antshrike

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes

Frente y corona negras con unas pocas barras blancas estrechas, plumaje entre barrado de negro y blanco

Pico grueso de color negro en la parte superior y gris azulado en la inferior

Las patas son de color gris azulado

La hembra tiene la corona rufo, el resto del plumaje barrado de marrón oscuro y marrón amarillento pálido, la cola barrada de beige pálido

Tamaño mediano
(27-30 cm)

Iris rojo, barras en la frente, más blanco en la cola



Distribución continental: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, la Guayana francesa, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Surinam y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Pto. Gerardo y Chirisi.

Ecorregiones: Amazonia, y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Bosque de tierra firme, várzea y transicional de la Amazonía, bosque húmedo del piedemonte y Yungas inferior. Sobre su reproducción construye su nido en forma de una taza de paredes delgadas de fibras oscuras tejidas sin apretar, unida por el borde en horquilla horizontal, entre el follaje, a 2-10 m sobre el suelo. Donde coloca 2 huevos, de color blanco cremoso, manchados de marrón oliváceo y/o lila pálido.

Amenazas generales en toda su área de distribución: No está globalmente amenazada. De común a poco común en toda su extensa área de distribución, que incluye numerosas zonas formalmente protegidas, así como vastas zonas de hábitat adecuadas no protegidas, pero aún intactas, sobre todo en la cuenca amazónica.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/antbirds-antshrikes-antwrens/cymbilaimus-lineatus>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio

de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.


- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.
- Zimmer, K. and M.L. Isler (2020). Fasciated Antshrike (*Cymbilaimus lineatus*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.fasant1.01>.

Batará Mayor (*Taraba major*)

Nombre T'simane: Churomogo

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Piara y Great Antshrike



Distribución continental:

México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Guayana francesa, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y Argentina.

Distribución Nacional:

Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando, Santa Cruz y Tarija.

Distribución en Loma Santa:

En casi toda el área de conservación.

Ecorregiones:

Amazonia, Cerrado, Chiquitania, Sabanas Inundadas, Valles y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Bosques de galería, bosques de sabana, bosques de segundo crecimiento y bordes y claros de bosques siempreverdes, bosques caducifolios de caatinga y bordes arbustivos de bosques de galería en la región del Pantanal. Construye el nido en arbustos, a media altura, tiene forma de tazón o semiesfera, colgante, atado en su borde superior a horquetas o ramitas. Donde colocan de 2 o 3 huevos, de color blanco o blanquecina con pintas y rayitas gris claro, oscuro y pardas.

Amenazas generales en toda su área de distribución: No está globalmente amenazada. Bastante común en la mayor parte de su extensa área de distribución. Se da en varias zonas protegidas. Su preferencia por una variedad de hábitats de frontera y secundarios la convierte en una especie poco sensible.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/antbirds-antshrikes-antwrens/taraba-major>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio

de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.


- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEP-WCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.
- Zimmer, K. and M.L. Isler (2020). Great Antshrike (*Taraba major*), version 1.0. In *Birds of the World* (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.greant1.01>.

Batará Barrado (*Thamnophilus doliatus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Batará barrado y Barred Antshrike



- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes



Distribución continental:

México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Guayana francesa, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y Argentina.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando, Santa Cruz y Tarija.

Distribución en Loma Santa: Pto. Calixto, Pto. Gerardo y Jorori.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chiquitania, Sabanas Inundadas, Valles y Chaco.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Variedad de otros hábitats como el borde del bosque, bosques cerrados no caducifolios, matorrales secos, jardines, bosques caducifolios y bosques de secundarios, tierras bajas y valles secos de los Andes. Su nido consiste en una taza profunda de paredes delgadas, construida de bejucos finos, zarcillos. Ponen 2 a 3 huevos de color blanco con manchones y salpicaduras café.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** Según el estado de la Lista Roja de la IUCN, (Menor Riesgo), debido a su amplísima área de distribución (aproximadamente 10.700.000 km²) y las grandes estimaciones poblacionales de 5.000.000 - 50.000.000.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/antbirds-antshrikes-antwrens/thamnophilus-doliatus>.
- Koloff, J. and D. J. Mennill (2020). Barred Antshrike (*Thamnophilus doliatus*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.barant1.01>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species - CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Batará (*Thamnophilus schistaceus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Batará y Plain-winged Antshrike

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes



Distribución continental:

Colombia, Ecuador, Perú,
Bolivia y Brasil.

Distribución Nacional: Beni,
Cochabamba, La Paz, Pando
y Santa Cruz.

Distribución en Loma

Santa: Toda el área de
conservación.

Ecorregiones: Amazonia,
Cerrado y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

155

❶ **Hábitat y Biología:** En bordes de bosque amazónico de tierra firme, várzea y transicional, bosque húmedo a hiperhúmedo del piedemonte y Yungas inferiores, tanto primario como secundario. Construye su nido en forma de copa profunda con fibras vegetales gruesas, hojas secas, raíces y tallos, donde coloca 2 huevos, de color blanco cremoso, moteados y manchados con marrón oscuro.

❷ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No está globalmente amenazada. De bastante común a común en toda su extensa área de distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/antbirds-antshrikes-antwrens/thamnophilus-schistaceus>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio

de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.
- Zimmer, K. and M.L. Isler (2020). Plain-winged Antshrike (*Thamnophilus schistaceus*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.plwant1.01>.

Batará Hombro Blanco (*Thamnophilus aethiops*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Batará hombro blanco y White-shouldered Antshrike

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes



Distribución continental: Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Bosque húmedo a hiperhúmedo del piedemonte y Yungas inferiores, en bosque amazónico de tierra firme, transicional y localmente en bosque alto. El nido en forma de una copa abierta y profunda, construida con raíces finas y tallos de hierba apretados. La hembra coloca 2 huevos blancos, con manchas rojizas oscuras.

Amenazas generales en toda su área de distribución: No está globalmente amenazada. Generalmente poco común en toda su extensa área de distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía


- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/antbirds-antshrikes-antwrens/thamnophilus-aethiops>;
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.
- Zimmer, K. and M.L. Isler (2020). White-shouldered Antshrike (*Thamnophilus aethiops*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.whsant2.01>.

Batarito cabeza gris (*Dysithamnus mentalis*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Batarito cabeza gris y Plain Antvireo



- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes



- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: En bordes de una variedad de bosques semi a hiperhúmedos de la ladera este de los Andes y tierras bajas centrales; distribución continua en los Andes y tierras bajas adyacentes, más discontinua en las tierras bajas del este. Elabora su nido en forma de una copa profunda, de raíces fibrosas oscuras, filamentos de hongos y/o materiales herbáceos, donde coloca 2 huevos de color blanco opaco.

Amenazas generales en toda su área de distribución: No está globalmente amenazada. Generalmente bastante común en toda su extensa área de distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/antbirds-antshrikes-antwrens/dysithamnus-mentalis>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio

de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.
- Zimmer, K. and M.L. Isler (2020). Plain Antvireo (*Dysithamnus mentalis*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.plaant1.01>.

Batará azul (*Thamnomanes schistogynus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Batará azul y Bluish-slate Antshrike



♂

El macho es gris oscuro en todo el cuerpo, excepto por la mancha interescapular blanca oculta

Mide entre
13 a 15 cm
de longitud



♀

La hembra es ligeramente más parda y pálida, con el vientre y los flancos de color canela-rufa intenso, auriculares y plumas de la garganta con estrías blancas

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes



Bolivia

Distribución continental: Bolivia, Brasil y Perú.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Puerto Vichí ricansi.

Ecorregiones: Amazonia y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** En sotobosque y estrato medio de bosques siempreverdes de tierras bajas, ocupa bosques de tierra firme como de várzea, a menudo sobre todo en claros con abundantes bambúes y enredaderas. Nido en forma de una copa profunda, forrado con fibras vegetales finas donde coloca 2 huevos, blancos con manchas rojizas o parduscas en toda la superficie.

❗ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No está globalmente amenazada. De bastante común a común en toda su área de distribución, gran parte de la cual sigue estando poco desarrollada y es relativamente inaccesible.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/antbirds-antshrikes-antwrens/thamnomanes-schistogynus>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio

de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEP-WCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.
- Zimmer, K. and M.L. Isler (2020). Bluish-slate Antshrike (*Thamnomanes schistogynus*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.blsant1.01>.


Hormiguero pigmeo (*Myrmotherula brachyura*)

Nombre T'simane: -


Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Hormiguero pigmeo y Pygmy Antwren

Mide entre
6 a 8 cm
de longitud



El macho tiene la corona y las partes superiores negras, estriadas de blanco, estrias ligeramente teñidas de amarillo excepto en la corona, mejillas blancas; rabadilla gris, sin estrias; mancha interescapular blanca, alas negras, garganta blanca, estrecha raya malar oscura; partes inferiores amarillas



La hembra es como el macho excepto por el tinte beige en las zonas pálidas de la cabeza y la parte del pecho



Bolivia

Distribución continental:

Guyana, Venezuela, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

Piñal, Pto. Calixto, Jororí, Pto. Salas, Rosario y Chirisi.

Ecorregiones: Amazonia y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: En subdosel y el estrato medio de bosques subtropicales o tropicales en regiones bajas. En Bolivia, bastante común a común en los bordes de bosque amazónico de tierra firme, várzea, transicional y bosque húmedo a hiperhúmedo del piedemonte y Yungas inferiores. No se conoce mucha información sobre su biología reproductiva de esta especie a pesar de tener una amplia distribución.

Amenazas generales en toda su área de distribución: No está globalmente amenazada. Se considera bastante común en toda su extensa área de distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/antbirds-antshrikes-antwrens/dysithamnus-mentalis>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio

de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.
- Zimmer, K. and M.L. Isler (2020). Plain Antwren (*Dysithamnus mentalis*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.plaant1.01>.


Hormiguero axila blanca (*Myrmotherula axillaris*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Hormiguero axila blanca y White-flanked Antwren

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes



Las hembras y los inmaduros tienen las partes superiores marrones y sus partes inferiores son de color crema amarillento, con la parte superior de las alas pardo rojizas ligeramente listadas



Distribución continental:

Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guayana francesa y Brasil.

Distribución Nacional:

Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

Toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** En bosque amazónico de tierra firme, várzea, transicional, achaparrado (sartenejal) y bosque semi a hiperhúmedo del piedemonte, Yungas inferior y Chiquitania norte. Construyen nidos en forma de copa con fibras vegetales y hojas muertas que colocan en las ramas bajas de los árboles o los arbustos. Las hembras suelen poner dos huevos blancos con motas violetas.

⚠️ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No está globalmente amenazada. Se considera bastante común en toda su extensa área de distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía


- del Hoyo, J., K. Zimmer, N. Collar, M.L. Isler, and G. M. Kirwan (2020). White-flanked Antwren (*Myrmotherula axillaris*), version 1.0. In Birds of the World (S. M. Billerman, B. K. Keeney, P. G. Rodewald, and T. S. Schulenberg, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.whfant2.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/antbirds-antshrikes-antwrens/myrmotherula-axillaris>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Hormiguero pecho amarillo (*Hypocnemis subflava*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Hormiguero pecho amarillo y Yellow-breasted
Wanbling-Antwren



- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes



- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

161

❗ **Hábitat y Biología:** En bosque amazónico de tierra firme, bosques húmedos siempreverdes, especialmente en claros con vegetación densa (p. ej., alrededor de las caídas de árboles) y arroyos dentro del bosque, así como en bosques altos secundarios adyacentes. Nido en forma de copa, tejidos con hojas de palmera muertas, hojas de bambú (*Guadua*), ponen 2 huevos blancos con motas y estrías muy variables de color rojo parduzco.

🐼 **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No está globalmente amenazada (Menor Riesgo). De bastante común a común en la mayor parte de su extensa área de distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- del Hoyo, J., N. Collar, and G. M. Kirwan (2020). Yellow-breasted Warbling-Antbird (*Hypocnemis subflava*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.yebwaal.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. [https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/antbirds-](https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/antbirds-antshrikes-antwrens/hypocnemis-subflava)

[antshrikes-antwrens/hypocnemis-subflava](https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/antbirds-antshrikes-antwrens/hypocnemis-subflava).

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Hormiguero pecho amarillo (*Pyriglena maura*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Hormiguero ojo de fuego y White-backed Fire-eye

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes




Distribución continental:

Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, Brasil y Paraguay.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Pto. Gerardo, Jorori, Rosario y Chirisi.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chiquitania, Sabanas Inundadas, Valles y Yungas.



- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: En sotobosque y bordes de bosques y arbustales secos a hiperhúmedos de la ladera este de los Andes y tierras bajas centrales y estés; raro en bosque amazónico de várzea e igapó. Los nidos se construyen generalmente en el suelo para ocultarse tras la vegetación, y son construidos principalmente por los machos, las hembras colocan 2 huevos, de color rosa blanquecino, con manchas dispersas de color marrón rojizo

Amenazas generales en toda su área de distribución: No está globalmente amenazada (Menor Riesgo). De bastante común a común en la mayor parte de su extensa área de distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/antbirds-antshrikes-antwrens/pyriglena-maura>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio

de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.
- Zimmer, K. and M.L. Isler (2025). Western Fire-eye (*Pyriglena maura*), version 1.1. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, E. de Juana, and B. K. Keeney, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.wesfie1.01.1>.

Hormiguero ceja blanca (*Myrmoborus leucophrys*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Hormiguero ceja blanca y White-browed Antbird

La hembra presenta las partes superiores color castaño, mejillas negras; la garganta blanca; pecho y abdomen blancuzcos y la banda de la cabeza amarilla



El macho es gris pizarra, con la garganta y cara negras y una banda blanca en la cabeza, sobre los ojos

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes



Distribución continental:

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Pto. Gerardo, Pto. Vich'ricansi, Pto. Salas y Rosario.

Ecorregiones: Amazonia.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Sotobosque y bordes de bosque estacionalmente inundado, transicional, ribereño y secundario alto de la Amazonía. Datos sobre su biología reproductiva poco conocida, nido parecía estar construido con hojas de bambú, y colocado en el suelo en la base de un pequeño arbusto; 2 huevos, blanquecinos, moteados de marrón.

🛡️ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No está globalmente amenazada. Bastante común en la mayor parte de su extensa área de distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/antbirds-antshrikes-antwrens/myrmoborus-leucophrys>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio

de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.


- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.
- Zimmer, K. and M.L. Isler (2020). White-browed Antbird (*Myrmoborus leucophrys*), version 1.0. In Birds of the World [J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors]. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.whbant6.01>.

Hormiguero cara negra (*Myrmoborus myotherinus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Hormiguero cara negra y Black-faced Antbird



El macho es de color gris azulado en la parte superior, con las alas y la cola ligeramente más oscuras, la cara, la garganta y las puntas de las alas negras

La hembra es más apagada, en su mayoría de marrón-oliva con la punta de las alas negras y las partes inferiores de color de ante claro

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes



Bolivia

Distribución continental:

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Bosques siempreverdes de tierras bajas y pie de monte y bosques altos secundarios adyacentes. En Bolivia, en sotobosque y bordes de bosque primario y secundario amazónico de tierra firme y achaparrado (sartenejal, del piedemonte y Yungas inferiores húmedos a hiperhúmedos. Nido abovedado construido con fibra de palmera negra, hojas secas de palmera, la hembra coloca 2 huevos de color blanco a blanquecino, manchados o salpicados de púrpura.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No está globalmente amenazada. De bastante común a común en la mayor parte de su extensa área de distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/antbirds-antshrikes-antwrens/myrmoborus-myiotherinus>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio

de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.


- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.
- Zimmer, K. and M.L. Isler (2020). Black-faced Antbird (*Myrmoborus myotherinus*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.blfant2.01>.

Hormiguero cola bandeada (*Hypocnemoides maculicauda*)

Nombre Tsimane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Hormiguero cola bandeada y Band-tailed Antbird



El macho es gris, más claro por abajo, con la garganta negra y una mancha dorsal blanca semicircular; cobertoras del ala negras con tres listas blancas



La hembra es parecida por arriba; blanca por abajo manchada de gris, principalmente en el pecho



Distribución continental:

Bolivia, Brasil y Perú.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

Casi toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania y Sabanas Inundadas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Bastante común a común en el sotobosque de bosque estacionalmente inundado, de galería, de bordes de ríos y riachuelos de tierras bajas, casi siempre cerca del agua. Muy poca información. Nido y huevos no descritos. La única información sobre la estacionalidad de la cría es una única observación de un adulto alimentando juveniles.

Amenazas generales en toda su área de distribución: El estado de conservación de la Hormiguero Cola Bandeada en la Lista Roja de la UICN se evalúa como de Menor Riesgo. Esta especie tiene una amplia distribución y se cree que la tendencia de la población es estable, aunque no se ha cuantificado.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/antbirds-antshrikes-antwrens/hypocnemoides-maculicauda>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio

de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

- Schulenberg, T. S. and G. M. Kirwan (2020). Band-tailed Antbird (*Hypocnemoides maculicauda*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.batant1.01>.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEP/WCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.


Hormiguero lomo moteado (*Hylophylax naevius*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Hormiguero lomo moteado y Spot-backed Antbird

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes



Distribución continental:

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guayana, Perú, Surinam y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Casi toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** En sotobosque de bosques siempreverdes húmedos de tierras bajas y pie de monte (*tierra firme*, transicional, *várzea*) y bosque maduro a menudo cerca de claros de árboles. En Bolivia, en el sotobosque y bordes de bosque amazónico de tierra firme y Yungas inferiores húmedos y de la Chiquitania norte semihúmeda. Nido colgante compuesto, principalmente utiliza raicillas de helecho y fibras de *Marasmius*, coloca de 1 a 3 huevos de color marrón violáceo muy teñido.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No está globalmente amenazada. De bastante común a común en la mayor parte de su extensa área de distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Solís, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/antbirds-antshrikes-antwrens/hylophylax-naevius>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEP-WCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.
- Zimmer, K. and M.L. Isler (2020). Spot-backed Antbird (*Hylophylax naevius*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.spbant6.01>.

Hormiguero plumizo (*Myrmelastes hypertythrus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Hormiguero plumizo y Plumbeous Antbird



Distribución continental:

Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Bolivia.

Distribución Nacional: Beni, La Paz y Pando.

Distribución en Loma Santa:

Casi toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Bosque amazónico, sotobosque y suelo de bosques siempreverdes de tierras bajas, tanto inundados estacionalmente (várzea) como de transición. Prefiere el interior sombreado y más abierto de la várzea, especialmente donde abundan los pequeños arbolillos. Nido en forma de una canasta, hecha de raíces de helecho negro, hojas secas unidas al exterior por tela de araña y entretejida, donde coloca 2 huevos rosáceos.

Amenazas generales en toda su área de distribución: No está globalmente amenazada. De bastante común a común en la mayor parte de su área de distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/antbirds-antshrikes-antwrens/myrmelastes-hypertythrus>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio

de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.
- Zimmer, K. and M.L. Isler (2020). Plumbeous Antbird (*Myrmelastes hypertythrus*), version 1.0. In Birds of the World [J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors]. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.plumant1.01>.

Hormiguero cola café (*Sciaphylax hemimelaena*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Hormiguero cola café y Chesnut-tailed Antbird

Tienen una mancha blanca entre las escapulares con manchas negras cerca de las puntas de las plumas.

Tienen un pico negro

Los machos tienen la cabeza y el manto superior grises con centros negros en las plumas, su cola y sus plumas de color marrón rojizo amarillento oscuro

Su garganta y parte superior del pecho son negras, el centro de su vientre de blanco a gris

Mide entre 10 a 11 cm de longitud

Las hembras marrón en su coronilla, una garganta y pecho de color marrón amarillento rojizo y un vientre de color marrón amarillento rojizo pálido a blanco

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes



Distribución continental: Perú, Brasil y Bolivia.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Pando.

Distribución en Loma Santa: Toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chiquitania y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Bordes de bosque primario y secundario amazónico de tierra firme, de transición y bordes de ríos, bosque semi a hiperhúmedo del piedemonte y Yungas inferiores. Uno de los hormigueros más comunes en la Amazonía y Yungas inferiores, especialmente en los bordes de bosque. Nido en forma de una copa abierta, hecha principalmente de tiras de hoja de palmera entretejidas con hojas muertas y raicillas, coloca 2 huevos de color blanco cremoso.

Amenazas generales en toda su área de distribución: No está globalmente amenazada. De bastante común a común en la mayor parte de su área de distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/antbirds-antshrikes-antwrens/sciaphylax-hemimelaena>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.
- Zimmer, K. and M.L. Isler (2020). Chestnut-tailed Antbird (*Sciaphylax hemimelaena*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.chtant2.01>

Hormiguero garganta negra (*Myrmophylax atrothorax*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Hormiguero garganta negra y Black-throated Antbird



- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes



Distribución continental:

Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana francesa, Brasil, Ecuador, Perú y Bolivia.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Pando.

Distribución en Loma Santa: Toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chiquitania y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Bordes de los bosques siempreverdes (*tierra firme*, transicional, *várzea/igapó*), bosques de secundario y bordes fluviales, bosque ribereños. Nido en forma de una copa construida con hojas muertas de juncos y algunas hojas más anchas, forrado con fibras, coloca 2 huevos de color blancos con tinte violeta en un extremo y salpicados de diminutas manchas rojas.

🐼 **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No está globalmente amenazada. Bastante común en toda su extensa área de distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/antbirds-antshrikes-antwrens/myrmophylax-atrothorax>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio

de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.


- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.
- Zimmer, K. and M.L. Isler (2020). Black-throated Antbird (*Myrmophylax atrothorax*), version 1.0. In Birds of the World [J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors]. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.bltant2.01>.

Hormiguero cara pelada (*Phlegopsis nigromaculata*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Hormiguero cara pelada y Black-spotted bare-eye



- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes



Distribución continental:

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Pando.

Distribución en Loma Santa: Toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Bosque amazónico de tierra firme, bosques de transición y bosques inundables de várzea e igapó. Construye su nido en forma de una copa abierta construida con hojas secas de bambú, forrada con pequeñas fibras vegetales, donde coloca 2 huevos de color rosa pálido con densas líneas onduladas.

Amenazas generales en toda su área de distribución: No está globalmente amenazada. De poco común a bastante común en la mayor parte de su extensa área de distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/antbirds-antshrikes-antwrens/phlegopsis-nigromaculata>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.
- Zimmer, K. and M.L. Isler (2020). Black-spotted Bare-eye (*Phlegopsis nigromaculata*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.bsbye1.01>.

Tororoi Amazónico (*Myrmothera berlepschi*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Tororoi Amazónico y Amazonian Antpitas



- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes



Distribución continental:
Bolivia, Brasil y Perú.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Pando.

Distribución en Loma Santa:
Jorori, Pto. Salas, Rosario y Chirisi.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN:** NT: Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

171

❗ **Hábitat y Biología:** Habita los estratos bajos densos de bosques amazónicos y en claros cubiertos de maleza, bosque ribereño, bordes de bosque secundario y de várzea. No se conoce datos sobre su biología reproductiva.

🌍 **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No está globalmente amenazada. Es poco común en la mayor parte de su extensa área de distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., Maccormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/antpittas-tororois/myrmothera-berlepschi>.
- Krabbe, N. and T. S. Schulenberg (2021). Amazonian Antpitta (*Myrmothera berlepschi*), version 1.1. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.amaantl.011>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Gallito cara negra (*Formicarius analis*)

Nombre T'simane: Goisiriri

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Gallito cara negra y Black-face Anthrush

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes



Bolivia

Distribución continental:

Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana francesa, Brasil, Ecuador, Perú y Bolivia.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Pando.

Distribución en Loma Santa: Casi toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania y Yungas.



- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN:** NT: Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Bosques primarios y bosques secundarios maduros, que están bien sombreados y con algo de cubierta vegetal. En Bolivia, se lo registra en bosque amazónico alto primario y secundario (principalmente de várzea y transicional), bosque del piedemonte, Yungas inferior y Chiquitania norte. En las cavidades del suelo colocan hojas y flores, donde la hembra coloca 2 huevos blancos, débilmente punteados en toda la superficie con marrón

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No está globalmente amenazada. Es poco común a común en la mayor parte de su extensa área de distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/anthruses/formicarius-analis>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio

de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.


- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.
- van Dort, J., M. A. Patten, and P. F. D. Boesman (2023). Black-faced Anthrush (*Formicarius analis*), version 2.0. In Birds of the World (S. M. Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.blfantl.02>.

Trepador Oliváceo (*Sittasomus griseicapillus*)

Nombre T'simane: Chuguic

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Trepa Palo, Olivaceous Woodcreeper



Distribución continental: México, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Guayana Francesa, Surinam, Guyana, Ecuador, Perú, Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil.

Distribución Nacional: Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En casi toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Boliviano-Tucumano, Chaco, Chaco Serrano, Chiquitania, Cerrado, Sabanas Inundables, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

173

❶ **Hábitat y Biología:** Bastante común a común en y a los bordes de una amplia variedad de bosques y arbustales secos a hiperhúmedos a lo largo de las tierras bajas y ladera este inferior de los Andes; generalmente ausente en pequeñas islas de bosque de sabanas. Solitario o en parejas desde el estrato medio hasta el dosel. A menudo en bandadas mixtas. Vocaliza todo el año. Forrajea activamente sobre troncos y ramas, caza insectos espantados en vuelo.

❷ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Aparentemente sensible a la alteración de hábitat, sin embargo, se necesitan estudios actuales en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/sittasomus-griseicapillus/>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Patten, M. A. (2020). Olivaceous Woodcreeper (*Sittasomus griseicapillus*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.oliwool.01>.

Trepador Barbilla Blanca (*Dendrocincla merula*)

Nombre T'simane: Chuguic

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Tropa Palo, White-chinned Woodcreeper

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Columbiformes


**Distribución continental:**

Colombia, Venezuela, Guayana Francesa, Surinam, Guyana, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En toda el área.

Ecorregiones: Amazonia.



- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Raro a poco común en bosque amazónico de tierra firme, várzea y transicional; localmente en bosque húmedo del piedemonte andino. Solitario o en parejas; forrajea casi exclusivamente siguiendo a hormigas ejército.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Apparently es muy sensible a la fragmentación y perturbación del bosque maduro, sin embargo, se necesitan más estudios actuales en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/dendrocincla-merula/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Marantz, C. A., A. Aleixo, L. R. Bevier, and M. A. Patten (2020). White-chinned Woodcreeper (*Dendrocincla merula*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.whcwool01>.

Trepador Pardo (*Dendrocincla fuliginosa*)

Nombre T'simane: Chuguic

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Trepa Palo, Plain-brown Woodcreeper



Distribución continental:

Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, Colombia, Venezuela, Guayana Francesa, Surinam, Guyana, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chiquitania, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

175

❶ **Hábitat y Biología:** Poco común a localmente bastante común en y a los bordes de bosque primario y secundario amazónico de tierra firme, várzea, transicional, semihúmedo Chiquitano y bosque húmedo a hiperhúmedo del piedemonte y Yungas inferiores. Solitario en el sotobosque y estrato medio inferior; a menudo forrajea siguiendo hormigas ejército, rara vez en bandadas mixtas. Vocaliza mucho temprano en la mañana y casi todo el año.

❷ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Aparentemente muy sensible a la fragmentación de los bosques y a otras formas de perturbación humana, sin embargo, se necesitan más estudios actuales en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/dendrocincla-fuliginosa/>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Marantz, C. A., A. Aleixo, L. R. Bevier, M. A. Patten, and H. F. Greeney (2020). Plain-brown Woodcreeper (*Dendrocincla fuliginosa*), version 1.0. In Birds of the World (S. M. Billerman, B. K. Keeney, P. G. Rodewald, and T. S. Schulenberg, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.plbwoo1.01>.


Trepador Garganta Canela (*Dendrexetastes rufigula*)

Nombre T'simane: Chuguic

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Trepa Palo, Cinnamon-throated Woodcreeper

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Columbiformes

**Distribución continental:**

Colombia, Venezuela, Guayana Francesa, Surinam, Guyana, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Jorori y Chirisi.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Raro y al parecer algo local pero fácilmente pasado por alto en y a los bordes de bosque amazónico de tierra firme, várzea y transicional, bosque semihúmedo de la Chiquitania norte y húmedo del piedemonte y Yungas inferiores. Prefiere bordes y vegetación de sucesión relativamente madura con palmeras. Solitario o en parejas en el estrato medio y dosel, a veces en bandadas mixtas.

Amenazas generales en toda su área de distribución: A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Se sugiere que es muy sensible a la modificación del hábitat, sin embargo, se necesitan estudios actualizados para tener un mejor panorama sobre la incidencia de esta y otras presiones.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/dendrexetastes-rufigula/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Marantz, C. A., A. Aleixo, L. R. Bevier, and M. A. Patten (2020). Cinnamon-throated Woodcreeper (*Dendrexetastes rufigula*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.citwool01>.

Trepador Pico de Cuña (*Glyphorynchus spirurus*)


Nombre T'simane: Chuguic

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Tropa Palo, Wedge-billed Woodcreeper

Gran parte de su cuerpo es marrón rojizo, con finas estrías a ambos lados de la cabeza, una ceja naranja amarillento

Mide entre 12,5 y 13 cm de longitud



Se le distingue fácilmente de sus parientes por su pequeño tamaño, y su pico distintivo también pequeño

La garganta y el resto de la parte inferior está moteada de naranja amarillento, especialmente en el pecho. El pico corto es muy diferente en su forma del de otros trepadores, en formato de cuña y vuelto hacia arriba

Las plumas de la cola terminan en púas sobresalientes muy largas



Bolivia

Distribución continental:

México, Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Guayana Francesa, Surinam, Guyana, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En casi toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

177

❶ **Hábitat y Biología:** Bastante común a común pero fácilmente pasado por alto en y a los bordes de bosque de tierra firme y transicional amazónico, del piedemonte y Yungas inferiores húmedos a hiperhúmedos y de la Chiquitania norte semihúmeda; menos frecuente y quizás solo localmente en bosque de várzea. Solitario o en parejas en el sotobosque y estrato medio inferior; forrajea principalmente en troncos, regularmente en bandadas mixtas. A diferencia de la mayoría de los trepadores a menudo retira o cincela la corteza y da picotazos. Discreto y bastante silencioso.

❷ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Aparentemente las poblaciones no se ven realmente afectadas por las actividades humanas, sin embargo, se necesitan estudios actuales en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/glyphorynchus-spirurus/>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Marantz, C. A., Aleixo, L. R., Bevier, M. A., Patten, and D. A. Christie (2020). Wedge-billed Woodcreeper (*Glyphorynchus spirurus*), version 1.0. In *Birds of the World* (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.webwoo1.01>.

Trepador Viente Bandeado (*Dendrocolaptes*

picumnus)

Nombre T'simane: Chuguic

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Trepa Palo, Black-banded Woodcreeper



- **Clase:** Aves
- **Orden:** Columbiformes



Distribución continental:

México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Guayana Francesa, Surinam, Guyana, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina y Brasil.

Distribución Nacional: Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:
En casi toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Boliviano-Tucumano, Cerrado, Chaco, Chiquitania, Chaco Serrano, Sabanas Inundables, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Raro a localmente bastante común en una variedad de bosques secos a hiperhúmedos de tierras bajas y ladera este de los Andes. Solitario o en parejas en el sotobosque y estrato medio. En las tierras bajas norte y piedemonte norte asociado con hormigas ejército, rara vez en bandadas mixtas; fácilmente pasado por alto. Canta principalmente al amanecer todo el año.

👉 **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Apparently the populations are not really affected by human activities, however, more studies are needed in this aspect.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/ovenbirds-horneros/dendrocolaptes-picumnus/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Marantz, C. A., A. Aleixo, L. R. Bevier, and M. A. Patten (2024). Black-banded Woodcreeper (*Dendrocolaptes picumnus*), version 1.1. In *Birds of the World* (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, E. de Juana, and M. G. Smith, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.blbwoo1.01.1>.

Trepador Elegante (*Xiphorhynchus elegans*)

Nombre T'simane: Chuguic

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Tropa Palo, Trepador Elegante, Elegant Woodcreeper



La cabeza, el cuello y el pecho están moteados con pequeñas manchas crema amarillento bordeadas de negro



El pico es recto y oscuro

Partes superiores y gran parte de las zonas inferiores de color rojizo olivo; partes del ala y la cola un tono más rojizo

Mide entre 15 y 18 cm de longitud



Bolivia

Distribución continental:

Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil.

Distribución Nacional: Beni, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

Piñal, Pto. Calixto, Pto. Gerardo y Jorori.

Ecorregiones: Amazonia y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

179

❗ **Hábitat y Biología:** Bastante común a común en bosque amazónico de tierra firme y transicional, del piedemonte y Yungas inferiores húmedos; menos frecuente en bosque de várzea e igapó. Solitario o en parejas en el sotobosque y estrato medio; especie núcleo en bandadas mixtas del sotobosque. Vocaliza mucho todo el año.

🌍 **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Aparentemente las poblaciones no se ven realmente afectadas por las actividades humanas, sin embargo, se necesitan estudios actuales en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/xiphorhynchus-elegans/>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Marantz, C. A., Aleixo, L. R., Bevier, and M. A. Patten (2020). Elegant Woodcreeper (*Xiphorhynchus elegans*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.elewoo1.01>.

Trepador Garganta Anteada (*Xiphorhynchus guttatus*)

Nombre T'simane: Chuguic


Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Trepa Palo, Trepador Garganta Anteada, Buff-throated Woodcreeper



Su pico es largo y ligeramente curvado hacia abajo, cuya mandíbula superior es de color gris oscuro y la inferior es crema claro

Mide entre 21 y 22 cm de longitud



Su cuerpo es de color marrón rojizo con la cabeza, cuello y pecho salpicado con múltiples motas y pequeñas listas crema amarillentas

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes

**Distribución continental:**

Colombia, Venezuela, Guayana Francesa, Surinam, Guyana, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil.

Distribución Nacional: Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Boliviano-Tucumano, Cerrado, Chaco, Chiquitania, Chaco Serrano, Sabanas Inundables, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Bastante común a común en una variedad de bosques secos a hiperhúmedos de tierras bajas y ladera este de los Andes norte y centrales (pero no al interior de bosque amazónico de tierra firme). Solitario o en parejas en todos los estratos; a menudo en bandadas mixtas, ocasionalmente sigue a hormigas ejército. Vocaliza mucho todo el año.

Amenazas generales en toda su área de distribución: A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Apparently las poblaciones se ven de moderada a altamente sensible a la pérdida continuada de bosque, sin embargo, se necesitan estudios actuales para medir el impacto que tienen para la especie esta y otras presiones.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Mailland O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/xiphorhynchus-guttatus/>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Marantz, C. A., J. del Hoyo, N. Collar, A. Aleixo, L. R. Bevier, G. M. Kirwan, and M. A. Patten (2020). Buff-throated Woodcreeper (*Xiphorhynchus guttatus*), version 1.0. In Birds of the World (S. M. Billerman, B. K. Keeney, P. G. Rodewald, and T. S. Schulenberg, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.butwoo1.01>.

Picolezna Liso Brasileño *Xenops minutus* (genibarbis)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Picolezna Liso Brasileño, Amazonian Plain-Xenops



- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriforme



Distribución continental:

Colombia, Venezuela, Guayana Francesa, Surinam, Guyana, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Pto. Salas, Rosario y Chirisi.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Raro a localmente bastante común en bosque primario y secundario semihúmedo a húmedo de la Amazonía (bosque de tierra firme, várzea y transicional), piedemonte, Yungas inferiores y Chiquitania norte. Solitario o en parejas en el sotobosque y estrato medio inferior, a menudo en bandadas mixtas. Canta esporádicamente todo el año.

🌍 **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Apparently las poblaciones se ven afectadas por la alteración del hábitat, principalmente la deforestación, sin embargo, se necesitan estudios actuales para medir el impacto que tienen para la especie esta y otras presiones.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Decker, S. and P. F. D. Boesman (2024). Amazonian Plain-Xenops (*Xenops genibarbis*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, S. M. Billerman, and N. D. Sly, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.plaxen3.01>.

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/xenops-minutus/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

Picolezna Rayado (*Xenops rutilans*)

Nombre Tsimane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Picolezna Rayado, Streaked Xenops



- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriforme

**Distribución continental:**

Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, Colombia, Venezuela, Argentina, Paraguay, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil.

Distribución Nacional: Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En casi toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Boliviano-Tucumano, Cerrado, Chiquitania, Chaco Serrano, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Raro a bastante común en una variedad de bosques primarios y secundarios semi a hiperhúmedos de la ladera este de los Andes y tierras bajas; en la Amazonía principalmente en bosque de tierra firme. En parejas en el subdosel y dosel, a menudo en bandadas mixtas. Forrajea en ramas delgadas y secas, se mueve rápidamente, picotea rápida y lentamente. Vocaliza bastante todo el año.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Apparently las poblaciones no se ven realmente afectadas por las actividades humanas, sin embargo, se necesitan estudios actuales en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/xenops-rutilans/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Remsen, Jr., J. V. (2020). Streaked Xenops (*Xenops rutilans*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.strxen1.01>.

Tiluchi (*Furnarius leucopus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Tiluchi, Hornero, Pale-legged Hornero



- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriforme



Distribución continental:

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Paraguay y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Pto. Salas, Rosario y Chirisi.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania y Sabanas Inundables.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

- **Hábitat y Biología:** Raro a localmente bastante común en bosque, arbustales y matorrales húmedos a semihúmedos que bordean ríos y lagunas de la Amazonía, Llanos de Moxos, Pantanal y localmente Chiquitania. Solitario o en parejas. Terrestre y arbóreo; se alimenta en el suelo caminando con pasos largos mientras la cabeza se mueve de arriba a abajo. Construye nido de barro en forma de domo en árboles o postes de energía. Vocaliza mucho todo el año.

Amenazas generales en toda su área de distribución: A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Aparentemente las poblaciones no se ven realmente afectadas por las actividades humanas, sin embargo, se necesitan estudios actuales en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/furnarius-leucopus/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Kirwan, G. M., J. V. Remsen, Jr., and E. de Juana (2023). Pale-legged Hornero (*Furnarius leucopus*), version 1.0. In Birds of the World (S. M. Billerman and B. K. Keeney, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.palhor3.01>.

Colaespina Corona Parda (*Synallaxis gujanensis*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Colaespina Corona Parda, Plain-crowned Spinetail

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriforme

**Distribución continental:**

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Surinam, Guyana, Perú y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Rosario.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chaco, Chiquitania, Sabanas Inundables y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Poco común a bastante común en matorrales y arbustales primarios y secundarios semihúmedos a húmedos, matorrales riparios, bosque ribereño, bordes de bosque, plantaciones y áreas agrícolas de tierras bajas y piedemonte de los Andes norte y centrales. En parejas en el follaje denso cerca del suelo. Mejor detectado por voz; vocaliza bastante.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Apparently the populations are not really affected by human activities, but studies are needed in this aspect.

Mapa: Asociación Civil Armonía


- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/synallaxis-gujanensis/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Remsen, Jr., J. V. (2020). Plain-crowned Spinetail (*Synallaxis gujanensis*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.plcspi1.01>.

Colaespina Pecho Blanco (*Synallaxis albescens*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Colaespina Pecho Blanco, Pale-breasted Spinetail



Distribución continental:

Costa Rica, Panamá, Bolivia, Brasil, Colombia, Guayana Francesa, Surinam, Guyana, Perú, Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Pto. Vichi'ricansi y Pto. Salas.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chaco, Chiquitania, Chaco Serrano, Sabanas Inundables, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Raro a poco común en pastizales, sabanas, pasturas y playas arbustivas de ríos, cerrado, bordes de bosque y zonas agrícolas de tierras bajas y localmente en la ladera este inferior de los Andes. Solitario o en parejas cerca del suelo; fácilmente pasado por alto a menos que cante.

Amenazas generales en toda su área de distribución: A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Apparently las poblaciones no se ven realmente afectadas por las actividades humanas, sin embargo, se necesitan estudios actuales en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsobolivia.org/es/synallaxis-albescens/>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Remsen, Jr., J. V. (2020). Pale-breasted Spinetail (*Synallaxis albescens*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.pabspil.01>.

Colaespina Rojizo (*Synallaxis rutilans*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Colaespina Rojizo, Ruddy Spinetail



- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriforme

**Distribución continental:**

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Surinam, Guyana, Perú y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Jorori.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Raro a poco común en bosque amazónico de tierra firme, várzea, transicional, bosque húmedo del piedemonte y semihúmedo de la Chiquitania norte. Solitario o en parejas en el sotobosque denso, especialmente en claros de árboles caídos, ocasionalmente en bandadas mixtas.

⚠️ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Apparently las poblaciones no se ven realmente afectadas por las actividades humanas, sin embargo, se necesitan estudios actuales en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/synallaxis-rutilans/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Remsen, Jr., J. V. (2020). Ruddy Spinetail (*Synallaxis rutilans*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.rudspii.01>.

Saltarín-Tirano Enano (*Tyrannutes stolzmanni*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Saltarín-Tirano Enano, Dwarf Tyrant-Manakin



Distribución continental:

Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

Piñal, Pto. Gerardo, Pto. Vichiricansi, Chirisi.

Ecorregiones: Amazonia y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN LC:** Preocupación menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Poco común a bastante común en bosque amazónico de tierra firme, transicional y várzea, bosque semihúmedo a húmedo del piedemonte y Yungas inferiores. Fácilmente pasado por alto excepto cuando vocaliza. Solitario; macho canta desde ramas expuestas del sotobosque superior y estrato medio inferior; en despliegue vuela directamente hacia arriba desde ramas del dosel superior, seguido por un descenso en picado. Forrajea frutos y artrópodos desde el estrato medio hasta el dosel.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Aparentemente las poblaciones no se ven realmente afectadas por las actividades humanas, sin embargo, se necesitan estudios actuales en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/tyrannutes-stolzmanni/>.


- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Snow, D. (2020). Dwarf Tyrant-Manakin (*Tyrannutes stolzmanni*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.dwtman1.01>.

Saltarín-Tirano Vientre Azufrado (*Neopelma sulphureiventer*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Saltarín-Tirano Vientre Azufrado, Sulphur-bellied Tyrant-Manakin



Macho y hembra iguales. Saltarín con plumaje más apagado, con pico y cola relativamente largos

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriforme



Distribución continental:

Perú, Bolivia y Brasil.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

Piñal, Pto. Calixto, Pto. Vichiricansi, Chirisi.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania, Cerrado y Sabanas Inundables..

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Raro a poco común en bosque de várzea, igapó, transicional, ribereño y de galería de tierras bajas al norte y al centro, y piedemonte del norte de los Andes. Poco conocido. Solitario en el sotobosque denso, especialmente en o cerca de bambú Guadua. Se alimenta principalmente de insectos, también come frutos.

🗿 **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Apparently las poblaciones no se ven realmente afectadas por las actividades humanas, sin embargo, se necesitan estudios actuales en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/neopelma-sulphureiventer/>.


- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Snow, D. (2020). Sulphur-bellied Tyrant-Manakin (*Neopelma sulphureiventer*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.sbtman1.01>.

Saltarín Corona Azul (*Lepidothrix coronata*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Saltarín Corona Azul, Blue-crowned Manakin



Distribución continental:

Perú, Bolivia y Brasil.

Distribución Nacional:

Beni, Cochabamba, La Paz y Pando.

Distribución en Loma Santa:

En casi toda el área.

Ecorregiones: Amazonia y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN LC:** Preocupación menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

189

❗ **Hábitat y Biología:** Poco común a bastante común en bosque amazónico de tierra firme y localmente de várzea, bosque húmedo a hiperhúmedo del piedemonte y Yungas inferiores. Macho realiza el despliegue solitario o en pequeños leks en el sotobosque. Fácilmente pasado por alto cuando no está en despliegue.

🌿 **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Aparentemente podría verse moderadamente afectada por la modificación del hábitat ante el posible cambio climático, sin embargo, se necesitan estudios actuales en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/lepidothrix-coronata/>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Snow, D. and G. M. Kirwan (2022). Blue-capped Manakin (*Lepidothrix coronata*), version 1.1. In Birds of the World (S. M. Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.blcman1.01.1>.

Salterín Cola Bandeada (*Pipra fasciicauda*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Salterín Cola Bandeada, Band-tailed Manakin

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriforme

**Distribución continental:**

Perú, Bolivia, Argentina, Paraguay y Brasil.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.**Distribución en Loma Santa:** En toda el área.**Ecorregiones:** Amazonia, Cerrado, Chiquitania y Sabanas Inundables.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Raro a común en bosque estacionalmente inundado (várzea e igapó) pantanoso, de galería y localmente en bordes de riachuelos en la mayor parte de las tierras bajas; generalmente encontrado cerca al agua. Machos realizan despliegue en grupos en el sotobosque, alternando vuelos de despliegue. Se alimenta de frutos.

Amenazas generales en toda su área de distribución: A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Apparently las poblaciones no se ven realmente afectadas por las actividades humanas, sin embargo, se necesitan estudios actuales en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía


- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/pipra-fasciicauda/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Snow, D. (2020). Band-tailed Manakin (*Pipra fasciicauda*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.batman1.01>.

Saltarín Cola Redonda (*Ceratopira chloromeros*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Saltarín Cola Redonda, Round-tailed Manakin



El macho es rojo desde la frente y la cara hasta la nuca, muslos amarillo crema; resto del plumaje negro



Bolivia

Distribución continental:

Perú, Bolivia y Brasil.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

En toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Poco común a bastante común en bosque semi a hiper húmedo de los Yungas inferiores, piedemonte y bosque de tierra firme y transicional de la Amazonía adyacente; disyunto en Pando, donde se restringe principalmente a bosque de várzea e igapó. Machos realizan despliegues en el estrato medio y dosel inferior, que incluye vuelos cortos y una danza elaborada (leks) en ramas horizontales. Fácilmente pasado por alto cuando no está en despliegue. Forrajea frutos y artrópodos del follaje mediante vuelos cortos.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Aparentemente las poblaciones no se ven realmente afectadas por las actividades humanas, sin embargo, se necesitan estudios actuales en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

• Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.

• Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/ceratopira-chloromeros/>.

• IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

• Snow, D. (2020). Round-tailed Manakin (*Ceratopira chloromeros*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.rotman1.01>.

Cuervo Frutero Garganta Púrpura (*Querula purpurata*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Cuervo Frutero Garganta Púrpura, Purple-throated Fruitcrow

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriforme



Bolivia

Distribución continental:

Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Guayana Francesa, Surinam, Guyana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil.

Distribución Nacional: Beni, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En casi toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Poco común a bastante común en bosque amazónico de tierra firme y llanura aluvial, bosque húmedo del piedemonte y Yungas inferiores; localmente en bosque de galería en cerrado. En parejas o grupos familiares desde el estrato medio superior hasta el dosel. Se alimenta insectos grandes y frutos, generalmente tomados en vuelo. En despliegue el macho levanta las plumas púrpuras de la garganta.

Amenazas generales en toda su área de distribución: A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Apparently the populations are not really affected by human activities, but studies are needed in this aspect.

Mapa: Asociación Civil Armonía


- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Galindo, E. (2020). Purple-throated Fruitcrow (*Querula purpurata*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.putfru1.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/querula-purpurata/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

Cotinga Lentejuelada (*Cotinga cayana*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Cotinga Lentejuelada, Spangled Cotinga



El macho es de color celeste brillante, con un parche grande color morado rojizo en la garganta; las alas y la cola presentan plumas negras con bordes azul oscuro

La hembra es de color marrón grisáceo, la garganta es grisácea y bajo de las alas presenta color café acanelado. Ojos oscuros.



Distribución continental:

Guayana Francesa, Surinam, Guyana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil.

Distribución Nacional: Beni, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Piñal.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Rara a poco común en bosque amazónico de tierra firme y (menos frecuente) várzea, bosque húmedo del piedemonte y Yungas inferiores. Solitaria o en parejas en el dosel. Principalmente come frutos. Rara vez vocaliza.

🌱 **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC), sin embargo, de acuerdo a BirdLife International, en un futuro esta especie se verá afectada por la pérdida de hábitat. Las tendencias poblacionales están bajando por lo que no se descarta que en un futuro esta especie se categorice como Vulnerable (VU).

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/cotinga-cayana/>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Martínez, D. (2020). Spangled Cotinga (*Cotinga cayana*), version 1.0. In Birds of the World (S. M. Billerman, B. K. Keeney, P. G. Rodewald, and T. S. Schulenberg, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.spacot1.01>.

Siringuero (*Lipaugus vociferans*)

Nombre T'simane: Vijviya

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Siringuero, Screaming Piha



- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriforme

**Distribución continental:**

Guayana Francesa, Surinam, Guyana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitanía y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

- ❗ **Hábitat y Biología:** Bastante común a común en bosque amazónico de tierra firme y transicional, bosque semi a hiperhúmedo del piedemonte, Yungas inferior y Chiquitanía norte. Solitario en el sotobosque superior y sector medio inferior. Posa erguido y quieto por períodos largos; ocasionalmente realiza repentinos vuelos cortos por artrópodos del follaje; también se alimenta de frutos. Canta mientras tira la cabeza hacia atrás; su canto es uno de los sonidos característicos de la Amazonía.

Amenazas generales en toda su área de distribución: A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Apparently las poblaciones podrían verse afectadas por actividades humanas como la deforestación y degradación del hábitat, sin embargo, se necesitan estudios actuales en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía


- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/lipaugus-vociferans/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Suzuki, I., N. Fearnside, W. Tori, and J. I. Pareja (2020). Screaming Piha (*Lipaugus vociferans*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.scripih1.01>.

Cuervo Frutero Cuello Pelado (*Gymnoderus foetidus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Cuervo Frutero Cuello Pelado, Bare-necked
Fruitcrow



- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriforme



Distribución continental:

Guayana Francesa, Surinam, Guyana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En casi toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado y Chiquitania.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Raro a bastante común en bosque estacional inundado, ribereño y de galería de la Amazonía, piedemonte del norte de los Andes y Chiquitania norte. Solitario o en parejas en el dosel, ocasionalmente en bandadas pequeñas. Se alimenta de frutos e insectos grandes mientras salta o corre en ramas grandes. Regularmente vuela alto sobre ríos. Generalmente silencioso.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Apparently the populations do not seem to be really affected by human activities, however, more studies are needed in this aspect.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Solís, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/gymnoderus-foetidus/>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Snow, D. and A. Bonan (2020). Bare-necked Fruitcrow (*Gymnoderus foetidus*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.banfru1.01>.


Titira Cola Negra (*Tityra cayana*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Titira Cola Negra, Black-tailed Tityra

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriforme

**Distribución continental:**

Guayana Francesa, Surinam, Guyana, Trinidad y Tobago, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina y Brasil.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En casi toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chiquitania, Chaco y Sabanas Inundables.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Rara a bastante común en y a los bordes de una variedad de bosques y arbustales relativamente secos a húmedos de las tierras bajas y localmente en el piedemonte del norte de los Andes, incluyendo bosque de galería e islas de bosque de los Llanos de Moxos. Solitaria o en parejas en el dosel; no se une a bandadas mixtas, pero puede encontrarse junto a otros frugívoros en árboles con frutos. A menudo posa a la vista.

Amenazas generales en toda su área de distribución: A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Apparently the populations do not seem to be really affected by human activities, but more studies are needed in this aspect.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- del Hoyo, J., J. A. Mole, G. M. Kirwan, and N. Collar (2022). Black-tailed Tityra (*Tityra cayana*), version 1.1. In Birds of the World (B. K. Keeney, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.blttit1.011>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/tityra-cayana/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

Titira Enmascarada (*Tityra semifasciata*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Titira Enmascarada, Masked Tityra

Los machos son de color gris claro, con un antifaz negro alrededor de ojos y en la frente. Los ojos, a su vez, están delimitados por un anillo desnudo grueso de color rojo

El pico es rojo con negro en la punta

Mide entre 18,5 y 19,5 cm de longitud

♂

♀

Las patas también son negras

Las hembras conservan el patrón del macho en cuanto a anillo ocular, pico y patas; pero la cara, la corona y la frente son color marrón grisáceo, lo mismo que la nuca, la espalda y los costados; la parte del vientre tiene un tono crema, pero más claro

Presenta plumas negras en las alas; su cola tiene una barra negra en la parte media el resto es blanco



Distribución continental:

México, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Perú, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Guayana Francesa, Ecuador, Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Jorori.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chiquitania, Sabanas Inundables, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Rara a bastante común en y a los bordes de una variedad de bosques semi a hiperhúmedos de tierras bajas y ladera este inferior de los Andes norte. Solitaria o en parejas en el dosel; no se une a bandadas mixtas, pero puede encontrarse junto a otros frugívoros en árboles con frutos. A menudo posa a la vista. Bastante silenciosa.

🌐 **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Apparently las poblaciones no se ven realmente afectadas por las actividades humanas, sin embargo, se necesitan estudios actuales en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

• Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.

• Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/tityra-semifasciata/>.

I-UICN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

• Mobley, J. A. and E. de Juana (2020). Masked Tityra (*Tityra semifasciata*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.mastit1.01>.

Shifornis Ala Parda (*Schiffornis turdina*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Shifornis Ala Parda, Brown-winged Schiffornis,
Thrush-like Schiffornis

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriforme


La espalda es de color castaño
oliváceo, con las alas y cola más
brillantes y de tono más rojizo

El pico es negruzco con la
base de la gris más claro

La garganta y el pecho
son de color oliva brillante,
a menudo con un tinte
marrón amarillento. A
veces la garganta es
más pálida por debajo
y la parte inferior entre
oliva grisáceo y café oliva
opaco

Las patas son
gris plumizo

Mide entre
14,5 y 15 cm
de longitud

**Distribución continental:**

Colombia, Venezuela,
Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil.

Distribución Nacional: Beni,
Cochabamba, La Paz, Pando
y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:
En toda el área.

Ecorregiones: Amazonia,
Chiquitania, Valles Secos
Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

📍 **Hábitat y Biología:** Poco común a bastante común en bosque amazónico de tierra firme y transicional, bosque semi a hiper húmedo del piedemonte, Yungas inferior y Chiquitania norte; también en bosque de várzea. Solitario; no se une a bandadas mixtas. Busca su alimento a 1-3 m del suelo; canta en el sotobosque superior. Fácilmente pasado por alto cuando no vocaliza.

📍 **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Apparently las poblaciones no se ven realmente afectadas por las actividades humanas, sin embargo, se necesitan estudios actuales en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/schiffornis-turdina/>.


- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Snow, D. and G. M. Kirwan (2020). Brown-winged Schiffornis (*Schiffornis turdina*), version 1.0. In Birds of the World [J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors]. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.thlsch3.01>.

Plañidero Cinéreo (*Laniocera hypopyrra*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Plañidero Cinéreo, Cinereous Mourner



Distribución continental:

Guayana Francesa, Surinam, Guyana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN LC:** Preocupación menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❶ **Hábitat y Biología:** Raro a localmente bastante común en bosque alto de tierra firme e igapó de la Amazonía, del piedemonte andino húmedo y Chiquitania norte semihúmeda; localmente también en bosque de várzea. Solitario en el estrato medio, ocasionalmente más alto o bajo; rara vez se une a bandadas mixtas. Fácilmente pasado por alto; posa quieto y silencioso por períodos largos. Se alimenta de artrópodos del follaje y frutos mediante vuelos cortos.

❷ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Apparently the populations do not seem to be really affected by human activities, but studies are needed in this aspect.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/laniocera-hypopyrra/>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Walther, B. (2020). Cinereous Mourner (*Laniocera hypopyrra*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.cinmou1.01>.


Cabezón Ala Blanca (*Pachyramphus polychopterus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Cabezón Ala Blanca, White-winged Becard

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriforme



Distribución continental: México, Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, Colombia, Venezuela, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Ecuador, Perú, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Brasil.

Distribución Nacional: Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En casi toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Boliviano-Tucumano, Chaco, Chiquitania, Chaco Serrano, Sabanas Inundables, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Poco común a localmente común en bosque ribereño, vegetación secundaria, bordes de bosque de tierra firme y estacionalmente inundado de la Amazonía y piedemonte húmedo. La subespecie (*spixii*) migrante austral es rara a poco común de primavera a otoño en bosque y arbustales secos a semihúmedos y plantaciones de la mayor parte de Santa Cruz y ladera este inferior del sur de los Andes; pasa el invierno en el norte de Bolivia. Solitario o en parejas desde el estrato medio superior hasta el dosel, ocasionalmente en bandadas mixtas.

Amenazas generales en toda su área de distribución: A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Apparently las poblaciones no se ven realmente afectadas por las actividades humanas, sin embargo, se necesitan estudios actuales en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/pachyramphus-polychopterus/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Mobley, J. A. (2020). White-winged Becard (*Pachyramphus polychopterus*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.whwbec1.01>.

Mosquerito Cola Rojiza (*Terenotriccus erythrurus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Mosquerito Cola Rojiza, Ruddy-tailed Flycatcher



Distribución continental:

México, Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Guyana, Guayana francesa, Surinam, Brasil, Ecuador, Perú y Bolivia.

Distribución Nacional:

Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

Chirisi.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Poco común a bastante común, pero a menudo pasado por alto en bosque primario y secundario amazónico de tierra firme, várzea y transicional, bosque húmedo del piedemonte y Yungas inferiores. Solitario en el sotobosque y estrato medio inferior; rara vez en bandadas mixtas. Discreto; permanece inmóvil por períodos largos, a menudo levanta las alas rápida y abruptamente. Se alimenta de artrópodos mediante vuelos cortos hacia la vegetación y al aire. Bastante silencioso.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Aparentemente las poblaciones no se ven realmente afectadas por las actividades humanas, sin embargo, se necesitan estudios actuales en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

• Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolombia.com/>.

• Farnsworth, A. and D. J. Lebbin (2024). Ruddy-tailed Flycatcher (*Terenotriccus erythrurus*), version 1.1. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.rutfly2.01.1>.

• Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., Maccormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/terenotriccus-erythrurus/>.

• IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.


Piprites Ala Bandeado (*Piprites chloris*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Piprites Ala Bandeado y Wing-barred Piprites

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes

**Distribución continental:**

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Pando.

Distribución en Loma Santa: Casi toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania, Valle y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Bosque amazónico de tierra firme, várzea, igapó y transicional, bosque semi a hiperhúmedo del piedemonte, Yungas inferior y Chiquitania norte. No se conoce datos de su biología reproductiva.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No está globalmente amenazada. De poco común a bastante común en gran parte de su área de distribución.

Ilustración: Carl Christian Tölfe • Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/piprites>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEP-WCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.
- Snow, D. and E. de Juana (2020). Wing-barred Piprites (*Piprites chloris*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.wibip1.01>.

Picochato corona dorada (*Platyrinchus coronatus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Picochato corona dorada y Golden-crowned Spadebill


Por encima es color oliva-marrón, y por debajo de un amarillo apagado, manchado de oliva en el pecho y en los flancos, y con la garganta blanca

El píleo es rojizo con una banda central amarilla

El pico, muy ancho y plano, es negro por arriba y blanquecino por debajo

El rostro es blanco con dos listas negras que parten del ojo, una postocular y la otra malar

Mide entre 7 a 8 cm de longitud



Distribución continental:

Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Surinam y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, La Paz y Pando.

Distribución en Loma Santa: Pto. Gerardo, Pto. Vichí ricansi y Chirisi.

Ecorregiones: Amazonia.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

203

Hábitat y Biología: Sotobosque oscuro de bosque húmedo (tierra firme como várzea) y alto secundario adyacente, en tierras bajas y pies de monte. Nido en forma de copa construido con de fibras vegetales, escamas de helechos arborescentes y rizomorfos fúngicos, unida por telaraña, la hembra coloca 2 huevos.

Amenazas generales en toda su área de distribución: No está globalmente amenazada. De poco común a bastante común o localmente común, en gran parte de su área de distribución.

Ilustración: Carl Christian Tölfe • Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/flycatchers/platyrinchus-coronatus>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.
- Tello, J. and D. A. Christie (2020). Golden-crowned Spadebill (*Platyrinchus coronatus*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.gocspal.01>.

Mosquetero terrestre (*Corythopis torquatus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Mosquetero terrestre y Ringed Antpiper



Las partes superiores, incluidas las alas y la cola, de color oliva parduzco oscuro

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes

**Distribución continental:**

Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Guyana, Guayana francesa, Surinam, Venezuela y Bolivia.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania, Valle y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Bosques tropicales húmedos siempreverdes, tanto en *tierra firme* como en bosques inundados estacionalmente o bosques pantanosos, bosque semihúmedo a húmedo del piedemonte. Nido en forma de una gran cúpula en forma de horno, cubierta de musgo, de 12 cm de alto, 13 cm de largo, cámara-nido hecha con fibras vegetales finas y rizomorfos, donde coloca 2 huevos.

Amenazas generales en toda su área de distribución: No está globalmente amenazada. De poco común a bastante común, en gran parte de su área de distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/flycatchers/corythopis-torquatus>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Fitzpatrick, J. W. (2020). Ringed Antpiper (*Corythopis torquatus*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo,

A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.rinant2.01>.


- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Mosqueterito vientre ocráceo (*Mionectes oleagineus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Mosqueterito vientre ocráceo y Ochre-bellied Flycatcher



Distribución continental:

Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guayanas francesas, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Surinam y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Sotobosque de los bosques siempreverdes húmedos de tierras bajas, Yungas inferiores y Chiquitania norte. Construye un nido en forma de pera con entrada lateral, suspendido de una liana o bajo el barranco de un arroyo. La hembra pone 2 a 3 huevos.

Amenazas generales en toda su área de distribución: Tiene un área de distribución geográfica extremadamente extensa y una población muy grande. En consecuencia, su estado de conservación en la Lista Roja de la UICN se evalúa como Menor Riesgo.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/flycatchers/mionectes-oleagineus>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio

de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.
- Standish, H., E. Mayne, F. Hall, and W. Tori (2020). Ochre-bellied Flycatcher (*Mionectes oleagineus*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.ocbfly1.01>.

Papamoscas de cabeza sepia (*Leptopogon**amaurocephalus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Papamoscas de cabeza sepia y Sepia-capped Flycatcher

Corona parda; garganta, mejillas y pecho grisáceos, con matices oliváceos en el pecho y a los lados y de color ante en las mejillas

Alas y cola pardas; vientre amarillento

Presenta una medialuna auricular negra; dorso verde oliva

Mide entre 12 a 14 cm de longitud



- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes

**Distribución continental:**

Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guayana francesa, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chiquitania, Valle y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Bosques y arbustales secos a hiper húmedos de tierras bajas y ladera este inferior de los Andes; en la Amazonía principalmente en bosque de várzea, bordes de ríos y galería. Construye un nido, de forma redonda, muy elaborado con una gran masa de material vegetal, colgada de raíces de árboles caídos o en barrancos. La entrada es lateral, con una protección encima. La hembra pone 2 a 3 huevos blancos.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** La UICN, lo clasifica el estado de conservación como de "Menor Riesgo" debido a su amplia área de distribución, el gran tamaño de su población y la tendencia estable de la misma.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Goforth, J. (2020). Sepia-capped Flycatcher (*Leptopogon amaurocephalus*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.secfly1.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/flycatchers/leptopogon-amaurocephalus>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Pico ancho Azufrado (*Tolmomyias sulphureus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Pico ancho Azufrado y Yellow-olive Flycatcher



Distribución continental:

Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perú, Guayana francesa, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela.

Distribución Nacional:

Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

Toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chiquitania, Sabanas Inundadas, Valle y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN:** NT: Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Generalista de bosques de tierras bajas y ladera este inferior de los Andes. Bastante común a común en bosques y arbustales secos a semihúmedos, bosque de galería, islas de bosque en sabana. nido en forma de pera, hecha de raicillas negras y rizomorfos fúngicos, la hembra coloca de 2 a 3 huevos.

Amenazas generales en toda su área de distribución: No está globalmente amenazada (Menor Riesgo). De bastante común a abundante en la mayor parte de su área de distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía

• Caballero, I. (2020). Yellow-olive Flatbill (*Tolmomyias sulphureus*), version 1.0. In *Birds of the World* (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.yeoffl1.01>.

• Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/flycatchers/tolmomyias-sulphureus>.

• IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

• Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

• UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Tirano-Pigmeo Cola Corta (*Myiornis ecaudatus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Tirano-Pigmeo Cola Corta y Short-tailed Pygmy-Tyrant



- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes

**Distribución continental:**

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana francesa, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Bordes de bosque amazónico de tierra firme, várzea y transicional, de bosque húmedo a hiperhúmedo del piedemonte, Yungas inferiores y semihúmedo Chiquitano norte. Nido abovedado en forma de bolsa con entrada lateral, pequeño toldo que sobresale por encima del orificio de entrada, construido con musgo verde, briznas finas de hierba, hojas secas y raicillas, la hembra coloca 2 huevos.

Amenazas generales en toda su área de distribución: No está globalmente amenazada. De poco común a localmente bastante común; con frecuencia se pasa por alto. Está presente en muchos parques nacionales y otras zonas protegidas de toda su área de distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía


- Clock, B. M. (2020). Short-tailed Pygmy-Tyrant (*Myiornis ecaudatus*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.stpyr1.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/flycatchers/myiornis-ecaudatus>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025

Tirano-Todi de Zimmer (*Hemitriccus flammulatus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Tirano-Todi de Zimmer y Flammulated Pygmy-Tyrant



- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes



Distribución continental:
Bolivia, Brasil y Perú.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:
Toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

209

❶ **Hábitat y Biología:** Habita en el sotobosque denso de los bosques amazónicos de tierras bajas de densa vegetación del sotobosque del bosque secundario o en enredaderas. Construye su nido en forma de pera colgante donde la hembra coloca 2 huevos.

🌿 **Amenazas generales en toda su área de distribución:** Según la Lista Roja de la UICN lo cataloga como Menor riesgo, no se ha cuantificado el tamaño ni la tendencia de la población, pero su extensión global de su presencia se estima en 810.000 km².

Mapa: Asociación Civil Armonía

• Lebbin, D. J. (2020). Flammulated Pygmy-Tyrant (*Hemitriccus flammulatus*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.flapyt1.01>.

• Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/flycatchers/hemitriccus-flammulatus>.

• IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

• Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

• UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Tirano-Todi Vientre Blanco (*Hemitriccus griseipectus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Tirano-Todi Vientre Blanco y White-bellied Tody-Tyrant

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes

Tiene un patrón de plumaje muy sencillo, es principalmente verde oliva claro en las partes superiores y blanco grisáceo en las inferiores



Bolivia

Distribución continental: Bolivia, Brasil y Perú.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Casi toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Bosque primario y secundario, incluyendo bosque de tierra firme, bosque húmedo de pie de monte. No se conoce datos sobre su biología reproductiva (información escasa).

Amenazas generales en toda su área de distribución: El estado de conservación del tyrannido es evaluada como Menor Riesgo, debido a su extensa área de distribución geográfica y al tamaño relativamente grande de su población.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Gussoni, C. O. A., M. Crozariol, J. A. Vicente Filho, and T. S. Schulenberg (2023). White-bellied Tody-Tyrant (*Hemitriccus griseipectus*), version 2.0. In Birds of the World (F. Medrano, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.whbtoti.02>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/flycatchers/hemitriccus-griseipectus>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Espátula Frente Rojizo (*Poecilatriccus latirostris*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Espátula Frente Rojizo y Rusty-fronted Tody-Flycatcher



Distribución continental:

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma

Santa: Casi toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chiquitania, Sabanas Inundadas y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: En matorrales y bordes de bosque semihúmedos a húmedos, sotobosque de bosque de galería y ribereño (incluyendo en islas de río) en la mayor parte de las tierras bajas y ladera este inferior de los Andes. Sin información de nido y huevos.

Amenazas generales en toda su área de distribución: Tiene una amplia distribución y se cree que la tendencia de la población, aunque no se ha cuantificado, es estable. En consecuencia, el estado en la Lista Roja de la UICN se evalúa como de Menor Riesgo.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/flycatchers/poecilatriccus-latirostris>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio

de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

- Schulenberg, T. S. and G. M. Kirwan (2020). Rusty-fronted Tody-Flycatcher (*Poecilatriccus latirostris*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.ruftofl.01>.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Espatulilla Ceja Amarilla (*Todirostrum chrysocrotaphum*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Espatulilla Ceja Amarilla y Yellow-browed Tody-Flycatcher



- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes



Distribución continental:

Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Bosque amazónico de tierra firme, estacional inundado, bosque semi a hiperhúmedo del piedemonte, Yungas inferiores, y Chiquitania norte. Nido en forma de una estructura colgante, sin datos de los huevos.

🌿 **Amenazas generales en toda su área de distribución:** El estado de conservación del Espatulilla ceja amarilla está clasificado como de Menor Riesgo, por la Lista Roja de la UICN. Esta especie tiene una amplia área de distribución geográfica, aunque se cree que la población está en declive.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/flycatchers/todirostrum-chrysocrotaphum>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio

de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

- Schulenberg, T. S. and G. M. Kirwan (2020). Yellow-browed Tody-Flycatcher (*Todirostrum chrysocrotaphum*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bowbytfl1.01>.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Mosquerito silbador (*Camptostoma obsoletum*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Mosquerito silbador y Southern Beardless-Tyrannulet



Distribución continental:

Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil, Paraguay, Bolivia, Argentina y Uruguay.

Distribución Nacional:

Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

Pto. Calixto, Pto. Gerardo, Jorori, Rosario y Chirisi.

Ecorregiones:

Amazonia, Cerrado, Chiquitania, Sabanas Inundadas, Valles y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

213

❗ **Hábitat y Biología:** Variedad de hábitats de matorral, matorral espinoso árido, bosque caducifolio, bosque de galería, bordes de bosque húmedo, jardines, parques urbanos, márgenes de ríos, generalmente evita el interior del bosque húmedo, pero ocasionalmente se encuentra en el dosel de várzea y bosque pantanoso. El nido es una voluminosa estructura globular con entrada lateral, adornado con hojas, hierbas y hepáticas, ramitas, zarcillos de uvas, telarañas, donde la hembra coloca 2 huevos.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** El estado de conservación del Mosquerito silbador está clasificado como de Menor Riesgo, por la UICN. Esta especie tiene una amplia área de distribución geográfica.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/flycatchers/camptostoma-obsoletum>.
- Fitzpatrick, J. W. (2020). Southern Beardless-Tyrannulet (*Camptostoma obsoletum*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.sobtyr1.01>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.


Fiofio grande (*Elaenia spectabilis*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Fiofio grande y Large Elaenia

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes

**Distribución continental:**

Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Argentina y Uruguay.

Distribución Nacional: Beni, Chuquisaca, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.**Distribución en Loma Santa:** Toda el área de conservación.**Ecorregiones:** Amazonia, Cerrado, Chiquitania, Sabanas Inundadas y Chaco.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Principalmente bordes de hábitats boscosos en tierras bajas. Bordes de bosques, claros arbustivos, zonas ribereñas de regeneración temprana y matorrales; principalmente en árboles de crecimiento ribereño. Nido tiene forma de una copa pequeña y ordenada de 8 cm de diámetro y 4 cm de altura, forrada con fibras vegetales y plumas, exterior recubierto de líquenes y musgos, colocados a 4-6 m del suelo en la horquilla de una rama pequeña, la hembra coloca 2 huevos blancos rosáceo con manchas marrones.

Amenazas generales en toda su área de distribución: El estado de conservación del Fiofio grande, está clasificado como de Menor Riesgo, por la UICN. Esta especie tiene una amplia área de distribución geográfica.

Mapa: Asociación Civil Armonía


- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/flycatchers/elaenia-spectabilis>.
- Hosner, P. and G. M. Kirwan (2020). Large Elaenia (*Elaenia spectabilis*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.larela1.01>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Fiofío pico chico (*Elaenia parvirostris*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Fiofío pico chico y Small-billed Elaenia



Distribución continental:

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Distribución Nacional:

Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

Pto. Gerardo, Pto. Salas, Pto. Vichi'ricansi, Rosario y Chirisi.

Ecorregiones:

Amazonia, Cerrado, Chiquitania, Sabanas Inundadas, Chaco, Valle y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❶ **Hábitat y Biología:** Variedad de hábitats arbolados y forestales, especialmente bordes y claros. Se encuentra en ciudades, jardines, bosques ribereños, bosques abiertos y caducifolios, bordes de bosques húmedos, zonas abiertas con árboles dispersos. Nido tiene una forma de de copa ordenada de 6-5 cm de diámetro, 5 cm de profundidad, construida con pequeñas ramitas y fibras vegetales, todo el exterior decorado con musgos, telarañas y líquenes. Coloca de 2-3 huevos.

❷ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** El estado de conservación del Fiofío pico chico, está clasificado como de Menor Riesgo, por la UICN. Esta especie tiene una amplia área de distribución geográfica y sus poblaciones estables.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/flycatchers/elaenia-parvirostris>.
- Hosner, P. (2020). Small-billed Elaenia (*Elaenia parvirostris*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, D. A. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.smbela1.01>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Mosqueta Corona Amarilla (*Tyrannulus elatus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Mosqueta Corona Amarilla y Yellow-crowned Tyrannulet

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes

**Distribución continental:**

Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Panamá, Perú, Surinam y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Rosario.

Ecorregiones: Amazonia.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Bosques húmedos siempreverdes de tierras bajas, especialmente en el segundo crecimiento, bordes de bosques, bosques claros, claros arbustivos, jardines y parques; también en lo alto del dosel de bosques primarios. Nido en forma de una copa simple y poco profunda de 4 cm de diámetro y 1 cm de profundidad, hecha de ramitas finas, fibra vegetal y filamentos parecidos a pelos, coloca de 1 a 2 huevos.

Amenazas generales en toda su área de distribución: El estado de conservación como de Menor Riesgo. Esta especie tiene una amplia área de distribución geográfica y sus poblaciones estables.

Mapa: Asociación Civil Armonía


- Fitzpatrick, J. W. (2020). Yellow-crowned Tyrannulet (*Tyrannulus elatus*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.yectyr1.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/flycatchers/tyrannulus-elatus>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Fiofío de la Selva (*Myiopagis gaimardii*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Fiofío de la Selva y Forest Elaenia



Distribución continental:

Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Guyana, Surinam, Guayana Francesa y Trinidad y Tobago.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chiquitania, Sabanas Inundadas, Valles y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Es una especie que prefiere los estratos altos (dosel) de bosques tropicales siempreverdes de tierras bajas, bordes de bosques, bosques de galería y, en menor medida, bosques caducifolios y bosques secundarios y pequeños claros. El nido tiene una forma de una copa de hierba y musgo, decorada con líquenes, la hembra coloca 2 huevos.

Amenazas generales en toda su área de distribución: No está globalmente amenazado. Bastante común en gran parte de su área de distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía

• Fitzpatrick, J. W. (2020). Forest Elaenia (*Myiopagis gaimardii*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.forela1.01>.

• Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/flycatchers/myiopagis-gaimardii>.

• IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

• Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

• UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Fiofío verdoso (*Myiopagis viridicata*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Fiofío verdoso y Greenish Elaenia



- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes

**Distribución continental:**

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos y Venezuela.

Distribución Nacional:

Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

Toda el área de conservación.

Ecorregiones:

Amazonia, Cerrado, Chaco, Chiquitania, Sabanas Inundadas, Valles.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Se encuentra en una gran variedad de hábitats, desde regiones de bosques tropicales húmedos siempreverdes hasta bosques tropicales caducifolios y matorrales. Tiende a preferir zonas con un crecimiento más ligero, especialmente cerca de arroyos y claros, bosques de galería y matorrales altos, forrajea en todos los niveles, desde el sotobosque hasta el dosel. El nido tiene forma de copa poco profunda y está compuesto por raicillas, ramitas, zarcillos y seda de araña, la hembra pone 2 huevos blancos con motas de color violeta pálido.

Amenazas generales en toda su área de distribución: No está globalmente amenazado. Bastante común en gran parte de su área de distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/flycatchers/myiopagis-viridicata>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio

de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

- Porter, O., N. L. Block, and P. F. D. Boesman (2021). Greenish Elaenia (*Myiopagis viridicata*), version 2.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, S. M. Billerman, and B. K. Keeney, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.greela.02>.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Mosqueta Pata Delgada (*Zimmerius gracilipes*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Mosqueta Pata Delgada y Slender-footed Tyrannulet



- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes



Distribución continental:

Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Rosario de Tacuaral.

Ecorregiones: Amazonia y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

219

❗ **Hábitat y Biología:** Bosque amazónico de tierra firme, várzea, transicional, bosque húmedo del piedemonte y Yungas inferiores. Construye su nido pendular en forma de bolsa con entrada lateral, la hembra coloca 2 huevos de color rosado pálido con marcas pardo rojizas y grises.

🛡️ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No está globalmente amenazado. Con una extensa área de distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Fitzpatrick, J. W., D. A. Christie, and G. M. Kirwan (2020). Slender-footed Tyrannulet (*Zimmerius gracilipes*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.slttyr1.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., Maccormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/flycatchers/zimmerius-gracilipes>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.


Mosqueta cejas blancas (*Ornithion inerme*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Mosqueta cejas blancas y White-lored Tyrannulet

Oliva con una corona gris y una prominente línea blanca que se extiende desde la frente y los lores hasta más allá de los ojos



- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes

**Distribución continental:**

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

Casi en toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania y Yungas.

220

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Ocupa el dosel de los bosques tropicales siempreverdes de tierras bajas, tal vez especialmente en los bordes de los bosques, en Bolivia, bosque amazónico de tierra firme, várzea, transicional, bosque húmedo del piedemonte, Yungas inferior y semihúmedo chiquitano norte, no se conoce datos del nido y huevo de esta especie.

Amenazas generales en toda su área de distribución: Presenta una gran área de distribución. El estado de esta especie en la Lista Roja de la UICN está clasificado como de Menor Riesgo.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/flycatchers/ornithion-enerme>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio

de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

- Schulenberg, T. S. and H. Batcheller (2020). White-lored Tyrannulet (*Ornithion inerme*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.whltyr1.01>.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Atila Ojo Blanco (*Attila bolivianus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Atila Ojo Blanco y White-eyed Attila



Distribución continental:

Bolivia, Brasil, Colombia y Perú.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

Rosario de Tacuaral.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania, Sabanas Inundadas y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Bosque de várzea, igapó, transicional, de galería, bordes de ríos y riachuelos e islas de bosque de palmera en la Amazonía, piedemonte andino húmedo, Llanos de Moxos y Chiquitania norte. Nido en forma de una taza musgosa de color oxidado hecha de raicillas, musgo y fibras vegetales, la hembra pone 2 huevos.

Amenazas generales en toda su área de distribución: No está globalmente amenazada. De poco común a bastante común. Dado que gran parte de su hábitat dentro de su área de distribución relativamente extensa permanece más o menos inalterada.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/flycatchers/attila-bolivianus>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio

de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.
- Walther, B. (2020). Dull-capped Attila (*Attila bolivianus*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.ducatt1.01>.

Atila Polimorfo (*Attila spadiceus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Atila Polimorfo y Bright-rumped Attila

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes

**Distribución continental:**

México, pasando por Centro América, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia y Brasil.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.**Distribución en Loma Santa:** Toda el área de conservación.**Ecorregiones:** Amazonia, Chiquitania y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Bordes de bosque amazónico de tierra firme y transicional, bosque húmedo del piedemonte y Yungas inferior y semihúmedo, Chiquitano Norte. Solitario o en parejas principalmente en el sotobosque superior y estrato medio. Nido, construido por la hembra, en forma de una copa abierta, poco profunda y voluminosa, hecha de musgo, pequeños palos muertos, hojas finas y raicillas, donde la hembra pone de 2-4 huevos de color naranja manchados y moteados.

Amenazas generales en toda su área de distribución: No está globalmente amenazada. De poco común a localmente bastante común. Tiene un área de distribución relativamente amplia.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/flycatchers/attila-spadiceus>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio

de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEP-WCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.
- Walther, B. (2020). Bright-rumped Attila (*Attila spadiceus*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.brratt1.01>.

Mosquero Pirata (*Legatus leucophaeus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Mosquero Pirata y Piratic Flycatcher



Distribución continental:

México, Centro América, Colombia, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guyana, Surinam, Guayana francesa, Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay y Argentina.

Distribución Nacional:

Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

Toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Sabanas Inundadas, Chiquitania, Valle y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

223

Hábitat y Biología: Bosques altos de segundo crecimiento y de galería, bosques húmedos más claros y bordes de bosques siempreverdes, bordes de bosques secundarios. Es una especie que no construye nido sino usurpa de otras especies, donde la hembra coloca de 2-3 huevos, a veces 4, de color blanco rosado con manchas castañas y grises.

Amenazas generales en toda su área de distribución: No está globalmente amenazada (Menor Riesgo). De poco común a bastante común. Tiene una amplia área de distribución que abarca la mayor parte de América Central y la mayor parte del norte y el centro de Sudamérica.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/flycatchers/legatus-leucophaeus>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio

de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

- Mobley, J. A. and G. M. Kirwan (2020). Piratic Flycatcher (*Legatus leucophaeus*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.pirfly1.01>.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEP-WCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.


Picoplano Cola Rufa (*Ramphotrigon ruficauda*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Picoplano Cola Rufa y Rufous-tailed Flatbill

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes



224

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Se encuentra en bosques húmedos de tierras bajas siempreverdes. Suele alimentarse en el estrato medio del bosque de tierra firme. Prefiere sitios con sotobosque abierto. En Bolivia, poco común a bastante común en bosque amazónico de tierra firme y pie de monte andino húmedo. El nido está hecho de un material sedoso parecido al algodocillo, estructura de ramitas delgadas, de unos pocos cm de longitud. Los huevos son de color crema, con manchas carmesí.

Amenazas generales en toda su área de distribución: Tiene una amplia distribución geográfica y se cree que la tendencia de la población, aunque no se ha cuantificado, es estable. En consecuencia, el estado de esta especie en la Lista Roja de la IUCN se evalúa como Menor Riesgo.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/flycatchers/ramphotrigon-ruficauda>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio

de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

- Schulenberg, T. S. and T. Johnson (2020). Rufous-tailed Flatbill (*Ramphotrigon ruficauda*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.rutfla.01>.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025

Bienteveo (*Pitangus sulphuratus*)

Nombre T'simane: Tétýí

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Bienteveo y Great Kiskadee



Distribución continental:

Estados Unidos (Texas), México, toda América Central y toda América del Sur.

Distribución Nacional:

Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando, Tarija, Potosí y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

Toda el área de conservación.

Ecorregiones:

Amazonia, Cerrado, Chiquitania, Valle, Yungas, Sabanas Inundadas y Puna.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

225

- ❶ **Hábitat y Biología:** Una variedad de hábitats abiertos y semiabiertos secos a hiperhúmedos de tierras bajas y ladera este de los Andes, desde bordes de bosque hasta pantanos, pastizales, ciudades, zonas agrícolas. Nidos construidos principalmente de hierba, pero también pueden incorporar ramitas finas, zarcillos leñosos y algodón, donde la hembra coloca 2 a 4 huevos blanco cremoso pálido a amarillo marfil, escasamente marcado con manchas marrones.

- ❷ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No está globalmente amenazada. Común a muy común. Población mundial estimada en unos 20.000.000 de individuos. Aparentemente ha aumentado tanto en área de distribución como en abundancia como resultado de la apertura de bosques.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Brush, T. and J. W. Fitzpatrick (2020). Great Kiskadee (*Pitangus sulphuratus*), version 1.0. In Birds of the World (A. F. Poole and F. B. Gill, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.greki.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/flycatchers/pitangus-sulphuratus>.


- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEP-WCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025

Bienteveo Chico (*Philohydor lictor*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Bienteveo Chico y Lesser Kiskadee



- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes

**Distribución continental:**

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana francesa, Guyana, Panamá, Perú, Surinam y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma

Santa: Casi toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chiquitania, Sabanas Inundadas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Vegetación arbustiva, árboles bajos, troncos y tocones cerca de aguas abiertas o pantanosas, pastizales arbustivos, especialmente a lo largo de los márgenes de lagos, estanques, ríos de corriente lenta. El nido es una estructura abierta en forma de platillo o taza compuesta de pequeñas ramitas y hierbas, forrado de materiales más finos como raicillas, hojas y hierba, la hembra coloca de 2 a 3 huevos.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No está globalmente amenazada. Presenta una gran área de distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/flycatchers/pitangus-lictor>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia.

Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

- Mobley, J. A. (2022). Lesser Kiskadee (*Philohydor lictor*), version 1.1. In Birds of the World (S. M. Billerman and N. D. Sly, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.leskis1.011>.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Mosquero Picudo (*Megarynchus pitangua*)

Nombre T'simane: Eyeyé

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Mosquero Picudo y Boat-billed Flycatcher



Distribución continental: México, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guyana, Surinam, Guayana francesa, Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Casi toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chaco, Chiquitania, Sabanas Inundadas, Valles y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN:** NT: Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

227

Hábitat y Biología: Bordes de una variedad de bosques secos a hiperhúmedos de tierras bajas y ladera este inferior de los Andes, incluyendo fragmentos e islas de bosque; en la Amazonía principalmente a las orillas de ríos y lagunas. El nido tiene forma de una copa más o menos redonda poco profunda, compuesta de diversos materiales, como ramitas, hojas, hierba, lianas secas, raíces, rizomas de epífitas. La hembra coloca de 2 a 3 huevos.

Amenazas generales en toda su área de distribución: No está globalmente amenazada. De poco común a común. Con una amplia área de distribución, se encuentra en una gran variedad de hábitats boscosos y muestra tolerancia a los hábitats degradados.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/flycatchers/megarynchus-pitangua>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio

de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

- Mobley, J. A. (2020). Boat-billed Flycatcher (*Megarynchus pitangua*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.bobfly1.01>.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.


Mosquero Viente Azufrado (*Myiodynastes luteiventris*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Mosquero Viente Azufrado y Sulphur-bellied Flycatcher

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes



Distribución continental:

Estados Unidos, México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Pto. Vichi'ricansi y Rosario de Tacuaral.

Ecorregiones: Amazonia y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Bosque semi a hiper húmedo de los Yungas inferiores, piedemonte y bosque amazónico de tierra firme, várzea y ribereño; escaso e irregular en las tierras baja, principalmente en bordes de bosque y lo largo de ríos y riachuelos. El nido en forma de copa construido con pecíolos y palos finos. La hembra coloca de 3 a 4 huevos de color blanco moteado intenso y manchas de rojo.

Amenazas generales en toda su área de distribución: No está globalmente amenazada. De poco común a común. Con una amplia área de distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/flycatchers/myiodynastes-luteiventris>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Lowther, P. E. and D. F. Stotz (2020). Sulphur-bellied Flycatcher (*Myiodynastes luteiventris*), version 1.0. In

Birds of the World (A. F. Poole and F. B. Gill, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.subfly.01>.

- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Mosquero Rayado (*Myiodynastes maculatus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Mosquero Rayado y Streaked Flycatcher



Distribución continental: México, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guyana, Surinam, Guayana francesa, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Casi toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chiquitania, Chaco, Sabanas Inundadas, Valles y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

229

Hábitat y Biología: En toda su área de distribución y en todas las estaciones, ocupa bosques siempreverdes y bosques de várzea, bordes de bosque, claros con árboles altos dispersos. El nido es una estructura redondeada, con una taza utilizando peciños secos, raquis de hojas compuestas, raicillas y tallos de flores, la hembra coloca de 2 a 3 huevos, blanco o blanco cremoso con manchas de color marrón rojizo.

Amenazas generales en toda su área de distribución: No está globalmente amenazada. De poco común a común. Con una amplia área de distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/flycatchers/myiodynastes-maculatus>.
- Kirwan, G. M., S. S. Shah, and K. V. C. Barbosa (2022). Streaked Flycatcher (*Myiodynastes maculatus*), version 2.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg and B. K. Keeney, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.strfly1.02>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEP-WCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Mosquero Ala Rufa (*Myiozetetes cayanensis*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Mosquero Ala Rufa y Rusty-margined Flycatcher

• **Clase:** Aves

• **Orden:** Passeriformes



Distribución continental:

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, la Guayana francesa, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chiquitania y Sabanas Inundadas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Zonas arbustivas y claros, áreas semiabiertas, cultivos, otros hábitats perturbados que conservan algunos árboles, también bordes de bosques y bosques de galería; también a lo largo de cochas y bordes de ríos en la Amazonia, más a menudo cerca de agua. Nido en forma de cúpula con entrada lateral, hecho de hierba seca y pequeñas ramitas, la hembra coloca de 2 a 3 huevos, de color blanco teñido de amarillo rosado con marcas castañas.

Amenazas generales en toda su área de distribución: No está globalmente amenazada. De bastante común a común.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/flycatchers/myiozetetes-cayanensis>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- Moberly, J. A. and G. M. Kirwan (2020). Rusty-margined Flycatcher (*Myiozetetes cayanensis*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.rumfly1.01>.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Mosquero Social (*Myiozetetes similis*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Mosquero Social y Social Flycatcher



Distribución continental:

México, Centro América, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Valle y Sabanas Inundadas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

231

❶ **Hábitat y Biología:** Zonas bajas de húmedas a semihúmedas y semiáridas con arbustos y árboles dispersos, claros arbustivos, vegetación secundaria, copas y bordes de bosques, de lagos y ríos, pastizales, especialmente numerosa cerca del agua. Nido voluminoso construido por la hembra, abovedado y con entrada lateral, hecho de hierba seca, paja, tallos de malas hierbas, pequeñas ramitas y, a menudo, trozos de algodón y papel, la hembra coloca de 2 a 4 huevos.

❷ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No está globalmente amenazada. De común a muy común en la mayor parte de su área de distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/flycatchers/myiozetetes-similis>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio

de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

- Mobley, J. A. (2020). Social Flycatcher (*Myiozetetes similis*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.socfly1.01>.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Mosquero Variegado (*Empidonomus varius*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Mosquero Variegado y Variegated Flycatcher.

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes

**Distribución continental:**

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana francesa, Guayana, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Pto. Salas.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chiquitania, Valle, Sabanas Inundadas y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Bordes de bosque primario, bosque secundario, bosque de galería, sabana abierta con arbustos y árboles dispersos, claros de bosque considerables. También puede darse en pequeñas cantidades en el dosel de bosque de tierra firme. Nido generalmente como una esfera aplanada, compuesta principalmente de ramitas más pequeñas y tallos de hojas, forrado de raicillas y nervaduras de hojas, la hembra coloca de 2 a 3 huevos blanco-amarillentos con marcas marrones y grises.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No está globalmente amenazada (Menor Riesgo). De poco común a bastante común.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/flycatchers/empidonomus-varius>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- Moberly, J. A. and G. M. Kirwan (2020). Variegated Flycatcher (*Empidonomus varius*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.varfly.01>.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Frio (*Tyrannus melancholicus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Frio y Tropical Kingbird



Distribución continental: Estados Unidos, México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guyana, Guayana francesa, Surinam, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando, Potosí, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chiquitania, Valle, Sabanas Inundadas y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** Austral

233

Hábitat y Biología: Gran variedad de hábitats, a menudo cerca del agua. Muy extendido por las tierras bajas, principalmente en matorrales abiertos y semiáridos con árboles dispersos, como el cerrado, nido poco elaborado donde utiliza una gran variedad de materiales como enredaderas herbáceas muertas, raicillas y tallos radicales, zarcillos, ramitas leñosas finas, tallos de malas hierbas y hierbas secas, la hembra pone de 2 a 4 huevos blanquecino brillante, beige pálido o rosa pálido.

Amenazas generales en toda su área de distribución: No está globalmente amenazada (Menor Riesgo). Muy común. Población mundial estimada en 200.000.000 de individuos. Tiene un área de distribución extremadamente extensa.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/flycatchers/tyrannus-melancholicus>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio

de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

- Stouffer, P. C., R. T. Chesser, and A. E. Jahn (2024). Tropical Kingbird (*Tyrannus melancholicus*), version 1.1. In Birds of the World (S. M. Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.trokin.011>.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.


Tijereta (*Tyrannus savana*)

Nombre T'simane: Ve'jguirí

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Tijereta y Fork-tailed Flycatcher

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes

**Distribución continental:**

Estados Unidos, México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guyana, Guayana francesa, Surinam, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Pto. Salas y Chirisi.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chiquitania, Valle y Sabanas Inundadas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** Boreal

Hábitat y Biología: Ocupa diversos hábitats abiertos, como el borde del bosque, la vegetación secundaria, la sabana y los pastizales. Nido poco elaborado donde utiliza una gran variedad de materiales como enredaderas herbáceas muertas, raicillas y tallos radiculares, zarcillos, ramitas leñosas finas, tallos de malas hierbas y hierbas secas, la hembra pone de 2 a 3 huevos blanquecinos con manchas café.

Amenazas generales en toda su área de distribución: Catalogada por la IUCN como Menor Riesgo, con una tendencia poblacional estable.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/flycatchers/tyrannus-savana>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Jahn, A. E. and D. T. Tuero (2020). Fork-tailed Flycatcher (*Tyrannus savana*), version 1.0. In Birds of the World

(T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.fotfly.01>.

- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Pecho Blanco (*Tyrannus tyrannus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Pecho Blanco y Eastern Kingbird



- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes



Distribución continental:

Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

Jorori, Pto. Salas, Rosario y Chirisi.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chiquitania, Chaco y Sabanas Inundadas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** Boreal

235

❗ **Hábitat y Biología:** Hábitats abiertos y semiabiertos de tierras bajas y piedemonte andino. Al ser una especie migratoria no reproduce en el país. El nido es de forma redonda, construido de ramas y hierbas, donde la hembra coloca de 1 a 2 huevos blancuzcos.

🌿 **Amenazas generales en toda su área de distribución:** Catalogada por la IUCN como Menor Riesgo, con una tendencia poblacional estable.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/flycatchers/tyrannus-tyrannus>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio

de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

- Murphy, M. T. and P. Pyle (2020). Eastern Kingbird (*Tyrannus tyrannus*), version 1.0. In Birds of the World (P. G. Rodewald, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.easkin.01>.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Plañidero Grisáceo (*Rhytipterna simplex*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Plañidero Grisáceo y Grayish Mourner

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes

**Distribución continental:**

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, la Guayana francesa, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Habita estratos medios y superiores de bosques húmedos de tierra firme, ocasionalmente en bosques de transición, bosque semihúmedo a húmedo del piedemonte, Yungas inferiores y Chiquitania norte. No se conoce información sobre su condición reproductiva.

Amenazas generales en toda su área de distribución: No está globalmente amenazada. De poco común a localmente bastante común. Dado que gran parte de su hábitat permanece en condiciones relativamente prístinas dentro de su extensa área de distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/flycatchers/rhytipterna-simplex>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio

de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

- Scholes, E. (2020). Grayish Mourner (*Rhytipterna simplex*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.gramoul.01>.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Suiriri castaño (*Casiornis rufus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Suiriri castaño y Rufous Casiornis



Distribución continental:

Bolivia, Brasil, Perú, Argentina y Paraguay.

Distribución Nacional:

Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

Pto. Vichiricansi.

Ecorregiones:

Amazonia, Cerrado, Chiquitania, Sabanas Inundadas y Valles.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** Austral

237

❶ **Hábitat y Biología:** Bosques caducifolios y de galería, cerrado más arbolado, bosque chaqueño y matorral; también bosques ribereños y matorrales, no se conoce muchos datos sobre su biología reproductiva.

❷ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No está globalmente amenazada (Menor Riesgo), bastante común en gran parte del hábitat preferido.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/flycatchers/casiornis-rufus>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio

de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

- Scholes, E. (2020). Rufous Casiornis (*Casiornis rufus*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.rufcas2.01>.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Suirirí Lomo Blanco (*Sirystes albocinereus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Suirirí Lomo Blanco y White-rumped Sirystes

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes

**Distribución continental:**

Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.**Distribución en Loma****Santa:** Pto. Gerardo y Pto. Vichiricansi.**Ecorregiones:** Amazonia, Cerrado y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: En bosque amazónico de várzea, transicional y ocasionalmente de tierra firme, donde se posa en el dosel y bordes de bosque húmedo, incluyendo bosque seco y semicaducifolio. No se conoce mucho de su biología reproductiva.

Amenazas generales en toda su área de distribución: No está globalmente amenazada (Menor Riesgo), gran parte del hábitat preferido donde habita la especie permanece en condiciones relativamente prístinas.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- del Hoyo, J., N. Collar, and G. M. Kirwan (2020). White-rumped Sirystes (*Sirystes albocinereus*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.whrsir1.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía <https://birdsofbolivia.org/es/fichas-tecnicas/flycatchers/sirystes-albocinereus>.

sirystes-albocinereus.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Copetón Cresta Oscura (*Myiarchus tuberculifer*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Copetón Cresta Oscura y Dusky-capped Flycatcher.



Distribución continental:

Estados Unidos, México, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Argentina.

Distribución Nacional:

Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma

Santa: Casi toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chiquitania, Sabanas Inundadas, Valles y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

239

Hábitat y Biología: Gran variedad de hábitats a lo largo de su extensa área de distribución geográfica, bosques semi a hiperhúmedos de la ladera este de los Andes, tierras bajas del norte, en la Amazonía principalmente en bosque ribereños y secundario. Nido construido en cavidades de troncos donde utiliza una gran variedad de materiales como paja, hierbas, tallos, hojas muertas, tiras de corteza, algodón, trapos, pelo de vaca, pieles de serpiente y plumas, donde la hembra coloca de 2 a 3 huevos blanquecinos.

Amenazas generales en toda su área de distribución: No está globalmente amenazada (Menor Riesgo), con una gran área de distribución, se estima que sus poblaciones son estables.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/flycatchers/myiarchus-tuberculifer>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio

de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

- Tweit, R. C. and J. C. Tweit (2020). Dusky-capped Flycatcher (*Myiarchus tuberculifer*), version 1.0. In Birds of the World (A. F. Poole and F. B. Gill, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.ducfly.01>.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.


Copetón de Swainson (*Myiarchus swainsoni*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Copetón de Swainson y Swainson's Flycatcher

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes

**Distribución continental:**

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana francesa, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

Distribución Nacional:

Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

Pto. Gerardo, Pto. Vichiricansi, Rosario y Chirisi.

Ecorregiones:

Amazonia, Cerrado, Chaco, Chiquitania, Sabanas Inundadas, Valles y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** Austral

Hábitat y Biología: Variedad de hábitats, pero principalmente claros, zonas boscosas (especialmente cerrado, sabanas), matorrales ligeros, vegetación ribereña, claros en bosque tropical, bosque subtropical, en valles secos ligeramente arbolados y bosque Chaqueño. Nido construido en cavidades de troncos donde utiliza como paja, hierbas, tallos, hojas muertas y plumas, donde la hembra coloca de 3 a 4 huevos blancos.

Amenazas generales en toda su área de distribución: No está globalmente amenazada (Menor Riesgo). De bastante común a común. Presente en al menos doce parques nacionales y muchas otras zonas protegidas a lo largo de su amplísima área de distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/flycatchers/myiarchus-swainsoni>.
- Joseph, L. (2020). Swainson's Flycatcher (*Myiarchus swainsoni*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.swafly1.01>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Copetón cresta parda (*Myiarchus tyrannulus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Copetón cresta parda y Brown-crested Flycatcher



Distribución continental:

Estados Unidos, México, Panamá, Honduras, Costa Rica, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Guayana francesa, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chaco, Chiquitania, Sabanas Inundadas, Valles y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** Austral

❗ **Hábitat y Biología:** Variedad de hábitats, zonas boscosas, matorrales ligeros, vegetación ribereña, claros en bosque tropical, bosque subtropical, en valles secos ligeramente arbolados y bosque Chaqueño. Nido construido en cavidades de troncos donde utiliza como paja, hierbas, tallos, hojas muertas, piel de serpiente y plumas, donde la hembra coloca de 3 a 4 huevos de beige cremoso a blanco crema.

🛡️ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No está globalmente amenazada (Menor Riesgo). De bastante común a común. A lo largo de su amplísima área de distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Cardiff, S. W. and D. L. Dittmann (2020). Brown-crested Flycatcher (*Myiarchus tyrannulus*), version 1.0. In Birds of the World (A. F. Poole and F. B. Gill, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.bncfy.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/flycatchers/myiarchus-tyrannulus>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEP-WCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Mosquerito Pecho Rayado (*Myiophobus fasciatus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Mosquerito Pecho Rayado y Bran-colored
Flycatcher

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes



Bolivia

Distribución continental: Costa Rica, Panamá, Venezuela, Guyana, Guayana francesa, Surinam, Trinidad y Tobago, Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Casi toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chaco, Chiquitania, Sabanas Inundadas, Valles y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** Austral

❗ **Hábitat y Biología:** En general, la especie se encuentra en los estratos bajos a medios del bosque seco, el borde del bosque, la sabana arbustiva, los setos y pastizales, y los matorrales ribereños en las zonas áridas, así como en la vegetación sucesional a lo largo de los ríos. El nido es una copa profunda y bien construida, generalmente hecha por la hembra con hierba seca, tallos delgados, enredaderas, raicillas, con algo de musgo verde en el exterior y unidos por telarañas, la hembra coloca 2 huevos de color ocre, crema o blanco rosáceo.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No está globalmente amenazada (Menor Riesgo). Bastante común a común en gran parte de su área de distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., Maccormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/flycatchers/myiophobus-fasciatus>.
- Kirwan, G. M., A. Farnsworth, J. del Hoyo, D. J. Lebbin, N. Collar, and P. F. D. Boesman (2022). Bran-colored Flycatcher (*Myiophobus fasciatus*), version 2.1. In Birds of the World (S. M. Billerman and N. D. Sly, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.brcfly1.02.1>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.


Hijo del Sol (*Pyrocephalus rubinus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Hijo del Sol y Vermilion Flycatcher

El macho tiene copete rojo carmesí brillante, antifaz negro, garganta roja, abdomen y pecho rojo, dorso gris, alas negras, cola negra y pico negro



Mide entre
12 a 13 cm

La hembra y los ejemplares jóvenes son de un color gris ceniza con pintas blancas por todo el cuerpo excepto por la parte del abdomen que es de un color anaranjado, también poseen el pico de color negro

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes



Distribución continental: Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Aruba, Venezuela, Guyana, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Piñal, Pto. Gerardo, Jorori y Rosario.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chaco, Chiquitania, Sabanas Inundadas, Valles y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** Austral

243

❗ **Hábitat y Biología:** En general, la especie tiene una gran variedad de hábitat desde áreas abiertas y semiabiertas de tierras bajas y los Andes, incluyendo matorrales y bordes de bosques semiabiertas de tierras bajas y bordes de bosques secos a hiperhúmedos, cerrado, pastizales, sabana, parques y jardines. El nido tiene una forma de taza poco profunda, algo frágil y de construcción suelta, de pequeñas ramitas, hierbas, raicillas, gramíneas, fibras y capullos vacíos; forrada de plumón, plumas y pelo, donde la hembra coloca de 2 a 3 huevos de color blanco puro a crema.

🌐 **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No está globalmente amenazada (Menor Riesgo). Bastante común a común en gran parte de su área de distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Ellison, K. S., B. O. Wolf, and S. L. Jones (2021). Vermilion Flycatcher (*Pyrocephalus rubinus*), version 1.1. In Birds of the World (A. F. Poole, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.verfly.01.1>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/flycatchers/pyrocephalus-rubinus>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Tirano Ribereño (*Ochthornis littoralis*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Tirano Ribereño y Drab Water Tyrant

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes



Distribución continental:
Colombia, Venezuela,
Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil.

Distribución Nacional: Beni,
Cochabamba, La Paz, Pando
y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:
Jorori, Pto. Vichí ricansi, Pto.
Salas y Chirisi.

Ecorregiones: Amazonia y
Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: A lo largo ríos de la Amazonía y márgenes, especialmente cerca de orillas escarpadas, raíces expuestas o montones de escombros; invariablemente se encuentra cerca del agua, especialmente de grandes ríos. Nido una copa abierta de hierba, raicillas y barro, situada a 3 m por encima del borde del río, a menudo en una saliente de barro duro bajo un tronco. La hembra coloca de 3 a 4 huevos.

Amenazas generales en toda su área de distribución: No está globalmente amenazada. De bastante común a común, pero a veces poco extendido a lo largo de los ríos.

Mapa: Asociación Civil Armonía


- Farnsworth, A. and G. Langham (2020). Drab Water Tyrant (*Ochthornis littoralis*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.drwtyr1.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/flycatchers/ochthornis-littoralis>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Mosquerito de Euler (*Lathrotriccus euleri*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Mosquerito de Euler y Euler's Flycatcher



Distribución continental:

Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina.

Distribución Nacional:

Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

Toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chaco, Chiquitania, Sabanas Inundadas, Valles y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** Austral

245

Hábitat y Biología: Niveles más bajos de bosques húmedos y mojados, crecimiento secundario y bordes abiertos de bosques; a veces en matorrales. En Bolivia, poco común en bordes de una amplia variedad de bosques y arbustales primarios y secundarios secos a lo largo de las tierras bajas y ladera este de los Andes. El nido es una copa forrada de fibras negras suaves, la hembra coloca de 2 a 3 huevos.

Amenazas generales en toda su área de distribución: No está globalmente amenazada. De poco común a común, a lo largo de su área de distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Farnsworth, A. and D. J. Lebbin (2020). Euler's Flycatcher (*Lathrotriccus euleri*), version 1.0. In *Birds of the World* (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.eulfly1.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/flycatchers/lathrotriccus-euleri>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEP-WCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Vireón Ceja Rufa (*Cyclarhis gujanensis*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Juan Chiviró, Vireón Ceja Rufa, Rufous-browed
Peppershrike

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriforme



Distribución continental: México, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, Colombia, Venezuela, Guyana, Guayana francesa, Surinam, Brasil, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay, Argentina y Bolivia.

Distribución Nacional: Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando, Potosí, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En casi toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Boliviano-Tucumano, Cerrado, Chaco, Chaco Serrano, Chiquitania, Puna Húmeda, Sabanas Inundables, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Principalmente poco común a común en una amplia variedad de arbustales y bosques abiertos secos a húmedos, bordes de bosque con dosel cerrado, parques urbanos y jardines a lo largo de las tierras bajas y ladera este de los Andes; generalmente más abundante en regiones más secas. Solitario o en parejas en el estrato superior de la vegetación, en el dosel y subdosel del bosque; ocasionalmente en bandadas mixtas.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Apparently las poblaciones no se ven realmente afectadas por las actividades humanas, sin embargo, se necesitan estudios actuales en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Brewer, D., A. Bonan, and E. de Juana (2020). Rufous-browed Peppershrike (*Cyclarhis gujanensis*), version 1.0. In *Birds of the World* (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.rubpep1.01>.
- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolombia.com/>.

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/cyclarhis-gujanensis/>
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

Vireón Gorro Apizarrado (*Vireolanius leucotis*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Vireón Gorro Apizarrado, Slaty-capped Shrike-Vireo



Bolivia

Distribución continental:

Colombia, Venezuela, Guyana, Guayana francesa, Surinam, Brasil, Ecuador, Perú y Bolivia.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Jorori, Rosario y Chirisi.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

247

① **Hábitat y Biología:** Poco común a común en bosque amazónico de tierra firme y semi a hiperhúmedo del piedemonte y Yungas inferiores. Solitario o en parejas en el dosel, a menudo en bandadas mixtas. Escuchado mucho más que visto. Vocaliza mucho en primavera y verano; canta persistentemente de la media mañana a media tarde.

② **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Apparently las poblaciones no se ven realmente afectadas por las actividades humanas, sin embargo, se necesitan estudios actuales en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Brewer, D., J. del Hoyo, G. M. Kirwan, N. Collar, and P. F. D. Boesman (2022). Slaty-capped Shrike-Vireo (*Vireolanius leucotis*), version 1.1. In Birds of the World (B. K. Keeney, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.scsvir1.01.1>.
- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr., J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/vireolanius-leucotis/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

Verdillo Corona Leonada (*Tunchiornis ochraceiceps*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Verdillo Corona Leonada, Tawny-crowned Greenlet

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriforme



Bolivia

Distribución continental:

México, Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Guyana, Guayana francesa, Surinam, Brasil, Ecuador, Perú y Bolivia.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Pto. Gerardo y Rosario.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Poco común a bastante común en bosque húmedo a hiper húmedo de los Yungas inferiores, piedemonte y bosque amazónico de tierra firme directamente adyacente; raro a poco común en bosque de tierra firme en Pando y Beni norte. Solitario, en parejas o grupos familiares en el sotobosque, regularmente en bandadas mixtas. A menudo se alimenta de artrópodos agarrándose y colgándose de bordes de hojas grandes. Vocaliza bastante casi todo el año.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Apparently las poblaciones no se ven realmente afectadas por las actividades humanas, sin embargo, se necesitan estudios actuales en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Brewer, D., J. del Hoyo, G. M. Kirwan, and N. Collar (2020). Tawny-crowned Greenlet (*Tunchiornis ochraceiceps*), version 1.0. In Birds of the World (S. M. Billerman, B. K. Keeney, P. G. Rodewald, and T. S. Schulenberg, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.tacgre1.01>.
- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolombia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., Maccormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/tunchiornis-ochraceiceps/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

Verdillo Gorro Oscuro (*Pachysylvia hypoxantha*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Verdillo Gorro Oscuro, Dusky-capped Greenlet



Bolivia

Distribución continental:

Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú y Bolivia.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

Pto. Gerardo, Rosario y Chirisi.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

249

① **Hábitat y Biología:** Principalmente bastante común a común en bosque de tierra firme, várzea, igapó y transicional de la Amazonía norte y oeste, bosque húmedo a hiperhúmedo del piedemonte y Yungas inferiores. Solitario o en parejas espaciadas desde el estrato medio superior hasta el dosel, generalmente en bandadas mixtas. Busca su alimento activamente, moviéndose rápidamente. Vocaliza bastante todo el año; mejor detectado por voz.

② **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Aparentemente las poblaciones no se ven realmente afectadas por las actividades humanas, sin embargo, se necesitan estudios actuales en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Brewer, D. (2020). Dusky-capped Greenlet (*Pachysylvia hypoxantha*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.ducgre1.01>.
- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr, J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/pachysylvia-hypoxantha/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

Vireo Chivi (*Vireo olivaceus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Vireo Chivi, Vireo Ojo Rojo, Red-eyed Vireo, Chivi Vireo

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriforme



Bolivia

Distribución continental:

Se distribuye a lo largo del continente americano, excepto Chile.

Distribución Nacional:

Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

En toda el área.

Ecorregiones:

Amazonia, Boliviano-Tucumano, Cerrado, Chaco, Chaco Serrano, Chiquitania, Sabanas Inundables, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Una parte de su población
- **Migrante:** Boreal y Austral parcial

❗ **Hábitat y Biología:** Migrante boreal (ssp. *olivaceus*), migrante austral (ssp. *chivi*) y residente reproductiva (*chivi*); distribución compleja y poco conocido de poblaciones residentes y migratorias. Poco común a común en una amplia variedad de bosques y arbustales primarios y secundarios secos a hiperhúmedos a lo largo de las tierras bajas y ladera este de los Andes; al parecer generalmente ausente en invierno (mayo-ago.) en los Andes sureños y tierras bajas surestes secas. Solitario o en parejas en el subdosel y dosel, a menudo en bandadas mixtas. Poblaciones residentes vocalizan bastante casi todo el año.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Apparently las poblaciones no se ven realmente afectadas por las actividades humanas, sin embargo, se necesitan estudios actuales en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Cimprich, D. A., F. R. Moore, and M. P. Guilfoyle (2020). Red-eyed Vireo (*Vireo olivaceus*), version 1.0. In *Birds of the World* (P. G. Rodewald, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.reevir1.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick,

A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/vireo-olivaceus/>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Kirwan, G. M. (2020). Chivi Vireo (*Vireo chivi*), version 1.1. In *Birds of the World* (T. S. Schulenberg, B. K. Keeney, S. M. Billerman, and P. G. Rodewald, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.chivir1.011>.

Cacaré (*Cyanocorax cyanomelas*)

Nombre T'simane: Gueguec

Nombre Mojeño-trinitario: Gajo'i

Otros nombres: Cacaré, Urraca Morada, Purplish Jay



Distribución continental: Brasil, Perú, Paraguay, Argentina y Bolivia.

Distribución Nacional: Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Pto. Gerardo, Jorori, Rosario y Chirisi.

Ecorregiones: Amazonia, Boliviano-Tucumano, Cerrado, Chaco, Chaco Serrano, Chiquitania, Sabanas Inundables, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

251

❶ **Hábitat y Biología:** Principalmente bastante común a común en una amplia variedad de arbustales y bosques abiertos secos a hiperhúmedos, bordes de bosque con dosel cerrado, parques urbanos y jardines en la mayor parte de las tierras bajas y ladera este de los Andes; en la Amazonía y Yungas inferiores sólo en bosque secundario, estacionalmente inundado, ribereño y en bordes de bosque; su rango se expande con la deforestación. Principalmente en grupos familiares o bandadas pequeñas, ocasionalmente solitaria o en parejas, se lo encuentra en el estrato superior de la vegetación, ocasionalmente más abajo; generalmente no se une a bandadas mixtas. Omnívora; saquea nidos de aves.

❷ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Aparentemente las poblaciones no se ven realmente afectadas por las actividades humanas.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/cyanocorax-cyanomelas/>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Molfetto, D. (2020). Purplish Jay (*Cyanocorax cyanomelas*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.purjay1.01>.


Suso (*Cyanocorax chrysops*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Suso, Urraca Común, Plush-crested Jay

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriforme

**Distribución continental:**

Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina y Bolivia.

Distribución Nacional:

Beni, Chuquisaca, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

Rosario y Chirisi.

Ecorregiones: Amazonia, Boliviano-Tucumano, Cerrado, Chaco, Chaco Serrano, Chiquitania, Sabanas Inundables, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Poco común a común en bosque y arbustales altos secos a semihúmedos de tierras bajas surestes y ladera este de los Andes centrales y sur; y en bosque de galería, islas de bosque de várzea en los Llanos de Moxos sur; rara a poco común y local en los Llanos de Moxos norte. Principalmente en grupos familiares o bandadas pequeñas desde el estrato medio hasta el dosel; no se une a bandadas mixtas, pero a menudo asociada al Cacaré. Omnívora. Ocasionalmente también se acerca en bandadas bulliciosas a humanos o depredadores potenciales.

Amenazas generales en toda su área de distribución: A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Aparentemente las poblaciones no se ven realmente afectadas por las actividades humanas, sin embargo, se necesitan estudios actuales en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/cyanocorax-chrysops/>.


- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Reich, S. K. (2023). Plush-crested Jay (*Cyanocorax chrysops*), version 1.1. In Birds of the World (S. M. Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.plcjay1.011>.

Golondrina (*Stelgidopteryx ruficollis*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: Mochosjere

Otros nombres: Golondrina, Southern Rough-winged Swallow



- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriforme



Distribución continental:

Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana Francesa, Surinam, Guyana, Trinidad y Tobago, Brasil, Perú, Paraguay, Uruguay, Argentina y Bolivia.

Distribución Nacional:

Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

Pto. Vichiricansi, Pto. Salas y Chirisi.

Ecorregiones:

Amazonia, Boliviano-Tucumano, Cerrado, Chaco Serrano, Chiquitania, Sabanas Inundables, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Una parte de su población
- **Migrante:** Austral Parcial

253

❗ **Hábitat y Biología:** De poco común a localmente común sobre ríos, lagos y áreas abiertas adyacentes en la mayor parte de las tierras bajas y en la vertiente inferior oriental de los Andes; con menor frecuencia sobre hábitats abiertos alejados de cuerpos de agua más grandes, incluyendo marismas, sabanas inundables estacionales, cerrado, pastizales y claros de bosque; generalmente ausente en el Chaco y las Yungas. Solitaria, en parejas o bandadas de hasta 20 individuos, rara vez en bandadas más grandes de hasta 200. Busca su alimento a una altura bastante baja sobre el suelo. Se posa sobre ramas y ramitas desnudas, cables de electricidad, postes de cercas y alambres.

⚠️ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Aparentemente las poblaciones no se ven realmente afectadas por las actividades humanas, sin embargo, se necesitan estudios actuales en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/stelgidopteryx-ruficollis/>.

IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

- Turner, A. (2020). Southern Rough-winged Swallow (*Stelgidopteryx ruficollis*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.srwswa1.01>.

Golondrina (*Progne tapera*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: Mochosjere

Otros nombres: Golondrina, Brown-chested Martin

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriforme

**Distribución continental:**

Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana Francesa, Surinam, Guyana, Trinidad y Tobago, Brasil, Perú, Paraguay, Uruguay, Argentina y Bolivia.

Distribución Nacional:

Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

En casi toda el área.

Ecorregiones:

Amazonia, Cerrado, Chaco, Chiquitania, Chaco Serrano, Sabanas Inundables, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Una parte de su población
- **Migrante:** Austral Parcial

Hábitat y Biología: De rara a bastante común en sabanas inundables estacionales, pastizales, cerrado, bosques abiertos, claros de bosque, zonas agrícolas, suburbios, parques urbanos, y en márgenes de ríos y lagos en las tierras bajas y en la vertiente inferior sur de los Andes. Solitaria, en parejas o bandadas pequeñas; bandadas más grandes durante la migración. Forrajea a una altura considerable sobre el suelo; se posa en cables de electricidad, ramitas y ramas desnudas.

Amenazas generales en toda su área de distribución: A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Apparently las poblaciones no se ven realmente afectadas por las actividades humanas, sin embargo, se necesitan estudios actuales en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía


- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/progne-tapera/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Turner, A. (2025). Brown-chested Martin (*Progne tapera*), version 1.1. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, E. de Juana, and F. Medrano, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.brcmar1.011>.

Golondrina ala blanca (*Tachycineta albiventer*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Golondrina ala blanca, White-winged Swallow



Presenta un azul verdoso brillante en las partes superiores, las partes inferiores y la rabadilla son blancas

Tiene ojos color marrón oscuro

Pico negro

Mide entre 11 y 12 cm de longitud

Cola negra, las alas también, pero con una mancha blanca, que es bien notoria en vuelo. Patas negras

Los sexos son similares, aunque se observa que las hembras tienen un poco menos de blanco en las alas



Distribución continental:

Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana Francesa, Surinam, Guyana, Trinidad y Tobago, Brasil, Perú, Paraguay, Argentina y Bolivia.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Pto Salas.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chaco, Sabanas Inundables y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Una parte de su población
- **Migrante:** Austral Parcial

❗ **Hábitat y Biología:** De poco común a común sobre ríos y lagos en las tierras bajas y piedemonte de los Andes del norte; con menor frecuencia sobre marismas, sabanas inundadas y campos, pero generalmente no lejos de cuerpos de agua abiertos más grandes. Solitaria, en parejas o bandadas pequeñas. Forrajea bajo sobre aguas abiertas; se posa en ramitas y ramas desnudas, madera flotante, rocas, cables de electricidad, postes de cercas y alambres cerca del agua.

🐼 **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Aparentemente las poblaciones no se ven realmente afectadas por las actividades humanas, sin embargo, se necesitan estudios actuales en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/tachycineta-albiventer/>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Sedgwick, C. W. (2020). White-winged Swallow (*Tachycineta albiventer*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow/whwsal.01>.

Siete Ecos (*Microcerculus marginatus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Siete Ecos, Cucarachero Pecho Escamado,
Scaly-breasted Wren, Southern Nightingale-Wren

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriforme

**Distribución continental:**

Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Perú y Bolivia.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.**Distribución en Loma Santa:** En casi toda el área.**Ecorregiones:** Amazonia, Valles Secos Interandinos y Yungas. Sabanas Inundables.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Poco común a bastante común en bosque amazónico de tierra firme y transicional, bosque semi a hiperhumedo del piedemonte y Yungas inferior. Solitario en o cerca del suelo; rara vez en bandadas mixtas. Mueve la cola de arriba a abajo mientras camina. Escuchado mucho más que visto.

Amenazas generales en toda su área de distribución: A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Apparently las poblaciones no se ven realmente afectadas por las actividades humanas, sin embargo, se necesitan estudios actuales en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/microcerculus-marginatus/>.IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.Kroodsma, D. E. and D. Brewer (2020). Scaly-breasted Wren (*Microcerculus marginatus*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.scbwre1.01>.

Chopochoro (*Campylorhynchus turdinus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Chopochoro, Cucarachero Zorzal, Thrush-like Wren



Distribución continental:

Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina, Paraguay, Perú y Bolivia.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

Piñal, Jorori, Rosario y Chirisi.

Ecorregiones: Amazonia, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

257

Hábitat y Biología: Bastante común a abundante en bordes de bosque seco a hiperhúmedo, vegetación secundaria alta, pueblos y ciudades en la mayor parte de las tierras bajas y del piedemonte andino; su rango se expande con la deforestación. Solitario, en parejas o grupos familiares desde el estrato medio hasta el dosel; no se une a bandadas mixtas. Bullicioso, pero tiende a buscar alimento en ramas relativamente densas.

Amenazas generales en toda su área de distribución: A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Apparently the populations do not seem to be really affected by human activities, but studies are needed in this aspect.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Solís, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/campylorhynchus-turdinus/>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Kroodsma, D. E., D. Brewer, and G. M. Kirwan (2020). Thrush-like Wren (*Campylorhynchus turdinus*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.thlwre1.01>.

Cucarachero Bigotudo (*Pheugopedius genibarbis*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Cucarachero Bigotudo, Moustached Wren

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriforme



Distribución continental:

Brasil, Perú y Bolivia.

Distribución Nacional:

Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

En toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Boliviano-Tucumano, Chiquitania, Cerrado, Sabanas Inundables, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

258

❗ **Hábitat y Biología:** Poco común a abundante en bosque semihúmedo a húmedo de tierras bajas y ladera este inferior de los Andes norte y centrales; en la Amazonía en bosque de tierra firme, várzea e igapó; rara vez en bosque de galería e islas de bosque en sabana/cerrado. Habita en bordes de bosque, claros pequeños de árboles caídos, vegetación secundaria. Solitario, en parejas o grupos familiares en el sotobosque y estrato medio, especialmente en el follaje denso, enredaderas, bambú; ocasionalmente en bandadas mixtas. Busca alimento especialmente entre montones de hojas secas suspendidas. Escuchado mucho más que visto.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Apparently las poblaciones no se ven realmente afectadas por las actividades humanas, sin embargo, se necesitan estudios actuales en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/pheugopedius-genibarbis/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Kroodsma, D. E. and D. Brewer (2020). Moustached Wren (*Pheugopedius genibarbis*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.mouwre2.01>.

Cucarachero Musical (*Cyphorhinus arada*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Cucarachero Musical, Musician Wren



Existe considerable variación geográfica de plumaje, especialmente en las partes inferiores, entre las varias subespecies descritas



Distribución continental:

Guayana Francesa, Surinam, Guyana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Perú y Bolivia.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En casi toda el área.

Ecorregiones: Amazonia.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Raro y local en bosque amazónico de tierra firme, várzea y transicional y en bosque húmedo del piedemonte andino. Solitario o en parejas en el sotobosque inferior oscuros y en el suelo, especialmente en el follaje denso; no se une a bandadas mixtas, pero ocasionalmente sigue a hormigas ejército. Forrajea principalmente entre la hojarasca. Acechador y fácilmente pasado por alto excepto cuando vocaliza.

🌍 **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Apparently the populations do not seem to be really affected by human activities, but studies are needed in this aspect.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/cyphorhinus-arada/>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Kroodsma, D. E. and D. Brewer (2020). Musician Wren (*Cyphorhinus arada*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.muswre2.01>.

Soterillo Pico Largo (*Ramphocaenus melanurus*)

Nombre T'simane: -


Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Soterillo Pico Largo, Long-billed Gnatwren, Chattering Gnatwren

Mide alrededor de 9,5 cm. Presenta la corona y la parte de atrás del cuello de color marrón oliva, la espalda y las alas oliva grisáceo. La cola gris negruzca presenta plumas laterales con la punta blanca. Los lados de la cabeza y el cuello son canela brillante, y la garganta es blanca con rayas negras. El pecho es amarillento que se hace casi blanco en el centro del abdomen. Ojo café pálido. El pico es largo, claro y delgado con forma de gancho en la punta.



- **Clase:** Aves
- **Orden:** Psittaciforme

**Distribución continental:**

México, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana francesa, Trinidad y Tobago, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Surinam y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Piñal y Vichi'ricansi.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Poco común a localmente común en bosque amazónico de tierra firme, várzea y transicional, bosque húmedo del piedemonte y Yungas inferiores y semihúmedo de la Chiquitania norte; principalmente en bordes de bosque, claros de árboles caídos y brechas de luz similares. Solitario o en parejas en el sotobosque y estrato medio, rara vez en bandadas mixtas. Forrajea activamente entre la vegetación, especialmente en enredaderas. A menudo mantiene la cola levantada. Mejor detectado por voz.

Amenazas generales en toda su área de distribución: A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Aparentemente las poblaciones no se ven realmente afectadas por las actividades humanas, sin embargo, se necesitan estudios actuales en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Greeney, H. F., J. L. Atwood, S. B. Lerman, and A. J. Spencer (2020). Long-billed Gnatwren (*Ramphocaenus melanurus*), version 2.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, B. K. Keeney, and S. M. Billerman, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.lobgna5.02>.


- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/ramphocaenus-melanurus/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

Jichitarumá (*Turdus amaurochalinus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Jichitarumá, Zorzal Vientre Cremoso, Creamy-bellied Thrush



- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriforme



Distribución continental:

Bolivia, Brasil, Perú, Paraguay, Argentina y Uruguay.

Distribución Nacional:

Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando, Potosí, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

En casi toda el área.

Ecorregiones:

Amazonia, Boliviano-Tucumano, Cerrado, Chiquitania, Chaco, Chaco Serrano, Prepuna, Sabanas Inundables, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Una parte de su población
- **Migrante:** Austral Parcial

❗ **Hábitat y Biología:** Residente poco común a común en el sur de las tierras bajas y ladera este de los Andes; visitante raro a poco común en invierno y primavera (principalmente abr-nov) al norte de tierras bajas. Habita en una amplia variedad de hábitats abiertos y semiabiertos, incluyendo pueblos, suburbios y parques urbanos, ausente en el interior de bosque con dosel cerrado. Solitario; se alimenta en plantas con frutos y en el suelo. Vocaliza regularmente mediante un canto melodioso y distintivo.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Aparentemente las poblaciones no se ven realmente afectadas por las actividades humanas, sin embargo, se necesitan estudios actuales en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

• Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.

• Collar, N. and E. de Juana (2020). Creamy-bellied Thrush (*Turdus amaurochalinus*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.crbthr1.01>.

• Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr, J. V., Mailland O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/turdus-amaurochalinus/>.

• IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

Zorzal Cuello Blanco (*Turdus albicollis*)

Nombre T'simane: Og

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Zorzal Cuello Blanco, White-necked Thrush

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriforme

Las partes superiores son de color marrón oscuro, volviéndose más oscuras o más grises hacia la altura del ojo

Plumas que cubren el bajo vientre son blanquecinas



La garganta es blanca con rayas verticales oscuras, que se juntan abajo con un collar negro, seguido de otro collar en forma de media luna color blanco

Tienen picos casi completamente oscuros o con la parte inferior amarillenta

Anillo ocular rojizo o amarillo

Mide entre 18 y 21 cm

Pecho y vientre gris a menudo teñido de marrón entero, en algunos casos el cambio es escalonado

Patas de color marrón rosado



Distribución continental:

Trinidad y Tobago, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guayana Francesa, Surinam, Guyana, Bolivia, Brasil, Perú, Paraguay, Argentina y Uruguay.

Distribución Nacional: Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz..

Distribución en Loma Santa: En toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Boliviano-Tucumano, Chaco Serrano, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Raro a bastante común en bosque semi a hiper húmedo de la ladera este de los Andes, en bosque amazónico de tierra firme y transicional. Solitario, rara vez en bandadas mixtas. Presente en el sotobosque y estrato medio; ocasionalmente en el suelo o, en los Andes, en el dosel en árboles con frutos. A menudo mejor detectado por voz.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Apparently las poblaciones no se ven realmente afectadas por las actividades humanas, sin embargo, se necesitan estudios actuales en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Collar, N., J. S. Marks, and G. M. Kirwan (2020). White-necked Thrush (*Turdus albicollis*), version 1.0. In Birds of the World (S. M. Billerman, B. K. Keeney, P. G. Rodewald, and T. S. Schulenberg, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.whnrobl.01>.

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/turdus-albicollis/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

Matiquito (*Euphonia chlorotica*)


Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Matiquito, Eufonia Gorgipúrpura, Purple-throated Euphonia

El macho presenta una frente amarilla al igual que el pecho y el vientre; la cara, nuca, cuello espalda, alas y cola son negro azulado brillante; algunas plumas debajo de la cola son blancas

Ambos sexos presentan los ojos marrones oscuro, con el pico y las patas gris oscuro



Bolivia

Distribución continental:

Colombia, Venezuela, Ecuador, Guayana Francesa, Surinam, Guyana, Bolivia, Brasil, Perú, Paraguay, Argentina y Uruguay.

Distribución Nacional:

Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

En casi toda el área.

Ecorregiones:

Amazonia, Boliviano-Tucumano, Cerrado, Chiquitania, Chaco, Chaco Serrano, Sabanas Inundables, Valles Secos Interandinos, Puna Húmeda y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: De poco común a común en bosques y arbolados secos a semi-húmedos, bordes de bosque húmedo a muy húmedo y vegetación secundaria; también en pueblos, parques urbanos y jardines de tierras bajas y en la vertiente oriental de los Andes. En la Amazonia, principalmente en bosques de ribera (várzea) y vegetación secundaria; rara vez en los Yungas en áreas perturbadas. Se observa mayormente en parejas en el dosel, bajando a zonas más bajas en los bordes; ocasionalmente se une a bandadas mixtas. Su dieta es principalmente frugívora.

Amenazas generales en toda su área de distribución: A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Aparentemente las poblaciones no se ven realmente afectadas por las actividades humanas, sin embargo, se necesitan estudios actuales en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

• Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.

• Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/euphonia-chlorotica/>.

• Hilty, S. (2020). Purple-throated Euphonia (*Euphonia chlorotica*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.puteup1.01>.

• IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

Eufonia Piquigruesa (*Euphonia lanirostris*)

Nombre T'simane: -


Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Eufonia Piquigruesa, Thick-billed Euphonia

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriforme

El macho tiene las partes inferiores completamente amarillas desde la garganta hasta la cloaca, salvo una pequeña mancha blanca en la parte inferior de la cola

Las partes superiores son de color negro azulado oscuro, excepto la mancha amarilla en la frente



La hembra, como muchas es de color oliva opaco por encima y amarilla por debajo

Mide entre de 9,5 y 10,5 cm

Patas gris oscura



Bolivia

Distribución continental:

Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil y Perú.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En casi toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chiquitania, Sabanas Inundables, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Poco común a bastante común en los bordes de una variedad de bosques secos a húmedos, en bosques abiertos, plantaciones y poblados pequeños de las tierras bajas del norte y en la parte baja de la vertiente oriental de los Andes septentrionales; en la Amazonia, principalmente en bosques de ribera (várzea). Se observa mayormente en parejas o grupos familiares, y ocasionalmente en bandadas mixtas.

Amenazas generales en toda su área de distribución: A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Apparently the populations are not really affected by human activities, but studies are needed in this aspect.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Hilty, S. (2020). Thick-billed Euphonia (*Euphonia lanirostris*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.thbeup1.01>.


- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/euphonia-lanirostris/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

Sabanero Zumbador (*Ammodramus aurifrons*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Sabanero Zumbador, Chingolo Ceja Amarilla, Yellow-browed Sparrow



Distribución continental:

Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil y Perú.

Distribución Nacional: Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

Vichiricansi, Pto. Salas y Chirisi.

Ecorregiones: Amazonia, Boliviano-Tucumano, Chaco, Chaco Serrano, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❶ **Hábitat y Biología:** Poco común a común en áreas herbáceas y arbustivas a lo largo de ríos, caminos, claros, pastizales y poblados pequeños en el norte y oeste de la Amazonia y en la parte baja oriental de los Andes. Solitaria o en parejas; no se une a bandadas mixtas. Se alimenta principalmente en el suelo (camina y da saltos); canta expuesto desde un sitio abierto.

❷ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Apparently the populations are not really affected by human activities, but studies are needed in this aspect.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolombia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/ammodramus-aurifrons/>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Jaramillo, A. (2020). Yellow-browed Sparrow (*Ammodramus aurifrons*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.yebpsa1.01>.

Pinzón Pectoral (*Arremon taciturnus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Pinzón Pectoral, Pectoral Sparrow

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes



La hembra es más apagada que el macho, con las partes inferiores marrón-naranja y generalmente sin banda pectoral

**Distribución continental:**

Guayana Francesa, Surinam, Guyana, Colombia, Venezuela, Bolivia, Brasil y Perú.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Vichi'ricansi.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Poco común a bastante común en bosques de tierra firme amazónica, transicionales y, con menor frecuencia, de várzea; en estribaciones húmedas a muy húmedas, Yungas inferiores y bosques semi-húmedos de la Chiquitania norteña. Solitaria o en parejas en el sotobosque; no se une a bandadas mixtas. Busca su alimento principalmente en la vegetación, ocasionalmente en el suelo. Vocaliza bastante casi todo el año, aunque su canto agudo y fino puede pasar fácilmente desapercibido.

Amenazas generales en toda su área de distribución: A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Apparently las poblaciones no se ven realmente afectadas por las actividades humanas, sin embargo, se necesitan estudios actuales en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/arremon-taciturnus/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Valdez-Juárez, S. O., T. S. Schulenberg, and A. Jaramillo (2020). Pectoral Sparrow (*Arremon taciturnus*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.pecspa1.01>.

Tojo Dorado (*Psarocolius angustifrons*)

Nombre T'simane: Oy

Nombre Mojeño-trinitario: Jmunre

Otros nombres: Tojo Dorado y Russet-backed Oropendola



Distribución continental:

Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil.

Distribución Nacional:

Beni, Cochabamba, La Paz, Pando, y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

Toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Valles y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Bosques amazónicos, bosques ribereños, bordes de bosque semi a hiperhúmedo de la ladera este de los Andes, bosque de várzea y bordes de bosque de tierra firme de la Amazonia. Construye nidos coloniales, el nido es una larga cesta colgante con la entrada cerca de la parte superior, donde la hembra coloca de 1 a 2 huevos de color de blanco a verde pálido con marcas violáceas.

Amenazas generales en toda su área de distribución: No está globalmente amenazada (Menor Riesgo). Generalmente común a poco común a localmente común, su área de distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Fraga, R., J. del Hoyo, G. M. Kirwan, and N. Collar (2020). Russet-backed Oropendola (*Psarocolius angustifrons*), version 1.0. In Birds of the World (S. M. Billerman, B. K. Keeney, P. G. Rodewald, and T. S. Schulenberg, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.ruboro1.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., Maccormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/blackbirds/psarocolius-angustifrons>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Tojo (*Psarocolius decumanus*)

Nombre Tsimane: Oy

Nombre Mojeño-trinitario: Jmunre

Otros nombres: Tojo y Crested Oropendola

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriforme



Bolivia

Distribución continental:

Argentina, Bolivia, Brasil, Perú, Colombia, Costa Rica, Ecuador, la Guayana francesa, Guyana, Panamá, Paraguay, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela.

Distribución Nacional:

Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

Toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chaco, Chiquitania, Sabanas Inundadas, Valles y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Bosques amazónicos, bosques ribereños, bordes de bosque semi a hiperhúmedo de la ladera este de los Andes, bosque de várzea y bordes de bosque de tierra firme de la Amazonía. Construye nidos coloniales, el nido es una larga cesta colgante con la entrada cerca de la parte superior, donde la hembra coloca de 1 a 2 huevos de color gris azulado.

Amenazas generales en toda su área de distribución: No está globalmente amenazada. Común en gran parte de su área de distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía


- Fraga, R. (2020). Crested Oropendola (*Psarocolius decumanus*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.creoro1.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/blackbirds/psarocolius-decumanus>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Tojo grande (*Psarocolius bifasciatus*)

Nombre T'simane: Oy

Nombre Mojeño-trinitario: Jmunre

Otros nombres: Tojo grande y Olive Oropendola



Bolivia

Distribución continental:

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando, y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

Piñal, Jorori, Pto. Salas, Rosario y Chirisi.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❶ **Hábitat y Biología:** Habita en bosques altos y húmedos de tierra firme, incluidos los bosques abiertos de bambú, además, se encuentra en plantaciones cercanas, bosques de várzea, amplios bosques ribereños, bosques de transición con crecimiento secundario e islas fluviales. Es una especie que anida en colonias y construye nidos largos, colgantes y en forma de bolsa que cuelgan en racimos de las puntas de las ramas de los árboles emergentes de las copas, no se conoce información de los huevos.

❷ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No está globalmente amenazada. En general, es bastante común en la mayor parte de su área de distribución más bien extensa.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Greeney, H. F. (2022). Olive Oropendola (*Psarocolius bifasciatus*), version 2.0. In Birds of the World (B. K. Keeney, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.olioro1.02>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/blackbirds/psarocolius-bifasciatus>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Tojillo negro (*Cacicus solitarius*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: Usino

Otros nombres: Tojillo negro y Solitary Black Cacique

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriforme

**Distribución continental:**

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Rosario.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chaco, Chiquitania y Sabanas Inundadas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Se da sobre todo en bosques inundados y bosques de galería a lo largo de ríos y canales, extendiéndose a una densa vegetación ribereña en las islas de los ríos principales amazónicos. Nido construido por la hembra, una bolsa de hasta 120 cm de largo, abierta en la parte superior, tejida con diversas fibras vegetales, la hembra coloca 2 huevos blancos.

Amenazas generales en toda su área de distribución: No está globalmente amenazada.

Mapa: Asociación Civil Armonía


- Fraga, R. (2020). Solitary Black Cacique (*Cacicus solitarius*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.sobcac1.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/blackbirds/cacicus-solitarius>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Tojillo (*Cacicus cela*)

Nombre T'simane: Ghugue

Nombre Mojeño-trinitario: Paturi

Otros nombres: Tojillo y Yellow-rumped Cacique



Distribución continental:

Venezuela, Colombia, Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú, Panamá y Guyana.

Distribución Nacional:

Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

Toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chiquitania, Sabanas Inundadas y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

271

Hábitat y Biología: Ocupa el borde de bosques húmedos siempreverdes de tierras bajas. El hábitat original probablemente se centraba en el bosque de ribera y los bordes de los lagos, pero ahora esta especie se da a lo largo de carreteras y otros hábitats de borde creados por el hombre. Nidifica en colonias, siendo el nido una estructura colgante, en grupos apretados de 20 a 100. Las hembras colocan 2 huevos de color azul pálido o blanco con manchas oscuras.

Amenazas generales en toda su área de distribución: Tiene una distribución geográfica muy amplia y es común en la mayor parte de su área de distribución. En consecuencia, su estatus en la Lista Roja de la IUCN es de Menor Riesgo.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Corwin, P. (2020). Yellow-rumped Cacique (*Cacicus cela*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bowycacac1.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/blackbirds/cacicus-cela>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEP-WCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Tordillo hombro amarillo (*Icterus cayanensis*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Tordillo hombro amarillo y Epaulet Oriole

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriforme

**Distribución continental:**

Bolivia, Brasil, Ecuador, Guayana francesa, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, La Paz y Pando.**Distribución en Loma Santa:** Pto. Gerardo, Jorori y Chirisi.**Ecorregiones:** Amazonia y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: En el dosel y en los bordes de bosques altos, bosques pantanosos, bosques de galería, árboles en claros. El nido es una cesta parecida a una hamaca, está hecho de fibras resistentes, parecidas a alambres. La hembra coloca 2 huevos de color blanco cremoso.

Amenazas generales en toda su área de distribución: Actualmente una especie de Menor Riesgo. Puede ser poco común o local en algunas partes de su área de distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Fraga, R. and H. F. Greeney (2025). Epaulet Oriole (*Icterus cayanensis*), version 1.1. In Birds of the World (N. C. García, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.epaori1.011>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/blackbirds/icterus-cayanensis>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Tordillo hombro café (*Icterus pyrrhopterus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Tordillo hombro café y Epaulet Oriole



Distribución continental: Bolivia, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Distribución Nacional: Beni, La Paz, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca.

Distribución en Loma Santa: Chirisi.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chaco, Chiquitania, Sabanas Inundadas y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Bordes de bosques y claros, sabanas de palmeras, palmerales, en pequeños grupos familiares, el nido en formade de una cesta poco profunda tejida con fibras vegetales finas, a menudo fibras de palmera, donde la hembra coloca 3 a 4 huevos, de color blanco a gris azulado pálido, marcados con manchas y líneas en tonos pardos, negruzcos y grises.

🐦 **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No está globalmente amenazada. Localmente común. Tiene un área de distribución extensa en la que su número va en aumento. Se encuentra en ambientes modificados, incluso en jardines y ciudades, y está ampliando su área de distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Fraga, R. and E. de Juana (2020). Variable Oriole (*Icterus pyrrhopterus*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.epaori4.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/blackbirds/icterus-pyrrhopterus>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEP-WCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Seboí (*Molothrus oryzivorus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: Kutsi

Otros nombres: Seboí y Giant Cowbird

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriforme



Bolivia

Distribución continental:

Argentina; Belice; Bolivia; Brasil; Colombia; Costa Rica; Ecuador; Guayana Francesa; Guatemala; Guyana; Honduras; México; Nicaragua; Panamá; Paraguay; Perú; Surinam; Trinidad y Tobago y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando, Santa Cruz y Tarija.

Distribución en Loma Santa: Rosario y Chirisi.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chaco, Chiquitania, Sabanas Inundadas y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Situaciones parcialmente abiertas con árboles dispersos, tierras cultivadas, secundarios, campos abiertos y plantaciones, en Bolivia, poco común a común en bordes de bosque y arbustales secos húmedos, a lo largo de ríos, en bordes de lagunas, áreas agrícolas y pueblos de tierras bajas. Es una especie parásito, que coloca sus huevos en nidos de ostras especies de la familia Icteridae.

Amenazas generales en toda su área de distribución: El estado de conservación de la Tordo Gigante está calificado como de Menor Riesgo (IUCN). El Seboí tiene una distribución geográfica extremadamente amplia y la población global es grande.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Solís, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/blackbirds/molothrus-oryzivorus>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Lowther, P. E. (2020). Giant Cowbird (*Molothrus oryzivorus*), version 1.0. In Birds of the World (T. S.

Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.giacov.01>.

- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Clarinero Frente Aterciopelada

(*Lamprosar tanagrinus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Clarinero Frente Aterciopelada y Velvet-fronted Grackle



Distribución continental:

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

Pto. Vichiricansi y Puerto Salas.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania y Sabanas Inundadas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Normalmente cerca del agua (ríos, lagunas y pantanos) en bosques primarios y secundarios, bosques ribereños, nido en forma de una copa bastante gruesa y profunda, construida con raíces, tallos delgados y rizomorfos fúngicos oscuros. La hembra coloca 3 huevos alargados, de color verde azulado pálido con puntos.

🌿 **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No está globalmente amenazada. De poco común a bastante común y localmente común. Tolerancia una modificación moderada del hábitat.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Fraga, R. (2020). Velvet-fronted Grackle (*Lamprosar tanagrinus*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.vefgra1.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/blackbirds/lamprosar-tanagrinus>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.


Reinita Coronada Chica (*Basileuterus culicivorus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Reinita Coronada Chica y Golden-crowned Warbler

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes

**Distribución continental:**

Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guayana francesa, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Surinam, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Casi toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chiquitania, Chaco y Sabanas Inundadas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Bosques siempreverdes y semicaducifolios húmedos a semihúmedos, en bosques secundarios adyacentes, en Bolivia, en bosque de tierra firme y estacionalmente inundado de la Amazonia; principalmente en bosque con dosel irregular y secundario con sotobosque denso. Construye un nido en forma de cúpula de hierba y fibras vegetales en el suelo del bosque, la hembra coloca de 2 a 4 huevos blancos con marcas rojas parduzcas.

Amenazas generales en toda su área de distribución: A nivel mundial puede considerarse una especie en Menor Riesgo (IUCN).

Mapa: Asociación Civil Armonía


- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/warblers/basileuterus-culicivorus>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- Phelps, J., A. M. Contreras-González, C. I. Rodríguez-Flores, C. A. Soberanes-González, M. d. C. Arizmendi, and A. Jaramillo (2020). Golden-crowned Warbler (*Basileuterus culicivorus*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.gcrwar.01>.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEP-WCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Tangara Hormiguera Corona Roja (*Habia rubica*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Tangara Hormiguera Corona Roja y Red-crowned Ant-Tanager



Bolivia

Distribución continental:

México, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay, y Argentina.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma

Santa: Casi toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chiquitania, Valle y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Sotobosque frondoso y niveles inferiores de bosque húmedo de *tierra firme* y alto de segundo crecimiento; también várzea y bosque de transición en la Amazonia. Ocurre casi exclusivamente en el interior del bosque, infrecuentemente a lo largo de los bordes de los ríos o de los bosques. Nido construido casi en su totalidad por la hembra, una estructura poco profunda en forma de copa de raicillas, fibras vegetales y ramitas. La hembra coloca de 2 a 3 huevos blancos o azulados con manchas canela o amarillo.

🐼 **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No está globalmente amenazada (Menor Riesgo). Extendida y de poco común a localmente bastante común.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/grosbeaks-allies-picogrueros-y-afines/habia-rubica>.
- Hilty, S. (2020). Red-crowned Ant-Tanager (*Habia rubica*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.rcatan1.01>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.


Picogruoso Amazónico (*Cyanoloxia rothschildii*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Picogruoso Amazónico y Amazonian Grosbeak

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes

**Distribución continental:**

Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, Guayanas y Brasil.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.**Distribución en Loma Santa:** Toda el área de conservación.**Ecorregiones:** Amazonia, Chiquitania y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Ocupa el sotobosque de los bosques húmedos, los bordes de los bosques y los bosques altos de segundo crecimiento, en Bolivia, se lo encuentra en los bordes de bosque amazónico de tierra firme, várzea y transicional, bosque húmedo a hiperhúmedo del piedemonte, Yungas inferiores y semihúmedo de la Chiquitania norte. El nido tiene forma de una copa, construido con hojas secas, como hojas de palmera mezcladas con tallos de un helecho, con rizomorfos de color marrón negruzco. La hembra coloca 2 huevos de color blanco cremoso, con manchas de color marrón oscuro.

Amenazas generales en toda su área de distribución: Está clasificada como Menor Riesgo, por la IUCN, porque tiene un área de distribución extremadamente amplia.

Mapa: Asociación Civil Armonía


- Fitzgibbon, D. and N. L. Block (2020). Amazonian Grosbeak (*Cyanoloxia rothschildii*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.bubgro2.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/grosbeaks-allies-picogruesos-y-afines/cyanoloxia-rothschildii>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Mielero Verde (*Chlorophanes spiza*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Mielero Verde, Green Honeycreeper



Bolivia

Distribución continental:

México, Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guyana, Guayana francesa, Surinam, Brasil, Ecuador, Perú y Bolivia.

Distribución Nacional:

Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

En casi toda el área.

Ecorregiones:

Amazonia, Chiquitania, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Rara a localmente bastante común en el interior y en los bordes de bosques amazónicos de tierra firme, transicionales, de várzea, de igapó, semi-húmedas a húmedas, Yungas inferiores y bosque chiquitano norteño, tanto primarios como secundarios. Solitaria, en parejas o grupos familiares; frecuentemente en bandadas mixtas. Se alimenta de frutos, artrópodos y néctar en el subdosel y dosel, bajando a estratos medios en bordes de bosque y en plantas con fructificación. Bastante silenciosa.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Aparentemente las poblaciones no se ven realmente afectadas por las actividades humanas, sin embargo, se necesitan estudios actuales en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolombia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/chlorophanes-spiza/>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Zamudio, R. M. and K. J. Burns (2020). Green Honeycreeper (*Chlorophanes spiza*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.grehon1.01>.


Tangara Guira (*Hemithraupis guira*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Tangara Guira, Guira Tanager

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes



Ambos sexos presentan ojos marrones, pico mayormente amarillento y patas grises



Bolivia

Distribución continental:

Colombia, Venezuela, Guyana, Guayana francesa, Surinam, Brasil, Ecuador, Perú, Argentina, Paraguay y Bolivia.

Distribución Nacional: Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:
En toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Boliviano-Tucumano, Cerrado, Chaco, Chiquitania, Chaco Serrano, Sabanas Inundables, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Rara a común en una variedad de bosques secos a húmedos y arbolados altos en la vertiente oriental inferior de los Andes y en la mayor parte de las tierras bajas. Solitaria, en parejas o en pequeñas bandadas en el dosel; a menudo actúa como especie nuclear de bandadas mixtas. De comportamiento activo y de movimientos rápidos; captura artrópodos de manera acrobática en las copas externas de los árboles. Vocaliza bastante.

Amenazas generales en toda su área de distribución: A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Apparently las poblaciones no se ven realmente afectadas por las actividades humanas, sin embargo, se necesitan estudios actuales en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía


- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/hemithraupis-guira/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Johnstone, A. and K. J. Burns (2020). Guira Tanager (*Hemithraupis guira*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.guitan1.01>.

Tangara Hombro Blanco (*Loriotus luctuosus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Tangara Hombro Blanco, White-shouldered Tanager



Distribución continental:

Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Guyana, Guayana francesa, Surinam, Brasil, Ecuador, Perú y Bolivia.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chiquitania y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

281

❗ **Hábitat y Biología:** Rara a común en y a los bordes de bosque amazónico de tierra firme, várzea, igapó y transicional, bosque semi a hiperhúmedo del piedemonte, Yungas inferior y Chiquitania norte. En parejas o grupos familiares en el estrato medio y sotobosque superior, regularmente en bandadas mixtas. Se alimenta de artrópodos y frutos.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Apparently las poblaciones se ven afectadas por la deforestación generalizada, sin embargo, se necesitan más estudios en este aspecto, para conocer el impacto actual de esta y otras presiones.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolombia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/loriotus-luctuosus/>.

- Hilty, S. (2021). White-shouldered Tanager (*Loriotus luctuosus*), version 1.1. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.whstan1.011>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

Tangara Cabeza Gris (*Eucometis penicillata*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Tangara Cabeza Gris, Gray-headed Tanager

• **Clase:** Aves• **Orden:** PasseriformesEl macho y la hembra
son iguales. Son pájaros
ligeramente crestadosToda la cabeza y el cuello
son grises, garganta más
blanquecinaLa espalda, alas
y cola son verde
olivaMide entre
15,5 y 16,5
cmEl pico puede ser
el mismo color de
las patas o con un
tono más grisáceoLos ojos pueden ser
marrón oscuro o
más amarillentosEl pecho, el vientre y
las plumas que cubren
la parte inferior de
la cola son de color
amarillo limónPatas amarillas
rosáceas**Distribución continental:**

México, Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Guyana, Guayana francesa, Surinam, Brasil, Ecuador, Perú, Paraguay y Bolivia.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.**Distribución en Loma Santa:** Chirisi.**Ecorregiones:** Amazonia, Cerrado, Chiquitania, Chaco, Chaco Serrano y Sabanas Inundables.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Rara a localmente bastante común en bosque amazónico de várzea, igapó, bordes de ríos, bosque de galería en cerrado y sabana y bosque semihúmedo chiquitano, incluyendo bordes y parches de bosque remanente. Solitaria o en parejas en el sotobosque y estrato medio inferior, a menudo en bandadas mixtas. Principalmente en la vegetación densa donde fácilmente es pasada por alto. Principalmente silenciosa.

Amenazas generales en toda su área de distribución: A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Apparently las poblaciones se ven afectadas por la alteración del hábitat, sin embargo, se necesitan más estudios en este aspecto, para conocer el impacto actual de esta y otras presiones.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Baker, C. S. and K. J. Burns (2020). Gray-headed Tanager (*Eucometis penicillata*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.grhtan1.01>.
- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/eucometis-penicillata/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

Semillero Negro Azulado (*Volatinia jacarina*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Semillero Negro Azulado, Blue-black Grassquit



Distribución continental: México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guyana, Guayana francesa, Surinam, Brasil, Ecuador, Perú, Paraguay, Argentina, Uruguay y Bolivia.

Distribución Nacional: Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Rosario y Chirisi.

Ecorregiones: Amazonia, Boliviano-Tucumano, Cerrado, Chiquitania, Chaco, Chaco Serrano, Valles Secos Interandinos, Sabanas Inundables y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Una parte de su población
- **Migrante:** Austral Parcial

❗ **Hábitat y Biología:** Poco común a abundante en una variedad de hábitats abiertos y dominados por pastos de tierras bajas y ladera este de los Andes, incluyendo áreas agrícolas, pueblos, suburbios. Solitario o en parejas cuando se reproduce; en otoño e invierno principalmente en bandadas, a menudo con otros espigueros. El macho suele desplegar desde perchas, salta hacia arriba con aleteos, exponiendo el ala ventral parcialmente blanca; canta justo antes de aterrizar.

🌐 **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Aparentemente las poblaciones no se ven realmente afectadas por las actividades humanas, sin embargo, se necesitan estudios actuales en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

• Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolombia.com/>.

• Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillart O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/volatinia-jacarina/>.

• IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

• Rising, J. D. (2020). Blue-black Grassquit (*Volatinia jacarina*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.blbgral.01>.

Pico de Plata (*Ramphocelus carbo*)


Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Pico de Plata, Tangara Pico Plateado, Silver-beaked Tanager

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes

Los machos adultos son de plumaje color negro aterciopelado



Mide entre 15,5 y 16,5 cm

La cabeza, garganta y el pecho de color rojo carmesí profundo, que se destaca según la iluminación del sitio y se ve más intenso en las aves tomando el sol

En ambos sexos la parte superior del pico es gris y la parte inferior blanca plateada, brillante como porcelana

El plumaje de la hembra es totalmente negro, más opaco con las partes inferiores de color marrón

Patatas negras

**Distribución continental:**

Colombia, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guyana, Guayana francesa, Surinam, Brasil, Perú, Ecuador, Paraguay y Bolivia.

Distribución Nacional:

Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

En toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Boliviano-Tucumano, Cerrado, Chiquitania, Chaco, Chaco Serrano, Valles Secos Interandinos, Sabanas Inundables y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Principalmente bastante común a común en bordes de bosque semi a hiperhúmedo, arbustales secundarios y pueblos de la mayor parte de las tierras bajas y ladera este inferior de los Andes norteos y centrales. En parejas, grupos familiares o bandadas pequeñas, ocasionalmente en bandadas mixtas. Busca alimento en todos los niveles del bosque. Bulliciosa y vistosa.

Amenazas generales en toda su área de distribución: A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Apparently las poblaciones no se ven realmente afectadas por las actividades humanas, sin embargo, se necesitan estudios actuales en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/ramphocelus-carbo/>.
- Hilty, S. (2020). Silver-beaked Tanager (*Ramphocelus carbo*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.sibtan2.01>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

Tangara Ala Blanca (*Lanio versicolor*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Tangara Ala Blanca, White-winged Shrike-Tanager



Bolivia

Distribución continental:
Brasil, Perú y Bolivia.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:
En toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

285

❶ **Hábitat y Biología:** Rara a poco común en bosque de tierra firme, várzea y transicional de la Amazonía norte y oeste, bosque húmedo a hiperhúmedo del piedemonte y Yungas inferior. En parejas o grupos familiares del estrato medio superior hasta el dosel; siempre en bandadas mixtas como especie centinela, posa relativamente erguida y a la vista, vocalizando frecuentemente. Realiza vuelos cortos por artrópodos espantados por otros de la bandada.

❷ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Aparentemente las poblaciones no se ven realmente afectadas por las actividades humanas, sin embargo, se necesitan estudios actuales en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolombia.com/>.
- Dufrane, A. M. and K. J. Burns (2020). White-winged Shrike-Tanager (*Lanio versicolor*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.wwwstan1.01>.

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr., J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/lanio-versicolor/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

Mielero Púrpura (*Cyanerpes caeruleus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Mielero Púrpura, Purple Honeycreeper

• **Clase:** Aves• **Orden:** Passeriformes

Bolivia

Distribución continental:

Panamá, Colombia, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guyana, Guayana francesa, Surinam, Brasil, Ecuador, Perú, Paraguay y Bolivia.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.**Distribución en Loma Santa:** Pto. Calixto, Pto. Gerardo y Jorori.**Ecorregiones:** Amazonia, Sabanas Inundables, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Poco común a bastante común en y a los bordes de bosque amazónico de tierra firme, várzea, igapó y transicional, bosque semi a hiperhúmedo del piedemonte y Yungas inferiores, tanto primario como secundario; también en bosque de galería de los Llanos de Moxos y en árboles dispersos en claros. Solitario, en parejas o grupos familiares, a menudo en bandadas mixtas. Fácilmente pasado por alto en bosque continuo con dosel cerrado.

Amenazas generales en toda su área de distribución: A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Apparentemente las poblaciones no se ven realmente afectadas por las actividades humanas, sin embargo, se necesitan estudios actuales en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Gutierrez, G., C. H. Richart, and K. J. Burns (2020). Purple Honeycreeper (*Cyanerpes caeruleus*), version 1.0. In Birds of the World (S. M. Billerman, B. K. Keeney, P. G. Rodewald, and T. S. Schulenberg, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.purhon1.01>.

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., Maccormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/cyanerpes-caeruleus/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

Mielero Pata Roja (*Cyanerpes cyaneus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Mielero Pata Roja, Red-legged Honeycreeper



Distribución continental:

México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guyana, Guayana francesa, Surinam, Brasil, Ecuador, Perú y Bolivia.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: En casi toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania, Valles Secos Interandinos y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❶ **Hábitat y Biología:** Escaso a poco común y local en y en los bordes de tierra firme amazónica, bosque de transición, várzea, igapó, bosque enano, subhúmedo a húmedo de piedemonte, Yungas inferiores y bosque Chiquitano, tanto primario como secundario. Sus requerimientos de hábitat son poco conocidos; quizás se encuentra principalmente en bordes, en bosque secundario, enano y semideciduo; posiblemente realice movimientos estacionales o deambule. Solitario o en parejas; regularmente con bandadas mixtas. Se alimenta de néctar, frutos y ocasionalmente artrópodos en el dosel.

❷ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Apparently las poblaciones no se ven realmente afectadas por las actividades humanas, sin embargo, se necesitan estudios actuales en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

• Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolombia.com/>.

• Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/cyanerpes-cyaneus/>.

• Hilty, S. (2020). Red-legged Honeycreeper (*Cyanerpes cyaneus*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.relhoni.01>.


• IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.

Tangara Golondrina (*Tersina viridis*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Tangara Golondrina, Swallow Tanager

• **Clase:** Aves• **Orden:** Passeriformes**Distribución continental:**

Panamá, Colombia, Perú, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guyana, Guayana francesa, Surinam, Brasil, Ecuador, Paraguay, Argentina y Bolivia.

Distribución Nacional: Beni,

Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

En toda el área.

Ecorregiones: Amazonia, Boliviano-Tucumano, Chiquitania, Cerrado, Chaco, Chaco Serrano, Valles Secos Interandinos, Sabanas Inundables y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: LC:** Preocupación Menor
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Una parte de su población
- **Migrante:** Austral Parcial

❗ **Hábitat y Biología:** Rara a localmente y estacionalmente bastante común en bordes de bosque primario y secundario seco a hiperhumedo de la ladera este de los Andes norte y centrales, en la Amazonía y más localmente al este Santa Cruz. Solitaria, en parejas o grupos familiares en el dosel, ocasionalmente más abajo; no se une a bandadas mixtas. Posa erguida y a la vista. Principalmente come frutos; también realiza vuelos cortos por insectos aéreos.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** A nivel global se encuentra en Menor Riesgo (LC). Aparentemente las poblaciones no se ven realmente afectadas por las actividades humanas, sin embargo, se necesitan estudios actuales en este aspecto.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Carrera-Levi, N. & Ossa-Aristizabal, M. 2025. Birds Colombia: La voz de las aves. <https://birdscolumbia.com/>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <http://birdsofbolivia.org/es/tersina-viridis/>.

- Hilty, S. (2020). Swallow Tanager (*Tersina viridis*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.swatan1.01>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>


Dacnis Azul (*Dacnis cayana*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Dacnis Azul y Blue Dacnis

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes



Distribución continental:

Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Guayanas francesas, Guyana, Surinam, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay y Argentina.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania, Valles, Sabanas Inundadas y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❶ **Hábitat y Biología:** En los bordes de una amplia variedad de bosques primarios y secundarios bastante secos a húmedos de tierras bajas del norte y centrales y ladera este de los Andes. Nido tiene una forma de copa profunda, casi en forma de bolsa, construida de fibras blandas y plumón de semillas, suspendido entre ramitas frondosas en la parte exterior de un árbol, la hembra coloca 2 huevos blancos con marcas oscuras.

❷ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No está globalmente amenazada. De bastante común a común y ampliamente distribuida a lo largo de su extensa área de distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/tanagers-and-allies-tangaras-y-afines/dacnis-cayana>.
- Hilty, S. (2020). Blue Dacnis (*Dacnis cayana*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.bludac1.01>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.


Espiguero Común (*Sporophila caerulescens*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Espiguero Común y Double-collared Seedeater

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes



Algunos machos tienen las partes inferiores amarillentas, al parecer una variación rara pero regular

**Distribución continental:**

Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú y Uruguay.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Pando, Tarija y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Piñal, Vichiricansi y Chirisi.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chiquitania, Valles, Sabanas Inundadas y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** Austral

❗ **Hábitat y Biología:** Bordes de bosque, aperturas arbustivas, crecimiento secundario, hábitat de cerrado perturbado y hábitats de campos antiguos donde haya algunos árboles o arbustos más altos. Nido en forma de una copa hecha de raíces de hierba seca y telas de araña. La hembra coloca de 2 a 3 huevos blanquecinos, crema o verde pálido con manchas marrones.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No está globalmente amenazada (Menor Riesgo). De común a abundante en gran parte de su área de distribución; generalmente más numerosa que sus congéneres. Tiene una amplia distribución reproductora.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Jaramillo, A. (2020). Double-collared Seedeater (*Sporophila caerulescens*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.docsee1.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., Maccormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/tanagers-and-allies-tangaras-y-afines/porophila-caerulescens>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Saltador Garganta Anteada (*Saltator maximus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Saltador Garganta Anteada y Buff-throated Saltator



Distribución continental:

México, Guatemala, el Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil.

Distribución Nacional:

Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

Piñal, Pto. Gerardo, Jorori, Rosario y Chirisi.

Ecorregiones:

Amazonia, Cerrado, Chiquitania, Valles y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❶ **Hábitat y Biología:** Bordes de los bosques húmedos de tierras bajas y puede encontrarse forrajeando en el follaje de nivel medio, se da con menos frecuencia en el dosel del interior del bosque. En Bolivia, es poco común a bastante común en bosque amazónico de tierra firme, várzea, igapó, transicional, bosque de galería, bosque semi a hiper húmedo del piedemonte, Yungas inferior y Chiquitania. El nido tiene forma de taza abultada y en su elaboración emplean hojas y ramitas. La hembra pone de 2 o 3 huevos de color azul con manchas negras.

❷ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** Tiene una área de distribución muy extensa y, aunque se desconoce la tendencia de la población, no se cree que esté disminuyendo a un ritmo significativo. La IUCN afirma que la población de la especie también es extremadamente grande y, por lo tanto, es una especie de Menor Riesgo.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/tanagers-and-allies-tangaras-y-afines/saltator-maximus>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- McAfee, A. and K. J. Burns (2020). Buff-throated Saltator (*Saltator maximus*), version 1.0. In Birds of the World

(T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.butsall.01>.

- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEP/WCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Mielero Común (*Coereba flaveola*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Mielero Común y Bananaquit



- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes

**Distribución continental:**

México, Guatemala, el Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chiquitania, Sabanas Inundadas, Valles y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Una variedad de bosques y arbustales semiabiertos y abiertos secos a hiper húmedos, bordes de bosques más densos, jardines y parques de pueblos y ciudades pequeñas de la ladera este inferior de los Andes. El nido es esférico, con orificio de entrada lateral y recubrimiento interior. La hembra coloca 3 huevos blancuzcos con manchas café.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No está globalmente amenazada (Menor Riesgo). Varía de ser poco común, como en zonas muy boscosas, a ser abundante en otras áreas de su distribución.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/tanagers-and-allies-tangaras-y-afines/coereba-flaveola>.
- Hilty, S. and D. A. Christie (2020). Bananaquit (*Coereba flaveola*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.banana.01>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Tangara Urraca (*Cissopis leverianus*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Tangara Urraca y Magpie Tanager



Distribución continental:

Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana Francesa Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, y Argentina.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Pto. Gerardo, Rosario y Chirisi.

Ecorregiones: Amazonia, Valles y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

① **Hábitat y Biología:** Bordes de bosque semi a hiperhúmedo, bosque ribereño y en vegetación secundaria de la Amazonía. Casi siempre se encuentra en bosques de semiabiertos a abiertos y en los bordes de los ríos. El nido tiene forma de copa y suele estar disimulado por el follaje, donde usa como materiales ramitas, hierba y otros materiales vegetales fibrosos, la hembra coloca 2 huevos de color marrón polvoriento o marrón rojizo.

② **Amenazas generales en toda su área de distribución:** Tiene una extensa área de distribución repartida por muchos países sudamericanos. La IUCN considera que la prioridad de conservación es de Menor Riesgo.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/tanagers-and-allies-tangaras-y-afines/cissopis-leverianus>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio

de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

- Threlkeld, M. C. and K. J. Burns (2020). Magpie Tanager (*Cissopis leverianus*), version 1.0. In *Birds of the World* (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.magtan2.01>.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.


Tangara Enmascarada (*Stilpnia nigrocincta*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Tangara Enmascarada y Masked Tanager

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes



Los sexos son similares entre sí, pero pueden distinguirse por un ligero dicromatismo sexual, ya que las hembras son más apagadas

**Distribución continental:**

Brasil, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia y Guyana.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa:

En casi toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Los hábitats primarios de los bosques tropicales siempreverdes de tierras bajas y los bosques secundarios, enumeran una variedad de hábitats para esta especie que incluyen bosques de tierra firme y várzea, bosques abiertos, bordes de bosques. Construye nido en forma de una copa abierta, coloca 2 huevos de color azul claro y moteados.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** Clasificada en la categoría de Menor Riesgo, de la Lista Roja de la IUCN. Debido a la amplia área de distribución geográfica de esta ave (3.420.000 km²), no cumple los requisitos para figurar en la categoría de Vulnerable.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/stilpnia-nigrocincta/>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio

de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.

- Schepps, C. E. and K. J. Burns (2020). Masked Tanager (*Stilpnia nigrocincta*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.mastan1.01>.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Tangara Turquesa (*Tangara mexicana*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Tangara Turquesa y Turquoise Tanager



Bolivia

Distribución continental:

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana francesa, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Bosque amazónico de várzea, igapó, ribereño y bordes de bosque de tierra firme, bosque húmedo a hiperhúmedo del piedemonte, Yungas inferiores y Chiquitania norte; también en bosque secundario. El nido es una copa construido de hierbas y hojas muertas forrada de finas raíces sobre ramas, la hembra coloca de 2 a 3 huevos blanquecinos, marcados con manchas grisáceas y marrones.

Amenazas generales en toda su área de distribución: No está globalmente amenazada (Menor Riesgo). No se ha calculado el tamaño de la población, pero la especie tiene una distribución geográfica muy extensa, estimada en 7.170.000 km². La abundancia relativa de la especie también se ha evaluado como bastante común.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/tanagers-and-allies-tangaras-y-afines/tangara-mexicana>.
- Kirwan, G. M., J. Hart, and K. J. Burns (2023). Turquoise Tanager (*Tangara mexicana*), version 2.0. In Birds of the World (S. M. Billerman and T. S. Schulenberg, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.turtan1.02>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Tangara del Paraíso (*Tangara chilensis*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Tangara del Paraíso y Paradise Tanager

- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes



Distribución continental:

Venezuela, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil y las Guayanas.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Chiquitania, Valle y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

Hábitat y Biología: Bosques tropicales siempreverdes de tierras bajas y en bosques secundarios, suele verse en el dosel a unos 25-50 m sobre el suelo, pero ocasionalmente puede encontrarse en el borde del bosque, en las ramas más bajas, o en un claro cerca de árboles frutales. Los nidos se colocan en el dosel y tienen forma de copa a 31 m sobre el suelo, el material utilizado es musgo verde brillante parecido al líquen, junto con hongos blancos, la hembra coloca de 2 a 4 huevos de color blanco verdoso y están muy manchados de marrón y negro.

Amenazas generales en toda su área de distribución: Tiene un área de distribución estimada en unos 4.590.000 km², que es muy extensa, por lo que no se espera que sea vulnerable.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Berneberg, N. L. and K. J. Burns (2020). Paradise Tanager (*Tangara chilensis*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.partan1.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., Garcia-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/tanagers-and-allies-tangaras-y-afines/tangara-chilensis>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Tangara Verde y Dorada (*Tangara schrankii*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Tangara Verde y Dorada y Green-and-Gold Tanager



Distribución continental:

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Se encuentra en una gran variedad de tipos de bosque en la Amazonia y en los pies de monte de los Andes, incluidos los bosques húmedos de tierra firme y várzea y los bordes de bosque adyacentes, el bosque alto de secundarios dominado por Cecropia y los bordes de los ríos, nidos en forma de copa abierta contruidos de hojas secas, raicillas, líquenes y otro de raicillas, coloca de 2 a 3 huevos de color marrón rojizo pálido con marcas de color rojo oscuro.

🌍 **Amenazas generales en toda su área de distribución:** El estado de conservación en la Lista Roja de la IUCN, para esta especie está clasificado como de Menor Riesgo. Tiene una amplia distribución geográfica, estimada en 4.230.000 km², y la población mundial es muy grande.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Buitrón-Jurado, G. (2020). Green-and-gold Tanager (*Tangara schrankii*), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.gagtan2.01>.
- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., Maccormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/tanagers-and-allies-tangaras-y-afines/tangara-schrankii>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Sayubu (*Thraupis sayaca*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Sayubu y Sayaca Tanager

Tiene la cabeza y las partes superiores
uniformemente grises apagadas,
ligeramente teñidas de azulado



- **Clase:** Aves
- **Orden:** Passeriformes

**Distribución continental:**

Bolivia, Brasil, Perú,
Argentina, Paraguay y
Uruguay.

Distribución Nacional: Beni,
Cochabamba, Chuquisaca,
La Paz, Pando, Tarija, Potosí
y Santa Cruz.

**Distribución en Loma
Santa:** Casi toda el área de
conservación.

Ecorregiones: Amazonia,
Cerrado, Chaco, Chiquitania,
Sabanas Inundadas, Valle y
Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Amplia gama de hábitats secos a húmedos y en su mayoría abiertos o semiabiertos, incluidos bosques ligeros, sabanas con árboles dispersos, matorrales, árboles a lo largo de los márgenes de los ríos, zonas cultivadas, parques, jardines y zonas urbanas, nido construido en forma de una copa compacta tejida con hierba, tallos de flores, raicillas y musgo, a veces cubierta de líquenes, la hembra coloca 2 huevos de color blanco amarillento al gris o verdoso.

⚠ **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No está globalmente amenazada. Extendida y de común a localmente abundante.

Mapa: Asociación Civil Armonía


- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/tanagers-and-allies-tangaras-y-afines/thraupis-sayaca>.
- Hilty, S. (2020). Sayaca Tanager (*Thraupis sayaca*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.sayatan1.01>.
- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEPWCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Sayubu Cuchuqui (*Thraupis palmarum*)

Nombre T'simane: -

Nombre Mojeño-trinitario: -

Otros nombres: Sayubu Cuchuqui y Palm Tanager



Distribución continental:

Nicaragua, Panamá, Colombia, Venezuela, Guyanas, Surinam, Guayanas francesas, Brasil, Perú, Bolivia, Argentina y Paraguay.

Distribución Nacional: Beni, Cochabamba, La Paz, Pando y Santa Cruz.

Distribución en Loma Santa: Toda el área de conservación.

Ecorregiones: Amazonia, Cerrado, Chiquitania, Sabanas Inundadas, Valle y Yungas.

- **LRVB:** No enlistada
- **IUCN: NT:** Menor Riesgo
- **CITES:** No enlistada
- **Residente:** Si
- **Migrante:** No

❗ **Hábitat y Biología:** Gran variedad de hábitats. Muy extendido en claros arbustivos, bosques secundarios, bosques de galería, bordes de bosques y copas de bosques húmedos; en regiones de bastante secas a húmedas y, como su nombre indica, a menudo común donde las palmeras son numerosas. Nido en forma de taza ordenada de hierba, tiras de hojas secas, fibras de palmera y similares, la hembra pone 2 huevos de color azulado pálido, muy manchados de marrón y lila pálido.

🐼 **Amenazas generales en toda su área de distribución:** No está globalmente amenazada. Común y extendido en gran parte de su amplia área de distribución. Se adapta con facilidad a entornos alterados por el hombre.

Mapa: Asociación Civil Armonía

- Herzog, S. K., Terrill, R. S., Jahn, A. E., Remsen, Jr. J. V., Maillard O., García-Soliz, V. H., MacLeod, R., McCormick, A. & Vidoz, J. Q. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Santa Cruz de la Sierra: Asociación Armonía. <https://birdsofbolivia.org/species-fact-sheets-2/tanagers-and-allies-tangaras-y-afines/thraupis-palmarum>.
- Hilty, S. (2020). Palm Tanager (*Thraupis palmarum*), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.paltan.101>.

- IUCN 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-1. <https://www.iucnredlist.org>.
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, La Paz, Bolivia. 571 pp.
- UNEP-WCMC (Comps.) 2025. Checklist of CITES species – CITES Identification Manual. CITES Secretariat, Geneva, Switzerland, and UNEP-WCMC, Cambridge, United Kingdom. Accessed on 03/07/2025.

Lista de aves registradas en el área de conservación Loma Santa

Nº	Orden	Familia	Orden	Estatus		CITES	Migrante	
				IUCN	LRVB		A	B
1	Tinamiformes	Tinamidae	<i>Tinamus tao</i>	VU				
2			<i>Tinamus major</i>	LC				
3			<i>Crypturellus cinereus</i>	LC				
4			<i>Crypturellus undulatus</i>	LC				
5			<i>Crypturellus soui</i>	LC				
6	Anatiformes	Anatidae	<i>Cairina moschata</i>	LC				
7	Galliformes	Cracidae	<i>Penelope jacquacu</i>	LC				
8			<i>Pipile grayi</i>	LC				
9			<i>Ortalis guttata</i>	LC				
10			<i>Mitu tuberosun</i>	NT				
11		Odontophoridae	<i>Odontophorus stellatus</i>	LC				
12	Columbiformes	Columbidae	<i>Patagioenas speciosa</i>	LC				
13			<i>Patagioenas cayennensis</i>	LC				
14			<i>Patagioenas plumbea</i>	LC				
15			<i>Patagioenas subvinacea</i>	LC				
16			<i>Geotrygon montana</i>	LC				
17			<i>Leptotila verreauxi</i>	LC				
18			<i>Leptotila rufaxilla</i>	LC				
19			<i>Columbina talpacoti</i>	LC				
20	Cuculiformes	Cuculidae	<i>Guira guira</i>	LC				
21			<i>Crotophaga major</i>	LC				
22			<i>Crotophaga ani</i>	LC				
23			<i>Tapera naevia</i>	LC				
24			<i>Dromococcyx phasianellus</i>	LC				
25			<i>Coccyzua minuta</i>	LC				
26			<i>Piaya cayana</i>	LC				
27	Nyctibiidae	Nyctibiidae	<i>Nyctibius grandis</i>	LC				
28			<i>Nyctibius griseus</i>	LC				
29	Caprimulgidae	Caprimulgidae	<i>Nyctidromus albicollis</i>	LC				
30			<i>Setopagis parvula</i>	LC			X	
31			<i>Hydropsalis torquata</i>	LC			X	
32			<i>Antrostomus sericocaudatus</i>	LC				

Nº	Orden	Familia	Orden	Estatus		CITES	Migrante	
				IUCN	LRVB		A	B
33	Apodiformes	Apodidae	<i>Streptoprocne zonaris</i>	LC				
34			<i>Chaetura brachyura</i>	LC				
35		Trochilidae	<i>Florisuga mellivora</i>	LC		II		
36			<i>Glaucis hirsutus</i>	LC		II		
37			<i>Threnetes leucurus</i>	LC		II		
38			<i>Phaethornis ruber</i>	LC		II		
39			<i>Phaethornis hispidus</i>	LC		II		
40			<i>Phaethornis malaris</i>	LC		II		
41			<i>Chlorostilbon mellisugus</i>	LC		II		
42			<i>Thalurania furcata</i>	LC		II		
43	Opisthocomiformes	Opisthocomidae	<i>Opisthocomus hoazin</i>	LC				
44	Gruiformes	Aramidae	<i>Aramus guarauna</i>	LC				
45		Psophiidae	<i>Psophia leucoptera</i>	LC				
46		Rallidae	<i>Aranides cajaneus</i>	LC				
47		Heliornithidae	<i>Heliornis fulica</i>	LC				
48	Charadriiformes	Charadriidae	<i>Vanellus chilensis</i>	LC				
49		Scolopacidae	<i>Actitis macularius</i>	LC				X
50	Eurypygiformes	Eurypygidae	<i>Eurypyga helias</i>	LC				
51	Ciconiiformes	Ciconiidae	<i>Jabiru mycteria</i>	LC		I		
52			<i>Mycteria americana</i>	LC				
53	Suliformes	Anhingidae	<i>Anhinga anhinga</i>	LC				
54		Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	LC				
55	Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Tigrisoma lineatum</i>	LC				
56			<i>Agamia agami</i>	NT				
57			<i>Cochlearius cochlearius</i>	LC				
58			<i>Nycticorax nycticorax</i>	LC				
59			<i>Butorides striata</i>	LC				
60			<i>Ardea cocoi</i>	LC				
61			<i>Pilherodius pileatus</i>	LC				
62			<i>Egretta thula</i>	LC				
63		Threskiornithidae	<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	LC				
64	Cathartiformes	Cathartidae	<i>Sarcoramphus papa</i>	LC		III		
65			<i>Coragyps atratus</i>	LC				
66			<i>Cathartes aura</i>	LC				
67			<i>Cathartes melambrotus</i>	LC				

Nº	Orden	Familia	Orden	Estatus		CITES	Migrante	
				IUCN	LRVB		A	B
68	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Leptodon cayanensis</i>	LC		II		
69			<i>Elanoides forficatus</i>	LC		III	x	
70			<i>Harpia harpyja</i>	VU	VU	I		
71			<i>Spizaetus tyrannus</i>	LC		II		
72			<i>Spizaetus ornatus</i>	NT		II		
73			<i>Harpagus bidentatus</i>	LC		II		
74			<i>Ictinia plumbea</i>	LC		II	x	
75			<i>Buteogallus schistaceus</i>	LC		II		
76			<i>Buteogallus urubitinga</i>	LC		II		
77			<i>Rupornis magnirostris</i>	LC		II		
78			<i>Geranoaetus albicaudatus</i>	LC		II		
79			<i>Pseudastur albicollis</i>	LC		II		
80	Strigiformes	Strigidae	<i>Megascops choliba</i>	LC		II		
81			<i>Megascops watsonii</i>	LC		II		
82			<i>Lophotrix cristata</i>	LC		II		
83			<i>Pulsatrix perspicillata</i>	LC		II		
84			<i>Ciccaba huhula</i>	LC		II		X
85			<i>Glaucidium hardyi</i>	LC		II		
86			<i>Glaucidium brasilianum</i>	LC		II		
87	Trogoniformes	Trogonidae	<i>Trogon melanurus</i>	LC				
88			<i>Trogon ramonianus</i>	LC				
89			<i>Trogon curucui</i>	LC				
90			<i>Trogon collaris</i>	LC				
91	Coraciiformes	Momotidae	<i>Electron phatyrhynchum</i>	LC				
92			<i>Baryphthengus martii</i>	LC				
93			<i>Momotus momota</i>	LC				
94		Alcedinidae	<i>Megaceryle torquata</i>	LC				
95			<i>Chloroceryle amazona</i>	LC				
96			<i>Chloroceryle aenea</i>	LC				
97			<i>Chloroceryle americana</i>	LC				
98			<i>Chloroceryle inda</i>	LC				
99	Galbuliformes	Galbulidae	<i>Galbula ruficauda</i>	LC				
100		Bucconidae	<i>Monasa nigrifrons</i>	LC				
101			<i>Monasa morphoeus</i>	LC				

Nº	Orden	Familia	Orden	Estatus		CITES	Migrante	
				IUCN	LRVB		A	B
102	Piciformes	Capitonidae	<i>Capito auratus</i>	LC				
103		Ramphastidae	<i>Ramphastos tucanus</i>	LC		II		
104			<i>Ramphastos vitellinus</i>	LC		II		
105			<i>Pteroglossus castanotis</i>	LC		III		
106			<i>Pteroglossus beauharnaisii</i>	LC				
107		Picidae	<i>Melanerpes cruentatus</i>	LC				
108			<i>Dryobates passerinus</i>	LC				
109			<i>Campephilus rubricollis</i>	LC				
110			<i>Campephilus melanoleucos</i>	LC				
111			<i>Dryocopus lineatus</i>	LC				
112			<i>Celeus flavus</i>	LC				
113			<i>Piculus leucolaemus</i>	LC				
114			<i>Piculus chrysochloros</i>	LC				
115	Falconiformes	Falconidae	<i>Herpetotheres cachinnans</i>	LC		II		
116			<i>Micrastur ruficollis</i>	LC		II		
117			<i>Micrastur gilvicollis</i>	LC		II		
118			<i>Micrastur semitorquatus</i>	LC		II		X
119			<i>Ibycter americanus</i>	LC		II		
120			<i>Daptrius ater</i>	LC		II		
121			<i>Milvago chimachima</i>	LC		II		
122	Psittaciformes	Psittacidae	<i>Brotogeris chiriri</i>	LC		II		
123			<i>Brotogeris cyanoptera</i>	LC		II		
124			<i>Pionus menstruus</i>	LC		II		
125			<i>Amazona farinosa</i>	LC		II		
126			<i>Pionites xanthomerus</i>	VU		II		
127			<i>Aratinga weddellii</i>	LC		II		
128			<i>Ara ararauna</i>	LC		II		
129			<i>Ara severus</i>	LC		II		
130			<i>Ara chloropterus</i>	LC		II		
131			<i>Psittacara leucophthalmus</i>	LC		II		
132	Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Cymbilaimus lineatus</i>	LC				
133			<i>Taraba major</i>	LC				
134			<i>Thamnophilus doliatus</i>	LC				
135			<i>Thamnophilus schistaceus</i>	LC				
136			<i>Thamnophilus aethiops</i>	LC				

Nº	Orden	Familia	Orden	Estatus		CITES	Migrante	
				IUCN	LRVB		A	B
137	Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Dysithamnus mentalis</i>	LC				
138			<i>Thamnomanes schistogynus</i>	LC				
139			<i>Myrmotherula brachyura</i>	LC				
140			<i>Myrmotherula axillaris</i>	LC				
141			<i>Hypocnemis subflava</i>	LC				
142			<i>Pyriglena maura</i>	LC				
143			<i>Myrmoborus leucophrys</i>	LC				
144			<i>Myrmoborus myotherinus</i>	LC				
145			<i>Hypocnemoides maculicauda</i>	LC				
146			<i>Hylophylax naevius</i>	LC				
147			<i>Myrmelastes hypertychus</i>	LC				
148			<i>Sciaphylax hemimelaena</i>	LC				
149			<i>Myrmophylax atrothorax</i>	LC				
150			<i>Phlegopsis nigromaculata</i>	LC				
151		Grallariidae	<i>Myrmothera berlepschi</i>	LC				
152		Formicariidae	<i>Formicarius analis</i>	LC				
153		Furnariidae	<i>Sittasomus griseicapillus</i>	LC				
154			<i>Dendrocincla merula</i>	LC				
155			<i>Dendrocincla fuliginosa</i>	LC				
156			<i>Dendrexetastes rufigula</i>	LC				
157			<i>Glyphorynchus spirurus</i>	LC				
158			<i>Dendrocolaptes picumnus</i>	LC				
159			<i>Xiphorhynchus elegans</i>	LC				
160			<i>Xiphorhynchus guttatus</i>	LC				
161			<i>Xenops minutus</i>	LC				
162			<i>Xenops rutilans</i>	LC				
163			<i>Furnarius leucopus</i>	LC				
164			<i>Synallaxis gujanensis</i>	LC				
165			<i>Synallaxis albescens</i>	LC				
166			<i>Synallaxis rutilans</i>	LC				
167		Pipridae	<i>Tyrannetes stolzmanni</i>	LC				
168			<i>Neopelma sulphureiventer</i>	LC				
169			<i>Lepidothrix coronata</i>	LC				
170			<i>Pipra fasciicauda</i>	LC				
171			<i>Ceratopipra chloromeros</i>	LC				

Nº	Orden	Familia	Orden	Estatus		CITES	Migrante	
				IUCN	LRVB		A	B
172	Passeriformes	Cotingidae	<i>Querula purpurata</i>	LC				
173			<i>Cotinga cayana</i>	LC				
174			<i>Lipaugus vociferans</i>	LC				
175			<i>Gymnoderus foetidus</i>	LC				
176		Tityridae	<i>Tityra cayana</i>	LC				
177			<i>Tityra semifasciata</i>	LC				
178			<i>Schiffornis turdina</i>	LC				
179			<i>Laniocera hypopyrra</i>	LC				
180			<i>Pachyrhamphus polychopterus</i>	LC			x	
181		Onychorhynchidae	<i>Terenotriccus erythrurus</i>	LC				
182		Tyrannidae	<i>Piprites chloris</i>	LC				
183			<i>Platyrinchus coronatus</i>	LC				
184			<i>Corythopsis torquatus</i>	LC				
185			<i>Mionectes oleagineus</i>	LC				
186			<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	LC				
187			<i>Tolmomyias sulphureus</i>	LC				
188			<i>Myiornis ecaudatus</i>	LC				
189			<i>Hemitriccus flammulatus</i>	LC				
190			<i>Hemitriccus griseipectus</i>	LC				
191			<i>Poecilatriccus latirostris</i>	LC				
192			<i>Todirostrum chrysocrotaphum</i>	LC				
193			<i>Camptostoma obsoletum</i>	LC			x	
194			<i>Elaenia spectabilis</i>	LC			x	
195			<i>Elaenia parvirostris</i>	LC			x	
196			<i>Tyrannulus elatus</i>	LC				
197			<i>Myiopagis gaimardii</i>	LC				
198			<i>Myiopagis viridicata</i>	LC			x	
199			<i>Zimmerius gracilipes</i>	LC				
200			<i>Ornithion inermis</i>	LC				
201			<i>Attila bolivianus</i>	LC				
202			<i>Attila spadiceus</i>	LC				
203			<i>Legatus leucophaeus</i>	LC			x	
204			<i>Ramphotrigon ruficauda</i>	LC				
205			<i>Pitangus sulphuratus</i>	LC				
206			<i>Philohydor lictor</i>	LC				
207			<i>Megarynchus pitangua</i>	LC			x	
208			<i>Myiodynastes luteiventris</i>	LC				x
209			<i>Myiodynastes maculatus</i>	LC			x	

Nº	Orden	Familia	Orden	Estatus		CITES	Migrante	
				IUCN	LRVB		A	B
210	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Myiozetetes cayanensis</i>	LC				
211			<i>Myiozetetes similis</i>	LC				
212			<i>Empidonomus varius</i>	LC			x	
213			<i>Tyrannus melancholicus</i>	LC			x	
214			<i>Tyrannus savana</i>	LC			x	
215			<i>Tyrannus tyrannus</i>	LC				x
216			<i>Rhytipterna simplex</i>	LC				
217			<i>Casiornis rufus</i>	LC			x	
218			<i>Sirystes albocinereus</i>	LC				
219			<i>Myiarchus tuberculifer</i>	LC				
220			<i>Myiarchus swainsoni</i>	LC			x	
221			<i>Myiarchus tyrannulus</i>	LC			x	
222			<i>Myiophobus fasciatus</i>	LC			x	
223			<i>Pyrocephalus rubinus</i>	LC			x	
224			<i>Ochthornis littoralis</i>	LC				
225			<i>Lathrotriccus euleri</i>	LC			x	
226		Vireonidae	<i>Cyclarhis gujanensis</i>	LC				
227			<i>Vireolanius leucotis</i>	LC				
228			<i>Tunchiornis ochraceiceps</i>	LC				
229			<i>Pachysylvia hypoxantha</i>	LC				
230			<i>Vireo olivaceus</i>	LC				
231		Corvidae	<i>Cyanocorax cyanomelas</i>	LC				
232			<i>Cyanocorax chrysops</i>	LC				
233		Hirundinidae	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	LC				
234			<i>Progne tapera</i>	LC				
235			<i>Tachycineta albiventer</i>	LC				
236		Troglodytidae	<i>Microcerculus marginatus</i>	LC				
237			<i>Campylorhynchus turdinus</i>	LC				
238			<i>Pheugopedius genibarbis</i>	LC				
239			<i>Cyphorhinus arada</i>	LC				
240		Poliptilidae	<i>Ramphocaenus melanurus</i>	LC				
241		Turdidae	<i>Turdus amaurochalinus</i>	LC				
242			<i>Turdus albicollis</i>	LC				
243		Fringillidae	<i>Euphonia chlorotica</i>	LC				
244			<i>Euphonia lanirostris</i>	LC				
245		Passerellida	<i>Ammodramus aurifrons</i>	LC				
246			<i>Arremon taciturnus</i>	LC				

Nº	Orden	Familia	Orden	Estatus		CITES	Migrante	
				IUCN	LRVB		A	B
247	Passeriformes	Icteridae	<i>Psarocolius angustifrons</i>	LC				
248			<i>Psarocolius decumanus</i>	LC				
249			<i>Psarocolius bifasciatus</i>	LC				
250			<i>Cacicus solitarius</i>	LC				
251			<i>Cacicus cela</i>	LC				
252			<i>Icterus cayanensis</i>	LC				
253			<i>Icterus pyrrhopterus</i>	LC				
254			<i>Molothrus oryzivorus</i>	LC				
255			<i>Lamprospira tanagrinus</i>	LC				
256		Parulidae	<i>Basileuterus culicivorus</i>	LC				
257		Cardinalidae	<i>Habia rubica</i>	LC				
258			<i>Cyanoloxia rothschildii</i>	LC				
259		Thraupidae	<i>Chlorophanes spiza</i>	LC				
260			<i>Hemithraupis guira</i>	LC				
261			<i>Loriotus luctuosus</i>	LC				
262			<i>Eucometis penicillata</i>	LC				
263			<i>Volatinia jacarina</i>	LC			x	
264			<i>Ramphocelus carbo</i>	LC				
265			<i>Lanio versicolor</i>	LC				
266			<i>Cyanerpes caeruleus</i>	LC				
267			<i>Cyanerpes cyaneus</i>	LC				
268			<i>Tirsinia viridis</i>	LC			x	
269			<i>Dacnis cayana</i>	LC				
270			<i>Sporophila caerulea</i>	LC			x	
271			<i>Saltator maximus</i>	LC				
272			<i>Coereba flaveola</i>	LC				
273			<i>Cissopis leverianus</i>	LC				
274			<i>Stelpnia nigrocincta</i>	LC				
275			<i>Tangara mexicana</i>	LC				
276			<i>Tangara chilensis</i>	LC				
277			<i>Tangara schrankii</i>	LC				
278			<i>Thraupis sayaca</i>	LC				
279			<i>Thraupis palmarum</i>	LC				

Categorías UICN: No Evaluado, Datos Insuficientes (DD), Preocupación Menor (LC), Casi Amenazado (NT), Vulnerable (VU), En Peligro (EN), En Peligro Crítico (CR), Extinto en Estado Silvestre (EW) y Extinto (EX).

CITES: **Apéndice I:** Especies sobre las que se cierra el mayor grado de peligro de extinción y la CITES prohíbe el comercio internacional de especímenes de esas especies. **Apéndice II:** Especies que no están necesariamente amenazadas de extinción pero que podrían llegar a estarlo a menos que se controle estrictamente su comercio. **Apéndice III:** Especies incluidas a solicitud de una Parte que ya reglamenta el comercio de dicha especie y necesita la cooperación de otros países para evitar la explotación insostenible o ilegal de las mismas.

Bibliografía

- Aponte, M. A., Ric, D., Maillard, O., Lane, D. F., Terrill, R. S., Calle, A. G., Ramírez, R., Montenegro, M. A., Arispe, R., Acosta, L. H., Salvatierra, M. M., Pantoja, W. S., Sánchez, G. & Aliaga-Pantoja, D. 2022. New and noteworthy observations on the distribution of birds in Bolivia. *Cotinga* 44: 9-18.
- eBird. 2021. eBird: una base de datos en línea sobre la distribución y abundancia de aves. eBird, Laboratorio de Ornitología de Cornell, Ithaca, Nueva York. Disponible: <http://www.ebird.org>. (Consultado: 26 de septiembre de 2023).
- Els P., Wijpkema T. & Wijpkema J. T. 2023. Noteworthy records of birds from Pando including two new species for Bolivia. *Bull. B.O.C.* 143:330-345
- Herzog, S. K. 2021. Birds of Bolivia updated species list (version 15 July 2021). https://birdsofbolivia.org/wp-content/uploads/Birds-of-Bolivia-species-list_15JUL2021.pdf.
- Lane, D. F., Aponte Justiniano, M. A., Terrill, R. S., Rheindt, F. E., Klicka, L. B., Rosenberg, G. H., Schmitt, C. J. & Burns, K. J. 2021. A new genus and species of tanager (*Passeriformes, Thraupidae*) from the lower Yungas of western Bolivia and southern Peru. *Ornithology* 138: ukab059.
- Herzog, S.K, R.S. Terrill, A.E. Jahn, J.V. Remsem, Jr., O. Maillard Z., V.H. Garcia-Soliz, R. MacLeod, A.A. McCormick & J.Q. Vidoz. 2017. Aves de Bolivia. Guía de Campo. Asociación Armonía, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 501 p.
- Montenegro-Avila M. A., Avalo N. A., Parada G. A. & Miserendino R. 2023. Two new bird species for Bolivia. *Bull. B.O.C.* 143: 370-374.
- Navarro, G. & W. Ferreira. (2011). Mapa de vegetación de Bolivia. Sistemas ecológicos. CDROM interactive, The Nature Conservancy & Rumbol.
- ORE 2022. Plan de control y gestión de los recursos naturales y biodiversidad del Territorio Indígena Multiétnico (TIM). América Latina, Bolivia. 380 pp.



LIDERADO POR



SOCIOS NACIONALES



APOYA



Producción original de las ilustraciones para la Guía de Campo - Aves de Bolivia apoyada por / Original Birds of Bolivia Field Guide artwork production supported by:

